

● 성분·함량 : 1정 중

황산콘드로이틴나트륨(식약청고시 제98-127호) 400mg 판토텐산칼슘(약전) 15mg
 푸르셀티아민(식약청고시 제98-127호) · 60mg 낙산리보플라빈(약전) 6mg
 니코틴아미드(약전) 50mg γ-오리자놀(식약청고시 제98-127호) ··· 5mg
 염산피리독신(약전) 25mg

첨가제(타르색소) : 적색40호, 청색1호 알루미늄레이크, 황색5호 알루미늄레이크

● 성상 : 갈색의 장방형 필름코팅정

● 효능·효과 - 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같습니다.

· 다음 증상의 완화 : 신경통, 근육통, 관절통(요통, 견통 등) · 각기, 눈의 피로 -
 다음 경우의 비타민B₆의 보급 : 육체피로, 임신·수유기, 병중·병후의 체력저하시

● 용법·용량 : 성인 및 8세 이상의 어린이 : 1일 1회, 1회 1정 식후복용

● 저장방법 : 기밀용기, 실온보관(1~30℃)

※ 본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질·변패·오염되거나 손상된 제품은 약국개설자 또는 의약품판매업자에 한하여 교환하여 드리며, 공정거래위원회에서 고시한 "소비자분쟁해결기준"에 의거, 정당한 소비자피해에 대해 보상에 드립니다.

● 소비자상담실 : 080-021-1010(수신자요금부담전화)

● 학술상담실 : 02-570-3888 ● 홈페이지 www.ilyang.co.kr



고단위 종합치료제 테라400정

황산콘드로이틴 400mg 함유

일반의약품

60정

- ◆ 신경통
- ◆ 근육통
- ◆ 관절통
- ◆ 눈의 피로

일양약품주식회사
 경기도 용인시 기흥구 하갈동 182-4



【사용상의 주의사항】 1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오. 1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민증이 있는 환자 2. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오. (복용전 의사 또는 약사와 상의하십시오.) 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자 2) 임부, 수유부 3. 부작용 1) 이 약의 투여에 의해 다음의 증상이 있을 경우에는 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의하십시오. 가) 구역, 구토, 묽은 변, 설사, 구내염, 식욕부진, 복부팽만감 2) 피리독신을 1일 500mg~2g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적증상(Neuropathy: 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있습니다. 3) 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성 손상(Glucose tolerance impairment: 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 과요산혈증(Hyperuricemia: 혈액 중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있습니다. 4. 일반적 주의 1) 정해진 용법·용량을 잘 지키십시오. 2) 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도·감독하에 투여하십시오. 3) 1개월 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 의사 또는 약사와 상의하십시오. 5. 상호작용 1) 이 약을 투여할 경우에는 다음의 약물과 병용투여하지 마십시오. 가) 레보도파 6. 임상검사치에의 영향 1) 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사치에 영향을 줄 수 있습니다. 7. 저장상의 주의사항 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여 보관하십시오. 3) 오·남용을 피하고, 품질을 보호·유지하기 위해 다른 용기에 넣지 마십시오.

개정연월일 : 2003.09.26
 P0906-03

제조번호 :

사용기한 :