

※본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만일 유통과정 중 변질, 또는 손상된 제품이 발견될 경우에는 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다.
 ※제품에 대한 기타 자세한 사항은 이지드럭(<http://ezdrug.kfda.go.kr>)-(정보·마감)-(의약품정보)에서 확인할 수 있습니다. 개정일 : 2009.12.31

제조사: **미래 제약주식회사**
 MIRAE PHARM KOREA CO., LTD
 경기도 안성시 신성동 137번지

정부인
 KGMP
 우수약품 지정업체

일반의약품
 분류번호: 237

10캡슐

유산균배합 정장지사제

로이디펜 캡슐

-  설사
-  묽은변
-  식체
-  토사
-  복통설사

원료약품 및 그 분량 : 1 캡슐(380mg) 중
 스트렙토코쿠스페칼리스 F-100균(식약청고시) 5mg
 (스트렙토코쿠스페칼리스균으로서 5x10⁷개)
 로페라미드염산염(약전) 0.25mg

베르베린염화물수화물(약전) 20mg
 (무수물로서)
 아크리놀수화물(약전) 20mg
 동물유래성분 : 유당수화물(기원동물소, 사용부위 우유)

성상
 황색 분말이 들어있는 상부 연등색 하부 담황색 경질 캡슐제
효능·효과

설사, 복통을 수반하는 설사, 묽은 변, 식체(체함), 토사

용법·용량

성인(15세 이상)은 1회 2캡슐을 1일 2회 복용, 설사가 멈추면
 복용하지 마십시오. 복용간격은 4시간 이상으로 하십시오.

사용상의 주의사항

1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오. 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당)분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 됩니다.

2. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오. 1) 지금까지 약에 의한 알레르기 증상, 예를 들면 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 가려움 등을 나타낸 적이 있는 사람 2) 발열을 수반한 설사가 있는 사람 3) 고령자(노인) 4) 혈변이 있는 사람, 점액변이 계속되는 사람 5) 임부 또는 임신하고 있을 것으로 생각되는 부인 6) 의사의 치료를 받고 있는 사람
 3. 부작용 1) 이 약의 복용에 의해 알레르기 증상(예를 들

면 발진, 가려움 등)이 나타나는 경우에는 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상담하십시오. 2) 이 약의 복용에 의해 변비가 생기는 일이 있습니다. 특히 변비를 피하지 않으면 안되는 항문질환 등이 있는 사람은 주의해서 복용하십시오.

4.일반적 주의 1) 정해진 용법·용량을 엄수하십시오. 2) 이 약은 소아에 복용시키지 마십시오. 3) 급성기의 격심한 설사의 경우 또는 구기(메스꺼움), 복통, 복부(배부분)팽만 등의 증상을 수반한 설사의 경우 이 약으로 무리하게 설사를 멈추면 오히려 병세를 악화시키는 일이 있으므로, 이와 같은 경우에는 복용에 대해서 의사 또는 약사와 상담하십시오. 4) 복용 시에는 음주하지 마십시오. 5) 2일간 복용해도 증상의 개선이 보이지 않는 경우는, 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상담하십시오.

5. 보관 및 취급상의 주의 1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 2) 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 보관하십시오. 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

포장단위 : 자사포장단위 (주·부작용)

저장방법 : 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

효소비자 상담실

031)672-3431, www.miraepharmkorea.co.kr