



모발과 손톱 전용 치료제

판토가® 캡셀

(Pantogar cap.)

분류번호 : 325
일반 의약품

건강한 모발은 오직 건강한 모근에서만 자랍니다.

즉, 모발형성은 매우 활동적인 모근 조직세포에서 일어나며 이 모근 조직세포는 혈액을 통해서만 미세 영양소를 공급 받는 자율적인 대사 기능을 가지므로 모발의 성장과 모발의 질은 오직 내부로 부터만 영향을 받습니다.

특히 확산성 탈모 (여성형 탈모)의 경우는 남성형 탈모(남성호르몬성)와는 달리 모근이 약해지면서 모발의 성장이 저해 받아 서서히 모발이 가늘어 지다가 결국은 탈모에 이르게 됩니다. 원인은 피로, 스트레스, 감염, 갑상선 질환, 빈혈, 임신과 수유, 영양불량(다이어트, 알코올남용), 약물복용(항암치료) 중독, 방사선 치료등 여러가지 원인이 있으나, 공통된 점은 모근 조직세포로의 필수미세영양소의 공급이 원활하지 못하다는 점입니다.

판토가는 약용효모, 모발의 주성분인 케라틴 등 6가지 주요성분의 독특한 배합방식으로 각 성분이 최대의 효과를 발휘하도록 처방 되어 있어 모근 조직세포로의 필수 미세 영양소가 혈액을 통하여 특별히 잘 공급 되도록 고안된 제품입니다.

[성분 · 함량]

1캡셀중	Medicinal Yeast	100mg
	Keratin	20mg
	Thiamine nitrate	60mg
	Calcium d-Pantothenate	60mg
	L-Cystine	20mg
	Para aminobenzoic acid	20mg

[성상]

연회색 가루의 내용물이 든 상부는 진녹색, 하부는 미황색의 불투명 경질 캡셀체

[약리작용]

1. 모발성장과 건강한 모발의 필수 미세 영양소들을 모근으로 혈액을 통하여 공급합니다.
2. 확산성 탈모와 머릿결 손상, 손톱발육장애에 약용효모, 케라틴등 6가지 복합성분이 상호 상승 작용하여 모근 조직세포에 필수 미세 영양소를 가장 효과적으로 공급합니다.

[특장점]

1. 어떠한 원인에 의해서건 발생한 확산성 탈모의 완화에 탁월한 효과를 나타냅니다.
2. 부작용이 거의 없어 장기간 치료에 적합한 약물입니다.
3. 내약성이 뛰어나 장기간 사용 시에도 약효에는 변함이 없습니다.
4. 남성대머리의 경우, 여성형 탈모증인 경우에는 사용이 가능합니다.

[효능 · 효과]

확산성 탈모의 완화, 손상된 모발, 감염성이 아닌 손톱의 발육부진

[용법 · 용량]

성인 : 1일 3회, 1회 1캡셀 식후복용

소아 : 1일 1~2회, 1회 1캡셀 식후복용

[사용상의 주의사항]

캡셀제

1. 다음과 같은 사람은 이 약물을 복용하지 마십시오.
홍터로 인한 탈모나 안드로겐 유전성 탈모증(남성형 대머리)
2. 다음과 같은 사람은 이 약물을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.
설폰아미드제제와 병용 시 주의하십시오.
3. 다음과 같은 경우, 이 약 복용을 즉각중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오. 상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지하십시오.
1) 위통, 구토 등 위장관 불쾌감과 발한, 빠른맥(빈맥), 가려움, 두드러기 등이 나타나는 경우
2) 두부 이외의 신체부위에서 발모현상이 나타나는 경우
4. 기타 이 약의 복용(사용)시, 주의할 사항
1) 증상이 지속되거나 기대하는 효과가 나타나지 않는 경우 의사와 상의하십시오.
2) 임부 · 수유부에 투여할 경우는 의사와 상의하십시오.
3) 평균 치료기간은 3~6개월이고 보통 약 3~4개월 후부터 효과를 나타내며 필요한 경우 투여를 계속 하거나 반복 투여할 수 있습니다.
4) 이 약은 당뇨병환자에 투여할 수 있습니다.
5. 저장상의 주의사항
1) 사용기한이 초과된 것은 복용하지 마십시오.
2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

[저장방법] 차광 기밀용기 25°C 이하 보관

[사용기간] 제조일로부터 36개월

[포장단위] 30, 90캡셀

만약 사용기한이 경과 되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품을 구입하셨을 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

작성년월 : 2006. 9

Manufactured by
Merz Pharma (Schweiz)AG
Hegenheimermattweg 57
CH-4123 Allschwil, Switzerland

Distributed by



Merz Pharmaceuticals GmbH.
D-60318 Frankfurt. Germany
www.merz.com

수입원

ihuh (주) 후상사

서울시 강남구 논현동 7-17
Tel. 02) 3444-4064/5
www.ihuh.co.kr