

뇌기능 개선제

아스틸정

(아세틸-L-카르니틴염산염)

ASTYL Tab.

K G M P
적격업체

전문의약품
분류번호:219

【원료약품의 분량】 1정 중

아세틸-L-카르니틴염산염(KP).....590.0mg
(아세틸-L-카르니틴으로서 500mg)

【성 상】 백색의 장방형 제피정

【효능·효과】

일차적 퇴행성 질환 또는 뇌혈관 질환에 의한 이차적 퇴행성 질환

【용법·용량】

아세틸-L-카르니틴으로서 1회 500mg을 1일 2~3회 경구투여한다(먹는다, 복용한다).

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.
이 약에 대해 과민반응을 나타내는 환자
2. 이상반응
이 약의 복용시 드물게 흥분작용이 나타나는 경우가 있으나 체내의 약용량이 감소함에 따라 이런 증상은 바로 소실된다.
3. 상호작용
다른 약물과의 상호작용은 없는 것으로 알려져 있다.
4. 임부 및 수유부 등에 대한 투여
동물실험에서의 태아독성은 보고된 적이 없지만 임신 측 3개월 기간과 수유기의 여성은 꼭 필요한 경우에만 의사와 감독하에서 복용할 것.

【포장단위】 60정

※ 본 제품은 흡수성이 우려되므로 PTP 포장 상태로 조제하여 주십시오.

【저장방법】 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

【사용기간】 제조일로부터 24개월

※ 사용기한은 제품 포장에 표시된 8자리 숫자『○○○○.△△.□□』로 표기되어 있으며 ○○○○년 △△월 □□일 까지 복용가능한 의약품입니다.

* 본 의약품은 우수의약품 제조관리기준(KGMP)에 따라 제조 및 품질검사를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기간이 경과되었거나 변질·변패·오염되거나 손상된 의약품을 구입하였을 때는 구입처를 통해 교환하여 드립니다.

* 이 첨부문서 개정일자 이후 변경된 내용은 당사 홈페이지 (<http://www.youngilpharm.co.kr>)나 영일제약(주) 소비자상담실(02-522-7005)에서 확인할 수 있습니다.

* 의약품의 용어 설명 및 기타 자세한 의약품 정보는 식품의약품안전처 온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)을 참조하세요.

* 첨부문서에 기재되지 않은 이상반응이 나타날 경우 의사나 약사 또는 식품의약품안전처(이디드럭→보고마당→안전성정보→의약품유해사례보고)에 알려주시기 바랍니다.

* 제 조 자 : 구주제약(주)-경기도 화성시 정남면 덕절제기길 5

* 제조의뢰자 : 영일제약(주) - 충북 진천군 진천읍 문화12길 6-1

* 의약품을 어린이의 손에 닿지 않게 보관하여 주시기 바랍니다.

개정년월일 : 2015년 6월 26일

