

- 반드시 첨부문서를 읽은 후 사용(복용)하시고 첨부문서는 약과 함께 보관하십시오.
- 올바른 사용(복용)방법을 모르거나 의문사항이 있는 경우, 의사·약사와 상담하시기 바랍니다.

소화성궤양용제

분류번호 : 232(소화성 궤양용제) 전문의약품

라니티드 정

라니티딘염산염

【원료약품의 분류】 정 중

라니티딘염산염(U.S.P.) 168mg

(라니티딘으로서 150mg)

【성상】 미색~미황색의 원형 필름코팅정

【용법·용량】

- 위·십이지장궤양, Zollinger-Ellison증후군, 역류성식도염, 마취전 투약(멘델슨 증후군 예방), 수술후 궤양, 비스테로이드성 소염진통제(NSAID) 투여로 인한 위·십이지장궤양
- 다음 질환의 위장막 병변(미란, 출혈, 발적, 부종)의 개선 : 급성위염, 만성위염의 급성악화기, 상부소화관출혈소화성궤양, 급성스트레스궤양, 급성위궤양병변에 의한 위궤양

【용법·용량】

1. 성인
 - 1) 라니티딘으로서 1회 150mg 1일 2회, 오전 및 취침시에 경구투여 하십시오.
 - 2) 위·십이지장궤양
 - 1회 150mg 1일 2회 경구투여하거나, 1회 300mg 1일 1회 취침시에 투여하십시오.
2. 소아
 - 1) 위·십이지장궤양
 - 1회 150mg 1일 2회 경구투여하거나, 1회 300mg 1일 1회 취침시에 투여하십시오.
3. 성인
 - 1) 위·십이지장궤양
 - 1회 150mg 1일 2회 경구투여하거나, 1회 300mg 1일 1회 취침시에 투여하십시오.
4. 성인
 - 1) 위·십이지장궤양
 - 1회 150mg 1일 2회 경구투여하거나, 1회 300mg 1일 1회 취침시에 투여하십시오.
5. 성인
 - 1) 위·십이지장궤양
 - 1회 150mg 1일 2회 경구투여하거나, 1회 300mg 1일 1회 취침시에 투여하십시오.
6. 성인
 - 1) 위·십이지장궤양
 - 1회 150mg 1일 2회 경구투여하거나, 1회 300mg 1일 1회 취침시에 투여하십시오.
7. 성인
 - 1) 위·십이지장궤양
 - 1회 150mg 1일 2회 경구투여하거나, 1회 300mg 1일 1회 취침시에 투여하십시오.
8. 성인
 - 1) 위·십이지장궤양
 - 1회 150mg 1일 2회 경구투여하거나, 1회 300mg 1일 1회 취침시에 투여하십시오.
9. 성인
 - 1) 위·십이지장궤양
 - 1회 150mg 1일 2회 경구투여하거나, 1회 300mg 1일 1회 취침시에 투여하십시오.
10. 성인
 - 1) 위·십이지장궤양
 - 1회 150mg 1일 2회 경구투여하거나, 1회 300mg 1일 1회 취침시에 투여하십시오.
11. 성인
 - 1) 위·십이지장궤양
 - 1회 150mg 1일 2회 경구투여하거나, 1회 300mg 1일 1회 취침시에 투여하십시오.
12. 성인
 - 1) 위·십이지장궤양
 - 1회 150mg 1일 2회 경구투여하거나, 1회 300mg 1일 1회 취침시에 투여하십시오.
13. 성인
 - 1) 위·십이지장궤양
 - 1회 150mg 1일 2회 경구투여하거나, 1회 300mg 1일 1회 취침시에 투여하십시오.
14. 성인
 - 1) 위·십이지장궤양
 - 1회 150mg 1일 2회 경구투여하거나, 1회 300mg 1일 1회 취침시에 투여하십시오.
15. 성인
 - 1) 위·십이지장궤양
 - 1회 150mg 1일 2회 경구투여하거나, 1회 300mg 1일 1회 취침시에 투여하십시오.
16. 성인
 - 1) 위·십이지장궤양
 - 1회 150mg 1일 2회 경구투여하거나, 1회 300mg 1일 1회 취침시에 투여하십시오.
17. 성인
 - 1) 위·십이지장궤양
 - 1회 150mg 1일 2회 경구투여하거나, 1회 300mg 1일 1회 취침시에 투여하십시오.
18. 성인
 - 1) 위·십이지장궤양
 - 1회 150mg 1일 2회 경구투여하거나, 1회 300mg 1일 1회 취침시에 투여하십시오.
19. 성인
 - 1) 위·십이지장궤양
 - 1회 150mg 1일 2회 경구투여하거나, 1회 300mg 1일 1회 취침시에 투여하십시오.
20. 성인
 - 1) 위·십이지장궤양
 - 1회 150mg 1일 2회 경구투여하거나, 1회 300mg 1일 1회 취침시에 투여하십시오.
21. 성인
 - 1) 위·십이지장궤양
 - 1회 150mg 1일 2회 경구투여하거나, 1회 300mg 1일 1회 취침시에 투여하십시오.
22. 성인
 - 1) 위·십이지장궤양
 - 1회 150mg 1일 2회 경구투여하거나, 1회 300mg 1일 1회 취침시에 투여하십시오.
23. 성인
 - 1) 위·십이지장궤양
 - 1회 150mg 1일 2회 경구투여하거나, 1회 300mg 1일 1회 취침시에 투여하십시오.
24. 성인
 - 1) 위·십이지장궤양
 - 1회 150mg 1일 2회 경구투여하거나, 1회 300mg 1일 1회 취침시에 투여하십시오.
25. 성인
 - 1) 위·십이지장궤양
 - 1회 150mg 1일 2회 경구투여하거나, 1회 300mg 1일 1회 취침시에 투여하십시오.
26. 성인
 - 1) 위·십이지장궤양
 - 1회 150mg 1일 2회 경구투여하거나, 1회 300mg 1일 1회 취침시에 투여하십시오.
27. 성인
 - 1) 위·십이지장궤양
 - 1회 150mg 1일 2회 경구투여하거나, 1회 300mg 1일 1회 취침시에 투여하십시오.
28. 성인
 - 1) 위·십이지장궤양
 - 1회 150mg 1일 2회 경구투여하거나, 1회 300mg 1일 1회 취침시에 투여하십시오.
29. 성인
 - 1) 위·십이지장궤양
 - 1회 150mg 1일 2회 경구투여하거나, 1회 300mg 1일 1회 취침시에 투여하십시오.
30. 성인
 - 1) 위·십이지장궤양
 - 1회 150mg 1일 2회 경구투여하거나, 1회 300mg 1일 1회 취침시에 투여하십시오.
31. 성인
 - 1) 위·십이지장궤양
 - 1회 150mg 1일 2회 경구투여하거나, 1회 300mg 1일 1회 취침시에 투여하십시오.
32. 성인
 - 1) 위·십이지장궤양
 - 1회 150mg 1일 2회 경구투여하거나, 1회 300mg 1일 1회 취침시에 투여하십시오.
33. 성인
 - 1) 위·십이지장궤양
 - 1회 150mg 1일 2회 경구투여하거나, 1회 300mg 1일 1회 취침시에 투여하십시오.
34. 성인
 - 1) 위·십이지장궤양
 - 1회 150mg 1일 2회 경구투여하거나, 1회 300mg 1일 1회 취침시에 투여하십시오.
35. 성인
 - 1) 위·십이지장궤양
 - 1회 150mg 1일 2회 경구투여하거나, 1회 300mg 1일 1회 취침시에 투여하십시오.
36. 성인
 - 1) 위·십이지장궤양
 - 1회 150mg 1일 2회 경구투여하거나, 1회 300mg 1일 1회 취침시에 투여하십시오.
37. 성인
 - 1) 위·십이지장궤양
 - 1회 150mg 1일 2회 경구투여하거나, 1회 300mg 1일 1회 취침시에 투여하십시오.
38. 성인
 - 1) 위·십이지장궤양
 - 1회 150mg 1일 2회 경구투여하거나, 1회 300mg 1일 1회 취침시에 투여하십시오.
39. 성인
 - 1) 위·십이지장궤양
 - 1회 150mg 1일 2회 경구투여하거나, 1회 300mg 1일 1회 취침시에 투여하십시오.
40. 성인
 - 1) 위·십이지장궤양
 - 1회 150mg 1일 2회 경구투여하거나, 1회 300mg 1일 1회 취침시에 투여하십시오.
41. 성인
 - 1) 위·십이지장궤양
 - 1회 150mg 1일 2회 경구투여하거나, 1회 300mg 1일 1회 취침시에 투여하십시오.
42. 성인
 - 1) 위·십이지장궤양
 - 1회 150mg 1일 2회 경구투여하거나, 1회 300mg 1일 1회 취침시에 투여하십시오.
43. 성인
 - 1) 위·십이지장궤양
 - 1회 150mg 1일 2회 경구투여하거나, 1회 300mg 1일 1회 취침시에 투여하십시오.
44. 성인
 - 1) 위·십이지장궤양
 - 1회 150mg 1일 2회 경구투여하거나, 1회 300mg 1일 1회 취침시에 투여하십시오.
45. 성인
 - 1) 위·십이지장궤양
 - 1회 150mg 1일 2회 경구투여하거나, 1회 300mg 1일 1회 취침시에 투여하십시오.
46. 성인
 - 1) 위·십이지장궤양
 - 1회 150mg 1일 2회 경구투여하거나, 1회 300mg 1일 1회 취침시에 투여하십시오.
47. 성인
 - 1) 위·십이지장궤양
 - 1회 150mg 1일 2회 경구투여하거나, 1회 300mg 1일 1회 취침시에 투여하십시오.
48. 성인
 - 1) 위·십이지장궤양
 - 1회 150mg 1일 2회 경구투여하거나, 1회 300mg 1일 1회 취침시에 투여하십시오.
49. 성인
 - 1) 위·십이지장궤양
 - 1회 150mg 1일 2회 경구투여하거나, 1회 300mg 1일 1회 취침시에 투여하십시오.
50. 성인
 - 1) 위·십이지장궤양
 - 1회 150mg 1일 2회 경구투여하거나, 1회 300mg 1일 1회 취침시에 투여하십시오.
51. 성인
 - 1) 위·십이지장궤양
 - 1회 150mg 1일 2회 경구투여하거나, 1회 300mg 1일 1회 취침시에 투여하십시오.
52. 성인
 - 1) 위·십이지장궤양
 - 1회 150mg 1일 2회 경구투여하거나, 1회 300mg 1일 1회 취침시에 투여하십시오.
53. 성인
 - 1) 위·십이지장궤양
 - 1회 150mg 1일 2회 경구투여하거나, 1회 300mg 1일 1회 취침시에 투여하십시오.
54. 성인
 - 1) 위·십이지장궤양
 - 1회 150mg 1일 2회 경구투여하거나, 1회 300mg 1일 1회 취침시에 투여하십시오.
55. 성인
 - 1) 위·십이지장궤양
 - 1회 150mg 1일 2회 경구투여하거나, 1회 300mg 1일 1회 취침시에 투여하십시오.
56. 성인
 - 1) 위·십이지장궤양
 - 1회 150mg 1일 2회 경구투여하거나, 1회 300mg 1일 1회 취침시에 투여하십시오.
57. 성인
 - 1) 위·십이지장궤양
 - 1회 150mg 1일 2회 경구투여하거나, 1회 300mg 1일 1회 취침시에 투여하십시오.
58. 성인
 - 1) 위·십이지장궤양
 - 1회 150mg 1일 2회 경구투여하거나, 1회 300mg 1일 1회 취침시에 투여하십시오.
59. 성인
 - 1) 위·십이지장궤양
 - 1회 150mg 1일 2회 경구투여하거나, 1회 300mg 1일 1회 취침시에 투여하십시오.
60. 성인
 - 1) 위·십이지장궤양
 - 1회 150mg 1일 2회 경구투여하거나, 1회 300mg 1일 1회 취침시에 투여하십시오.
61. 성인
 - 1) 위·십이지장궤양
 - 1회 150mg 1일 2회 경구투여하거나, 1회 300mg 1일 1회 취침시에 투여하십시오.
62. 성인
 - 1) 위·십이지장궤양
 - 1회 150mg 1일 2회 경구투여하거나, 1회 300mg 1일 1회 취침시에 투여하십시오.
63. 성인
 - 1) 위·십이지장궤양
 - 1회 150mg 1일 2회 경구투여하거나, 1회 300mg 1일 1회 취침시에 투여하십시오.
64. 성인
 - 1) 위·십이지장궤양
 - 1회 150mg 1일 2회 경구투여하거나, 1회 300mg 1일 1회 취침시에 투여하십시오.
65. 성인
 - 1) 위·십이지장궤양
 - 1회 150mg 1일 2회 경구투여하거나, 1회 300mg 1일 1회 취침시에 투여하십시오.
66. 성인
 - 1) 위·십이지장궤양
 - 1회 150mg 1일 2회 경구투여하거나, 1회 300mg 1일 1회 취침시에 투여하십시오.
67. 성인
 - 1) 위·십이지장궤양
 - 1회 150mg 1일 2회 경구투여하거나, 1회 300mg 1일 1회 취침시에 투여하십시오.
68. 성인
 - 1) 위·십이지장궤양
 - 1회 150mg 1일 2회 경구투여하거나, 1회 300mg 1일 1회 취침시에 투여하십시오.
69. 성인
 - 1) 위·십이지장궤양
 - 1회 150mg 1일 2회 경구투여하거나, 1회 300mg 1일 1회 취침시에 투여하십시오.
70. 성인
 - 1) 위·십이지장궤양
 - 1회 150mg 1일 2회 경구투여하거나, 1회 300mg 1일 1회 취침시에 투여하십시오.
71. 성인
 - 1) 위·십이지장궤양
 - 1회 150mg 1일 2회 경구투여하거나, 1회 300mg 1일 1회 취침시에 투여하십시오.
72. 성인
 - 1) 위·십이지장궤양
 - 1회 150mg 1일 2회 경구투여하거나, 1회 300mg 1일 1회 취침시에 투여하십시오.
73. 성인
 - 1) 위·십이지장궤양
 - 1회 150mg 1일 2회 경구투여하거나, 1회 300mg 1일 1회 취침시에 투여하십시오.
74. 성인
 - 1) 위·십이지장궤양
 - 1회 150mg 1일 2회 경구투여하거나, 1회 300mg 1일 1회 취침시에 투여하십시오.
75. 성인
 - 1) 위·십이지장궤양
 - 1회 150mg 1일 2회 경구투여하거나, 1회 300mg 1일 1회 취침시에 투여하십시오.
76. 성인
 - 1) 위·십이지장궤양
 - 1회 150mg 1일 2회 경구투여하거나, 1회 300mg 1일 1회 취침시에 투여하십시오.
77. 성인
 - 1) 위·십이지장궤양
 - 1회 150mg 1일 2회 경구투여하거나, 1회 300mg 1일 1회 취침시에 투여하십시오.
78. 성인
 - 1) 위·십이지장궤양
 - 1회 150mg 1일 2회 경구투여하거나, 1회 300mg 1일 1회 취침시에 투여하십시오.
79. 성인
 - 1) 위·십이지장궤양
 - 1회 150mg 1일 2회 경구투여하거나, 1회 300mg 1일 1회 취침시에 투여하십시오.
80. 성인
 - 1) 위·십이지장궤양
 - 1회 150mg 1일 2회 경구투여하거나, 1회 300mg 1일 1회 취침시에 투여하십시오.
81. 성인
 - 1) 위·십이지장궤양
 - 1회 150mg 1일 2회 경구투여하거나, 1회 300mg 1일 1회 취침시에 투여하십시오.
82. 성인
 - 1) 위·십이지장궤양
 - 1회 150mg 1일 2회 경구투여하거나, 1회 300mg 1일 1회 취침시에 투여하십시오.
83. 성인
 - 1) 위·십이지장궤양
 - 1회 150mg 1일 2회 경구투여하거나, 1회 300mg 1일 1회 취침시에 투여하십시오.
84. 성인
 - 1) 위·십이지장궤양
 - 1회 150mg 1일 2회 경구투여하거나, 1회 300mg 1일 1회 취침시에 투여하십시오.
85. 성인
 - 1) 위·십이지장궤양
 - 1회 150mg 1일 2회 경구투여하거나, 1회 300mg 1일 1회 취침시에 투여하십시오.
86. 성인
 - 1) 위·십이지장궤양
 - 1회 150mg 1일 2회 경구투여하거나, 1회 300mg 1일 1회 취침시에 투여하십시오.
87. 성인
 - 1) 위·십이지장궤양
 - 1회 150mg 1일 2회 경구투여하거나, 1회 300mg 1일 1회 취침시에 투여하십시오.
88. 성인
 - 1) 위·십이지장궤양
 - 1회 150mg 1일 2회 경구투여하거나, 1회 300mg 1일 1회 취침시에 투여하십시오.
89. 성인
 - 1) 위·십이지장궤양
 - 1회 150mg 1일 2회 경구투여하거나, 1회 300mg 1일 1회 취침시에 투여하십시오.
90. 성인
 - 1) 위·십이지장궤양
 - 1회 150mg 1일 2회 경구투여하거나, 1회 300mg 1일 1회 취침시에 투여하십시오.
91. 성인
 - 1) 위·십이지장궤양
 - 1회 150mg 1일 2회 경구투여하거나, 1회 300mg 1일 1회 취침시에 투여하십시오.
92. 성인
 - 1) 위·십이지장궤양
 - 1회 150mg 1일 2회 경구투여하거나, 1회 300mg 1일 1회 취침시에 투여하십시오.
93. 성인
 - 1) 위·십이지장궤양
 - 1회 150mg 1일 2회 경구투여하거나, 1회 300mg 1일 1회 취침시에 투여하십시오.
94. 성인
 - 1) 위·십이지장궤양
 - 1회 150mg 1일 2회 경구투여하거나, 1회 300mg 1일 1회 취침시에 투여하십시오.
95. 성인
 - 1) 위·십이지장궤양
 - 1회 150mg 1일 2회 경구투여하거나, 1회 300mg 1일 1회 취침시에 투여하십시오.
96. 성인
 - 1) 위·십이지장궤양
 - 1회 150mg 1일 2회 경구투여하거나, 1회 300mg 1일 1회 취침시에 투여하십시오.
97. 성인
 - 1) 위·십이지장궤양
 - 1회 150mg 1일 2회 경구투여하거나, 1회 300mg 1일 1회 취침시에 투여하십시오.
98. 성인
 - 1) 위·십이지장궤양
 - 1회 150mg 1일 2회 경구투여하거나, 1회 300mg 1일 1회 취침시에 투여하십시오.
99. 성인
 - 1) 위·십이지장궤양
 - 1회 150mg 1일 2회 경구투여하거나, 1회 300mg 1일 1회 취침시에 투여하십시오.
100. 성인
 - 1) 위·십이지장궤양
 - 1회 150mg 1일 2회 경구투여하거나, 1회 300mg 1일 1회 취침시에 투여하십시오.

- 5) 순환기계 : 다른 H₂수용체 길항제와 마찬가지로, 매우 드물게 서맥, 방실블록, 빈맥이 나타날 수 있습니다. 매우 드물게 협관염이 보고되었습니다.
- 6) 소화기계 : 때때로 변비, 드물게 구역, 구토, 복부팽만감, 복통, 식욕부진, 매우 드물게 설사, 급성 췌장염이 나타날 수 있습니다.
- 7) 정신신경계 : 매우 드물게 어지러움, 졸림, 경련, 두통(때때로 중증), 두중, 불안, 흥분, 불안, 주로 중증 및 고령자에서 기억력 정신혼동, 우울증 및 환각이 나타날 수 있습니다. 또한 매우 드물게 기억력인 혼란 시력과 불수의 운동장애가 보고되었습니다. 의식 장애, 경련(간질성 등), 간대성 근경련이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고, 이상이 인정되는 경우에는 투여를 중지하거나 적절한 처치를 합니다. 특히 신기능 장애를 지니고 있는 환자에서 쉽게 나타날 수 있으므로 주의하십시오.
- 8) 내분비계 : 매우 드물게 여성형유방 및 첫보비과다와 같은 유방관련 증상 및 상태, 기억력인 발기부전 및 성욕감퇴 등이 보고된 바 있습니다. 이 약과의 연관관계는 확립되지 않았습니다.
- 9) 근골격계 : 매우 드물게 관절통 및 근육통이 나타날 수 있습니다. 근육통, 무력감, CK (CPK) 상승, 혈중 및 오줌 피로콜로빈의 상승을 특징으로 하는 횡문근융해증이 나타날 수 있으므로 이상이 인정되는 경우에는 투여를 중지하십시오.
- 10) 피부 : 드물게 피부발진, 매우 드물게 경한 다형홍반 및 탈모증이 보고된 바 있습니다.
- 11) 기타 : 드물게 설염, 때때로 피부가려움이 나타날 수 있다. 기타 H₂수용체 길항제에서 스타틴스-존슨 증후군(피부접막간증후군), 리엘 증후군(중증성표피괴사증), 재생불량성빈혈, 방실차단 등의 심자전, 매우 드물게 급성 간질성 신염이 나타났다는 보고가 있습니다.
4. 일반적 주의
 - 1) 치료에 있어서는 경과를 충분히 관찰하여 질환의 상태에 따른 치료상 필요한 최소한의 사용에 그치고 이 약으로 효과가 보이지 않는 경우에는 다른 요법으로 바꿉니다. 또한 혈액상, 크기, 신기능, 신기능 등에 주의하십시오.
 - 2) 노인 만성 폐질환, 당뇨병, 면역이 약화된 환자에서 유행성 폐렴의 발병 위험도가 증가할 수 있습니다. 대다수 의학 연구에서 H₂수용체 길항제를 복용하는 환자는 중증 폐렴을 진단된 환자보다 유행성 폐렴 발병의 상대 위험도가 1.631입니다(95% CI, 1.07-2.48).
5. 상호작용
 - 1) 이 약은 다른 약물의 흡수, 대사 또는 신배설에 영향을 줄 수 있습니다. 이러한 약동학적 변화로 영향받은 약물의 용량 조정 또는 투여 중지나 필요할 수 있습니다. 상호작용은 다음과 같이 몇몇 약물에 의해 발생됩니다.
 - ① 시토크롬 P450과 관련된 복합기능옥시데아제계의 억제 : 일반적 치료 용량에서, 이 약은 이 효소계에 의해 비활성화되는 약물 (에피타이페, 리도카인, 페니토인, 프로프라놀롤, 테오필린)의 작용을 증가시키지 않습니다. 쿠마린 항응고제(에파라틴)와 병용하여 시 프로프라놀롤의 시간의 변화가 보고된 바 있습니다. 쿠마린 항응고제의 치료 작용이 증가 때문에 이 약과의 병용투여 기간에는 프로프라놀롤 시간의 증가 또는 감소를 면밀하게 모니터링합니다.
 - ② 신세노 분변 경성 : 이 약은 일부 양이온제로 제거되기 때문에, 동일 경로로 제거되는 다른 약물의 클리어런스에 영향을 줄 수 있습니다. 이 약 고용량(예:졸림가)제제된 증후군 치료시에 프로파인아미드 및 N-아세틸프로파인아미드의 배설을 감소시켜서 약물의 혈장 농도를 증가시킬 수 있습니다.
 - ③ 위 pH의 변화 : 어떤 약물의 생체이용률에 영향을 줄 수 있으며, 이는 흡수 증가(예: 트리아진올, 미다졸람, 클리피딘) 또는 흡수 감소(예:테코코나졸, 아자나비어, 팔리버딘, 제페타나비)를 유발할 수 있습니다.
 - 2) 이 약이 이차적인, 메트로니다졸과 상호작용을 일으킨다는 증거는 없습니다.
 - 3) 고용량(2g)의 수크랄라이트와 이 약을 병용투여할 경우 이 약의 흡수가 감소될 수 있으므로 2시간 정도의 간격을 두고 따로 복용합니다.
6. 임부 및 수유부에 대한 투여
 - 1) 이 약은 태반을 통과하고 임신중의 투여에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여하십시오.
 - 2) 이 약은 모유중으로 이행하므로 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 수유중에 이 약을 투여하십시오.
7. 소아에 대한 투여
 - 1) 소아에 대한 안전성은 확립되어 있지 않습니다(사용경험이 적습니다).
8. 임상검사와의 영향
 - 1) 임상검사에 의한 요단백검사에서 위양성이 나타날 수 있으므로 실험실실사법으로 검사하는 것이 바람직합니다.
9. 과량투여시의 처리
 - 1) 1일 6g까지 과량 투여한 바가 있었으나, 특히 중대한 영향은 나타나지 않았습니다.
 - 2) 이 약은 매우 특이적으로 작용하며, 이 약을 과량투여했을 때 예상되는 특별한 문제는 없으나 적절한 대증요법 및 보조요법이 필요합니다. 이러한 경우에는 최초 위세척을 하고 동시에 적절한 치료를 하십시오. 필요하다면 혈액투석에 의해 제거하십시오.
10. 보관 및 취급상의 주의사항
 - 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
 - 2) 다른 용기에 바꾸어 넣는 것은 사고 원인이 되거나 품질 유지 면에서 바람직하지 않으므로 이를 주의하십시오.
11. 기타
 - 1) 이 약은 위양 증상을 은폐할 수 있으므로 특히, 위궤양 환자, 새끼개 또는 최근 변화된 소화불량을 보이는 중년 이상의 환자는 치료전에 약성이 아닌 것을 확인한 후 투여하십시오.
 - 2) 동물의 흡수 - 배설시험에서 안구 밀라나과의 친화성이 있다는 보고가 있으므로 장기 투여시 인과적 검사를 하는 등 주의하여 투여하십시오.

【품목기준코드】 2004030007 【지정방법】 차광기밀봉기, 실온(1~30℃) 보관
 【포장단위】 자외선차광기
 【문의전화】 (주)티디에스팜 (031) 8018-7337
 【제조자】 비발엔시아인스(주), 충북 제천시 왕암동 924번지
 【제조의뢰자】 (주)티디에스팜, 충북 음성군 음성읍 한빛로 69번길 12-13
 【사용(유효)기간】 제조일로부터 36개월

개정일자 : 2012년 5월 4일

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 위한 제품입니다. 만약 유통과정에서 사용기한이 경과되었거나 변질, 변색, 오염 및 손상된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 즉시 교환하여 드립니다.
 ※ 약품을 사용하시기 전에 첨부문서를 주의있게 읽어와 하, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.
 ※ 본 의약품 첨부문서 개정일일 이후에 변경된 내용에 관해서는 자사 홈페이지(www.tdspharm.com) 또는 이드트(krd.fda.go.kr)의약품 정보에 명시되어 있으며, 또한 본사(031-8018-7337)로 문의