

케이세틸정

(염산아세틸엘카르니틴)

[원료약품의 분량] 이 약 1정 중

염산아세틸엘카르니틴(아세틸엘카르니틴염으로서 500mg)[KPC] - - - - - 590mg

[성상] 백색의 장방형의 제피정

[효능 및 효과] 일차적 퇴행성 질환, 뇌혈관 질환에 의한 이차적 퇴행성 질환

[용법 및 용량] 1회 1정, 1일 2~3회 복용

[사용상 주의사항]

1. 금 기 : 이 약에 대해 과민반응을 나타내는 환자에는 투여하지 말 것.
2. 부작용 : 이 약의 복용시 드물게 흥분작용이 나타나는 경우가 있으나 체내의 약용량이 감소함에 따라 이런 증상은 바로 손실된다.
3. 임부예의 투여 : 동물실험에서의 태아독성은 보고된 적이 없지만 임신 초기 3개월 기간과 수유기의 여성은 꼭 필요한 경우에만 의사와 감독하에서 복용하십시오.
4. 다른 약물과의 상호작용은 없는 것으로 알려져 있다.

※ 저장방법 및 사용기간 : 기밀용기, 실온(1~30℃)보관, 제조일로부터 24개월

※ 포장단위 : 100T(PTP), 60T(PTP)

※ 제품문의처 : 02-3485-0434

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품이며, 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

※ 의약품을 사용하기 전에 사용자께서는 설명서를 주의깊게 읽으시고, 설명서를 의약품과 함께 보관하십시오.

※ 설명서 작성연월일 : 2010.10.12

※ 이 제품 설명서 작성(개정)연월일 이후 변경된 내용은 <http://ezdrug,kfda.go.kr> 의 정보마당을 통해 확인 하실 수 있습니다.

제조원·판매원



한국콜마

충남 연기군 전의면 신정리 618-3