



글리멜 정 1mg, 2mg, 3mg, 4mg
[글리메피리드]



Glimepiride Tab. 1mg, 2mg, 3mg, 4mg
[Glimepiride]

[원료약품 및 분량]

글리멜정 1mg : 이 약 1정(85mg) 중
유효성분 : 글리메피리드(KP) 1.0mg
첨가제 : 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 유당수화물, 적색산화철, 전분글리콜산나트륨, 포비돈
글리멜정 2mg : 이 약 1정(169.53mg) 중
유효성분 : 글리메피리드(KP) 2.0mg
첨가제(타르색소) : 청색2호알루미늄베리크
기타 첨가제 : 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 유당수화물, 황색산화철, 전분글리콜산나트륨, 포비돈
글리멜정 3mg : 이 약 1정(254mg) 중
유효성분 : 글리메피리드(KP) 3.0mg
첨가제 : 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 유당수화물, 황색산화철, 전분글리콜산나트륨, 포비돈
글리멜정 4mg : 이 약 1정(338.66mg) 중
유효성분 : 글리메피리드(KP) 4.0mg
첨가제(타르색소) : 청색2호 알루미늄베리크
기타 첨가제 : 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 유당수화물, 전분글리콜산나트륨, 포비돈

[성상]

글리멜정 1mg : 이 약은 담황색의 장방형 정제입니다.
글리멜정 2mg : 이 약은 녹색의 장방형 정제입니다.
글리멜정 3mg : 이 약은 황색의 장방형 정제입니다.
글리멜정 4mg : 이 약은 담청색의 장방형 정제입니다.

[효능·효과]

- 이 약은 제 2형 당뇨병 환자의 혈당조절을 향상시키기 위해 식사요법 및 운동요법의 보조제로 투여합니다.
- 이 약은 다음의 경우 병용요법으로 투여합니다.
 - 경구용 혈당강하제로 혈당조절이 적절하게 이루어지지 않는 경우, 인슐린과 병용투여
 - 설포닐우레아제 또는 메트포르민 단독요법으로 혈당조절이 적절하게 이루어지지 않는 경우, 메트포르민과 이 약을 병용투여

[용법·용량]

- 각 환자에 대해 개별적으로 조절합니다. 물 1/2컵 이상과 함께 씹지 않고 삼키니다. 이 약은 1일 1회 경구투여합니다. 이 약은 아침식사 전 또는 첫번째 식사전전에 복용해야 합니다. **이 약 복용 후에 식사를 거르지 않는 것이 매우 중요합니다.**
- 단독요법
 - 초기용량 및 용량결정
이전에 약물을 투여 받은 적이 있는 환자에 대해서는 1일 1회, 글리메피리드로서 1mg으로 투약을 시작합니다. 필요할 경우, 1 ~ 2주의 간격을 두고 1mg씩 용량을 증가시킵니다. 일반적으로 4mg 이상의 용량을 투여했을 때 추가작용과는 거의 없지만, 몇몇 환자에서는 6mg(또는 8mg)까지 증량시킴으로써 더 나은 대사조절을 보였습니다. 1일 4mg 투여가 실패하면, 먼저 인슐린 요법으로의 전환을 고려해 보고, 그렇지 않으면 인슐린 또는 기타 경구용 당뇨병약과의 병용을 고려해야 합니다.
 - 2차 용량조절
치료가 진행됨에 따라 당뇨병 조절상태가 호전됨으로써 이 약의 필요량이 감소할 수 있습니다. 그러므로 저혈당을 피하기 위해 감량이나 이 약의 투여중단에 필요할 수도 있습니다. 체중감소, 생활방식의 변화, 또는 저혈당 또는 고혈당을 일으킬 위험성을 증가시킬만한 기타요인이 발생했을 때도 용량조절을 고려해야 합니다.
 - 다른 경구용 혈당강하제에서 이 약으로의 전환
이 약 및 다른 경구용 혈당강하제 사용에 정해진 용량 상관관계는 없습니다. 다른 경구용 혈당강하제를 투여하다가 이 약으로 전환할 경우에는 초기용량 한에서 제시한 방법을 따르는 것이 좋습니다. 즉, 1일 1mg으로 투여를 시작하고 1 ~ 2주 간격으로 용량을 조절할 수 있습니다. 이전에 투여하던 약물의 효력 및 작용시간적도를 고려해야 합니다.
 - 투약조절
이 약을 복용하는 동안, 혈당 또는/및 요당수준을 규칙적으로 측정해야 하고, 또한 당화헤모글로빈(HbA1c) 수준을 규칙적으로 측정하는 것도 권장됩니다. 일반적으로, 저혈당은 곧바로 당을 섭취함으로써 즉시 조절됩니다. 설포닐우레아제 약물을 투여했을 때 초기에 성공적으로 대처했음에도 불구하고 저혈당에 재발할 수 있습니다. 그러므로 환자를 주의 깊게 관찰해야 합니다. 심한 저혈당의 경우에는 의사의 즉각적인 처치 및 추적관찰이 필요하고 때때로 입원치료가 필요합니다.
 - 병용요법
 - 인슐린과의 병용요법
이 약과 인슐린의 병용요법은 2차적 실패 환자에게 사용하여 공복혈당(FBG)이 150mg/dL을 넘을 경우 인슐린과의 병용요법을 사용합니다. 이 약은 1일 1

- 12.0566g을 대상으로 실시한 시판 후 조사결과와 이상반응의 발현빈도율은 인과관계와 상관없이 1.2%(149명/12,056명)로 보고되었습니다. 저혈당증이 0.7%(102명, 90명)로 가장 많았고 이 다음은 어지럼 0.08%(10명), 간기능이상 0.07%(8명), 복통 0.06%(7명)의 순으로 나타났습니다. 이중 시판 전 임상시험에서 나타나지 않았던 새로운 이상반응으로 관절통, 소화불량, 얼굴부종이 각 2례, 발기불능, 탈모, 인면홍조, 위염이 각 1례씩 보고되었습니다.
- 일반적 주의
 - 최저의 혈당조절 상태를 이루기 위해서는 이 약의 규칙적인 복용뿐만 아니라 식사요법, 운동요법 그리고 필요한 경우 체중감량 등을 병행해야 합니다. 혈당조절이 충분해 이루어지지 않는 상태(고혈당)의 임상징후는 빈뇨, 갈증, 구갈, 피로감 등입니다.
 - 투약을 시작할 때 의사 또는 약사는 이 약의 효과 및 위험성, 그리고 소변의 단백뇨와 병행할 때 이 약의 효과 등을 환자에게 알려야 하고, 또한 환자의 적극적인 협력이 중요하다는 것을 강조해야 합니다.
 - 저혈당은 당(글루코스) 또는 설탕, 예를 들어 설탕물이나, 당이 첨가된 과일주스, 당이 첨가된 차 등을 섭취함으로써 대부분 즉시 조절됩니다. 이를 위해 환자는 최소 20 g 정도의 당을 섭취 후대야해야 합니다. 저혈당의 위험성, 증상 및 치료, 저혈당 발생시인을 환자 및 환자가족에게도 설명합니다. 합병증을 피하기 위해 다른 사람의 도움을 필요로 할 수도 있습니다. 인공감미제는 저혈당을 조절하는데 효과가 없습니다.
 - 설포닐우레아제 약물을 투여했을 때 초기에 성공적으로 대처했음에도 불구하고 저혈당이 재발할 수 있습니다. 그러므로 의사 또는 약사는 환자를 세심하게 관찰해야 합니다. 심한 저혈당의 경우에는 의사의 적극적인 처치 및 추적관찰이 필요하고, 경우에 따라서는 입원치료가 필요합니다.
 - 다른 의사 또는 약사에게 치료받은 경우에, 임신시, 사고 후, 공황일에 있을 때도 환자는 자신의 당뇨병 상태 및 이전의 투약경험 등을 의에게 알려야 합니다.
 - 예외적인 스트레스(예: 외상, 수술, 발열성 감염증)에서 혈당조절이 악화될 수 있으므로, 적절한 혈당 조절 상태를 유지하기 위해 일시적으로 인슐린 요법으로 전환합니다.
 - 투여하는 경우에는 소량부터 시작하여, 혈당, 요당을 정기적으로 검사하여(또한 당화헤모글로빈(HbA1c)의 비율을 규칙적으로 측정하는 것도 권장됩니다.) 약물의 효과를 확인하고 효과가 불충분할 경우에는 속히 다른 치료법으로 바꿉니다.
 - 특히 투여초기, 투여량변을 변경한 후 또는 이 약을 규칙적으로 복용하지 않았을 때 저혈당 또는 고혈당에 기인한 민첩성장애, 행동이상장애 등이 나타날 수 있으며, 이로 인해 운전능력, 기계조작능력 등에 영향을 줄 수 있습니다.
 - UGDP(University Group Diabetes Program)의 연구에 따르면, 설포닐우레아제 약물(톨부타미드 191.15g)을 장기 투여한 경우 식이요법 단독 또는 식이요법과 인슐린 병용투여의 경우와 비교하여 심장혈관적 장애에 의한 사망률이 유의하게 높은 것으로 나타났습니다.
 - 용혈성 빈혈 : G6PD 결핍 환자가 설포닐우레아제 약물을 복용하면 용혈성 빈혈을 일으킬 수 있습니다. 글리메피리드는 설포닐우레아제에 속하므로 G6PD 결핍 환자에게 투여시 주의해야 하며 비설포닐우레아제 약물로의 교체를 고려해야 합니다.

[상호작용]

- 이 약 투여 중에 다른 약물을 병용투여하거나 다른 약물 복용을 중단한 환자에게 혈당조절이 변할 수 있습니다. 이 약 또는 기타 설포닐우레아제 약물의 사용경험에 의하면 다음과 같은 상호작용을 고려하여야 합니다.
- 이 약은 CYP2C9에 의해 대사됩니다. 그러므로 이 약과 CYP2C9 유도물질(예, 리팜피신) 또는 억제제(예, 플루코나졸)를 병용투여 할 경우에는 이러한 사항이 고려되어야 합니다.
 - 혈당강하작용을 증가시키는 약물 : 인슐린제제 및 기타 경구용 혈당강하제, 비스테로이드염진통제(NSAID), ACE억제제, 알로푸리놀, 단백동화스테로이드제, 남용조르겐제, 클로람페니콜, 쿠마린계 항응고제, 시클로포스파미드, 디소피라미드, 펜토미린, 페니라미놀, 피브레이트계 약물, 툴루옥세틴, 구아네티딘, 이소스파미드, MAO억제제, 니코틴산, 플루크로놀, 피라미딘설페실산, 페트시미린(고용량을 비경구투여할 경우), 페닐부타논, 아자프로파존, 옥시페루탄, 프로베나지드, 퀴놀론계 항생제, 살리실산제, 살핀피라진, 클로트리도마신, 설페아미드, 테트라사이클린계 항생제, 트리도쿠알린, 트로모스파미드, 교감신경 억제제
 - 혈당강하작용을 감소시키는 약물 : 아세타졸아미드, 바르비탈산제 약물, 코르티코스테로이드제, 디아옥사이드, 이노제, 에피네프린(아드레날린) 또는 기타 교감신경흥분제, 글루카곤, 완하제(장기간 복용), 니코틴산(고용량을 투여할 경우) 및 니코틴산 유도제, 에스트로겐, 프로게스테론, 경구용피임약, 페도타이진계 약물, 페니도민, 리팜피신, 갑상선호르몬제, 클로로포프마진, 이소니아지드
 - 혈당강하작용을 증가 또는 감소시키는 약물 : H2 수용체 길항제, 베타차단제, 클로니딘, 레세르핀
 - 베타차단제는 내당능을 저하시킵니다. 당뇨병 환자에서 내당능 저하는 대사조절을 변화시킬 수 있습니다. 베타차단제는 저혈당을 일으킬 위험을 증가시킬 수 있습니다(역조절 실패에 기인).
 - 저혈당에 대한 신체의 아드레날린성 역조절 징후를 감소 또는 차단시키는 약물 : 교감신경 차단제(예, 베타차단제, 클로니딘, 구아네티딘, 레세르핀 등)
 - 급성 또는 만성 알코올 섭취는 이 약의 혈당강하작용을 예상할 수 없는 방향으로 증가 또는 감소시킬 수 있습니다.
 - 이 약의 병용투여에 의해 쿠마린계 항응고제의 작용이 증가 또는 감소할 수 있습니다.
 - 담즙산 흡착제 : 콜레세비람(Colesevelam)은 글리메피리드에 결합하여 위장관계에서 글리메피리드의 흡수를 감소시킵니다. 콜레세비람(Colesevelam)

- 회 첫번째 식사와 함께 8mg을 투여하며, 인슐린은 저용량으로 시작하여 공복 혈당 측정치에 따라 대략 일주일 간격으로 증량합니다. 안정화되면, 가능한 한 낮마다 모세혈당을 모니터링 해야 합니다. 혈당과 당화헤모글로빈을 측정하면서 주기적으로 인슐린의 용량을 조절하는 것이 필요합니다.
- 메트포르민과의 병용요법
환자가 이 약의 최대용량에 적절히 반응하지 않을 경우, 메트포르민의 추가를 고려할 수 있습니다. 글리베클라미드, 글리피자이드, 클로프로파마이드, 톨부타미드 등의 기타 설포닐우레아제 제제와 메트포르민의 병용요법에 대해 발표된 임상정보가 존재합니다. 이 약과 메트포르민의 병용요법시 각각의 약물의 용량을 조절함으로써 원하는 혈당에 도달할 수 있습니다. 그러나 혈당조절을 위한 각 약물의 최소 유효용량을 알아야 하기 위한 노력이 이루어져야 합니다. 이 약과 메트포르민의 병용투여시 저혈당의 위험이 존재하며 위험이 증가할 수도 있습니다. 적절한 주의가 이루어져야 합니다.

[사용상의 주의사항]

- 다음 환자에는 투여하지 마십시오.
 - 인슐린 의존형(제1형) 당뇨병 환자(예, 케톤혈증의 병력을 가진 당뇨병 환자), 당뇨병성 케톤혈증, 당뇨병성 혼수 또는 전조수 환자
 - 이 약 및 이 약의 구성성분 또는 설포닐우레아제, 설페아미드계 약물에 대해 과민반응의 병력이 있는 환자
 - 중증 간기능장애 또는 중증 신기능장애 환자(사용 경험에 없습니다. 중증 간기능장애 또는 신기능장애 환자에서는 최적의 혈당조절을 이루기 위해 인슐린요법으로의 전환이 권장됩니다.)
 - 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성 및 수유부
 - 중증 감염증, 수술 전후, 중증 외상이 있는 환자(인슐린요법을 적용합니다.)(일반적 주의항 참고)
 - 설사, 구토 등 위장장애가 있는 환자(음식물의 흡수 부전에 의해 저혈당을 일으킬 우려가 있습니다.)
 - 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안됩니다.
- 다음 환자(경우)에는 신중히 투여하십시오.
투약 첫 주에는 저혈당의 위험성이 높으므로 특히 주의 깊게 모니터링할 필요가 있습니다. 저혈당을 일으킬 위험성이 높은 환자 또는 상태는 다음과 같습니다.
 - 비합조적 또는 협조불능(고령자에서 보다 자주 나타남)
 - 영양불량상태, 불규칙한 식사습관, 식사를 거른 환자
 - 근육운동과 탄수화물 섭취가 불균형을 이루는 환자
 - 식사를 변경했을 경우
 - 알코올섭취자, 특히 식사를 거른 환자의 경우
 - 신기능장애 환자(이 약의 혈당강하 작용에 좀 더 민감한 반응을 나타낼 수 있습니다.)
 - 간기능장애 환자
 - 이 약을 과량 복용한 환자
 - 비대장성 내분비계질환(예, 갑상샘이상, 뇌하수체전엽의 기능이상 또는 부신 피질 부전 환자) : 이들 질환은 당대사, 또는 저혈당에 대한 신체의 역조절에 영향을 미칠 수 있습니다.
 - 고령자
 - 기타 약물과의 병용투여(상호작용항 참고)이러한 경우 특히 주의 깊게 혈당을 모니터링할 필요가 있으므로, 환자는 의사 또는 약사에게 이러한 요인들 및 저혈당 증상을 겪은 적이 있는지 등에 대해 알려야 합니다. 만약 이러한 저혈당 위험요인이 존재할 경우에는 용량 또는 투약빈 전제를 조절할 필요가 있습니다. 투약도중 기타 질환이 발생하면 경우 또는 환자의 생활방식이 바뀔 경우에도 그러합니다. 점진적으로 진행된 저혈당, 고령자, 자율신경병 환자, 또는 베타차단제, 클로니딘, 레세르핀, 구아네티딘, 기타 교감신경차단제 등을 병용투여 받고 있는 환자의 경우에는 신체의 아드레날린성 역조절에 의해 저혈당의 제증상(이상반응항 참고)이 완화되거나 나타나지 않을 수도 있습니다.

[이상반응]

- 이 약의 임상시험 결과 및 기타 설포닐우레아제 약물에 대한 정보에 의하면, 다음의 이상반응을 고려해야 합니다.
- 저혈당 : 이 약의 혈당강하 작용의 결과로서 저혈당이 발생하거나 연장될 수 있습니다. 저혈당의 증상으로는 두통, 심한 배고픔, 구역, 구토, 피로, 수면 장애, 불안, 공격성, 지각력 저하, 민첩성 또는 행동적 저하, 우울, 혼란, 언어이상, 실어증, 시각장애, 진전, 불완전지체, 지각이상, 어지럼, 무력감, 자제력 상실, 일시적인 정신장애, 뇌전증, 의식상실 및 혼수, 말은 흐릿, 사맥 등이 있습니다. 또한 아드레날린성 역조절의 징후로서 발한, 차고 습한 피부, 불안, 빈맥, 고혈압, 두근거림, 현상성 심부정맥 등의 증상이 나타날 수 있습니다. 중증 저혈당의 임상증상은 뇌졸중과 유사합니다. 대부분의 경우 저혈당을 교정하면 임상증상은 사라집니다.
 - 특히 투여초기에 혈당치 변화에 따라 조절변화, 시야흐림 등 일시적인 시각 이상이 나타날 수 있습니다.
 - 저혈당관계 : 때때로 구역, 구토, 상복부의 포만감 또는 압박감, 복통, 설사 등의 소화기계 증상이 나타나는 경우가 있습니다.
 - 간장 : 빈도불명의 간내 효소 증가, 매우 드물게 간기능이상(예, 담즙분비장애, 황달) 및 간염이 나타날 수 있으며 간기능부전에 이를 수 있으므로 관찰을 충분히 하고, 이상이 나타나 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 합니다.
 - 혈액계 : 심각한 혈색소의 변화가 나타날 수 있습니다. 드물게 혈소판감소증, 매우 드물게 백혈구감소증이나 용혈성빈혈, 혈관구감소증, 과립구감소증, 무과립구증, 병혈구감소증이 나타날 수 있으며 다른 설포닐우레아제 약물에서 재발혈관성 빈혈이 나타났는데 보고가 있으므로 관찰을 충분히 하고, 이상반응이 나타난 경우 투여를 중지하고 적절한 처치를 합니다.
 - 시판 후 사용경험에서 빈도는 알려져 있지 않지만, 혈소판 수 10,000/μL 미만 및 혈소판감소성 질환을 동반하는 심각한 혈소판감소증이 보고되었습니다.
 - 과민반응 : 때때로 알레르기 또는 알레르기 유사반응(예, 가려움, 두드러기, 발진 등)이 나타나는 경우가 있습니다.
- 이러한 반응들은 대부분 경미하지만, 호흡곤란, 혈압강하 등을 수반한 심각한 반응으로 발전할 수 있고, 때로는 쇼크로 진행됩니다. 그러므로 두드러기가 나타나면 경우에는 즉시 의사에게 알려야 합니다. 설포닐우레아, 설페아미드 및 그 유도체와의 교차 알레르기 반응이 일어날 수도 있습니다.

시판 후 조사에서 이 약으로 치료한 환자에서 아니발락시스, 혈관부종 및 피부

GMT-7L019

- 을 투여하기 최소 4시간 전에 글리메피리드를 복용했을 때는 상호작용이 관찰되지 않았습니다. 그러므로 글리메피리드는 콜레세비람(Colesevelam)을 투여하기 최소 4시간 전에 복용해야 합니다.
- 임부 및 수유부에 대한 주의
 - 태아에게 위해를 끼칠 수 있으므로 임부에는 이 약을 투여하지 않도록 합니다. 임부 또는 임신할 계획이 있는 환자는 의사에게 알려야 하고, 임신 요법으로 전환하는 것이 좋습니다.
 - 젖에 대한 생식시험에서 모체의 혈청 및 우유와 지분의 혈청에서 우유인 농도의 글리메피리드도 관찰되었습니다. 설포닐우레아는 사람의 우유에도 분비되므로 신생아가 모유를 통해 이 약을 섭취하는 것을 방지하기 위하여 수유중의 여성에는 투여하지 않도록 합니다. 필요한 경우에는 인슐린요법으로 전환하거나 수유를 중단해야 합니다.
 - 젖에 대한 일부 시험에서 임신기간 및 수유기간 동안 고용량의 글리메피리드에 노출된 랫트의 자손이 상완골의 단축, 비후, 골극의 골격기형이 나타났습니다.
 - 소아에 대한 투여
18세 미만 소아 환자에 대한 안전성 및 유효성이 확립되지 않았습니다.
 - 고령자에 대한 투여
이 약은 신장을 통해 상당한 양이 배설되므로 신장기능이 감소된 고령자에 투여하는 경우 용량선택에 주의하여야 합니다.
 - 과량투여시 주의
 - 이 약의 과량투여로 저혈당을 일으킬 수 있습니다. 이 약의 위장흡수를 막기 위해 초기에는 구토를 유발시키고 다음에는 환자에게 활성탄(흡착제) 및 활성탄도움(하제)을 활용하고 있는 청량음료 또는 물을 많이 마셔야 합니다. 상당히 많은 양이 흡수된 경우, 위세척을 실시해야 하고 활성탄 및 활성탄도움은 나중에 사용해야 합니다.
 - 과다복용이 심각하여 저혈당성 혼수상태가 진단 또는 의심되는 경우, 환자에게 농도(50%) 포도당 주사액을 급속 정맥 내 주입해야 합니다. 이후 혈당을 100mg/dL 가 넘는 수준으로 유지시킬 수 있는 속도로 보다 희석된(10%) 포도당 주사액을 연속 주입합니다. 명백한 임상적 회복 후에도 저혈당에 재발할 수 있으므로, 최소한 24시간 내지 48시간 동안 환자를 면밀하게 모니터링해야 합니다.
 - 보관 및 취급상의 주의사항
 - 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관합니다.
 - 이 약품을 원래 용기에 꺼내 다른 용기에 보관하는 것은 약품용 용기에 의한 사고발생이나 약물의 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래 용기에 넣어 꼭 닫아 보관합니다.
 - 기타
 - 랫트에 대해 30개월간 완전한 식이상태에서 최대 5,000ppm의 용량으로 투여한 실험에서(표면적을 기준으로 사람에게 대한 최대 권장 용량의 약 340배) 발암성의 증거는 없었습니다. 마우스에서 24개월간 글리메피리드를 투여한 결과 용량과 관련된 만성적인 해당 자극의 결과로 판독되는 양성의 해당성종이 증가하였습니다. 이 실험에서 마우스의 신진항상에 대한 무영향 용량은 임신시 이 조건에서 320 ppm 또는 46 ~ 54mg/kg/day/실험군입니다. 이는 표면적을 기준으로 사람에게 대한 최대 권장용량인 1일 1회 8mg의 약 36배에 해당합니다.
 - 글리메피리드는 일련의 in vitro와 in vivo 돌연변이 실험에서 돌연변이가 없었습니다.
 - 최대 2,500mg/kg의 용량으로(표면적을 기준으로 사람에게 대한 최대 권장 용량의 약 7,700배) 노출된 수컷 마우스 수태력에 대한 글리메피리드의 영향은 없었습니다. 글리메피리드는 최대 4,000mg/kg의 용량으로(표면적을 기준으로 사람에 대한 최대 권장 용량의 약 4,000배) 투여하였을 때 수컷 및 암컷 랫트의 수태력에 영향을 미치지 않았습니다.

[저장방법] 기밀용기, 실온(~30℃) 보관

[포장단위]

글리멜정 1mg : 30정/병, 100정/병
글리멜정 2mg : 30정/병, 100정/병, 500정/병
글리멜정 3mg : 30정/병, 100정/병
글리멜정 4mg : 30정/병, 100정/병

[최신정보 확인방법]

최신의 품목허가 또는 신고사항은 식약처 온라인 약의약품 (http://drug.mfds.go.kr)에서 확인하실 수 있습니다.

[문의전화] 고객센터 : 080-920-1001

※ 본 약제 투약 후 부작용(이상반응)이 발생할 경우 한국약학품질안전관리원(1644-6223)으로 문의 및 보고하여 주시기 바랍니다.

㉔ 등록상표

- ※ 이 약을 사용하기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽으시고, 첨부문서를 함께 보관하시기 바랍니다.
※ 오·남용을 피하고 품질을 보충·유지하기 위해 다른 용기에 넣지 마십시오.
※ 사용·유지기간이 약품 포장에 표시된 기한·연분·오염·손상된 약품을 구입하였을 때에는 약국 개설자 및 약품 판매업자에 한하여 구입처를 통해 교환하여 드립니다.
※ 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거 교환 또는 보상 받을 수 있습니다.

GMT-7L019

첨부문서 작성 : 2004. 7

첨부문서 개정 : 2017. 11

본사 : 서울특별시 동대문구 천호대로 64
공장 : 충청남도 천안시 서북구 백석공단로 200-23 (2B, 3, 4B층)

東亞ST 동아에스티