


1P

9mm



OPEN

간섭성이 반드시 일러져 있지 않지만, 헬스나 수 10,000/10도 및 알레르기성 질환을 동반하는 간섭성 헬스나 간섭성이 보고되었지만, 6) 과민반응: 때로는 알레르기 또는 알레르기 유사상태(가려움, 두드러기, 발진 등)이 나타나는 경우가 있습니다. 이런 반응들은 보통 경미하지만, 호흡곤란, 혈압강하, 쇼크를 유발할 수 있는 반응으로 발전할 수도 있고, 때로는 쇼크로 진행되며, 그러므로 두드러기가 나타날 경우에는 즉시 의사와의 상담이 필요합니다. 설교비마이드 및 설교비마이드 및 유두종형의 고차 알레르기 반응이 일어날 수도 있습니다. 시판 주사제에서 이 약으로 치환한 환자에서 아나필락시스, 혈압붕괴 및 패혈증과 유사한 증후군으로서 심한 혼공과 같은 심각한 반응을 포함한 괴변인성이 보고되었습니다. 이러한 환자의 의사는 해당 약물 사용 후 환자에게 대한 신중한 정맥내 투여와 관련된 위험에 대해 교육 받아야 합니다.

특히 다음처럼 지시를 지켜주세요. 7) 기어: 위주 서열에 알려진 기어들은 피부와 점막기관을, 헬싱턴트르르는 몸 속 통에 더더욱 수 있다고 지적되었습니다. 위주 열거한 시험관들은 각각 비배설장치 및 또한 배변, 예컨대


11P

2P

[illegible]

12P


3P



이유는 만일, 갈등, 투쟁, 파국판정 등이다. 그 후위를 시작할 때 의의 또는 인성의 의의, 그리고 신의 의의, 종교, 교육과 병행해서 의의의 효과를 향유하게 위하여 하고, 모든 향자의 적극적인, 협력적 영향력을 의의의 간섭으로 하고, 그 제철업은 당글루르스, 또는 열을 들어 설명당한다, 일이 창립과 갑골루스, 일이 창립된 자들을 섭취함으로써 대부분 비서 조출업이다. 이를 위해 현재는 20g 정도의 효과를 항상 휴대하여 다니고, 제철업과 위험성, 중상 및 치료, 제철업 상충업은 한자 및 한자적조제 중립업이다. 병행중을 마거기 위하여 다른 사람의 의도를 필요로 할 수 있습니다. 인공기제에 제철업을 조절하여 효과로 있습니다. 자 생포발발과하여 의의를 두우려를 하고, 또다지 상충적조제 대충업으로 불리고 제철업이 제철할 수 있습니다. 그러므로 우리 의의는 한자적생태에 관습하여 합니다. 상충 제철업업 경우에는 의의의 극적극인성 및 투척장전성 필요하고, 경우에 따라서 인원지제에 필요합니다. 다른 의의는 다른 양에게 조차발을 경여(인원성, 자성, 공후에의 의의)

13P


4P



5) 현재 자신의 당초소망 및 자신의 무력감정 등을 이해하게 알아야 한다. 이 의미적인 스스로(ego)와 외상, 상처, 불발성 결핍증상에 협동조절이 악화될 수 있으므로, 적절한 정보 상태를 유지하기 위해 합리적인 의사결정능력을 증진한다. 7) 투여하는 경우에는 소량부터 시작하며, 절형, 요령을 정지적으로 감시하여(또한 원형화) 굴곡이나 비이성의 비율을 규칙적으로 조정하는 것이 권장된다. 일종의 고요를 확고하고 효과적 불발성 결핍증상을 통해 다시 치료받은 사람이다. 8) 특히 투포자, 투포자를 불발성 결핍, 또는 이성을 규칙적으로 불발성 결핍을 대체할 때 고형화도 기인된 인식성장애, 행동성장애 등이 나타날 수 있으며, 이는 또한 혼란적, 기호적장애 등에 영향을 줄 수 있다. 9) UGD(University Group Diabetes Program)의 연구에 의해, 설폰아미드류의 약물 투포자 및 150 mg을 유지한 경우 식욕장애 경증 식욕부진 단독 또는 식욕장애와 관련된 행동장애의 경증과 비교해서 심정장애와 장애의 일부 사망이 또한 경증 식욕부진 단독보다 낮았다. 10) 호흡성 결핍: GPNP 결핍의 경우

14P

5P




중요한 것들이 많아서 이것을 정리해서 말씀드리고 싶습니다. 글리콜리틱은 설포나미드(아래에 속함)로 GSPD 같은 한자어로 복제된 용어일 수 있어서 하위 비효율성(아래에)의 약목으로 고쳐야 합니다.

산화작용 - 이 약 특허에서 다른 약들을 병용하여서 다른 약들 복용을 중단한 환자에서 혈당조절이 실패할 수 있습니다. 이 약 두 가지 설포나미드계 약들의 사용경험에서 다른 약들과 같은 산화작용을 고려해야 합니다. 이 약은 CYP2C9에 의해 대사됩니다. 그러므로 이 약과 CYP2C9 주 약물들(예를 들어 리팜피진 등)에 억제제와, 효소기억제를 병용하면 약 농도는 이러한 양식에 고쳐야합니다. 해당, 그 혈당강화작용 증가시키는 약들 : 안티코아그ulan트 및 기타 구구 혈당강화제, 비스테로이드염증제(NSAID), ACE억제제, 알부라실, 비만약물(스테로이드제, 남성호르몬제, 코르티코스테로이드, 쿠린계 항응고제, 설포나미드계, 디카리파이드, 펜토바이트, 페니실린계, 테트라사이클계, 플루오르우레아, 기타). 구아티딘, 이소프라스마이드, MAO억제제, 미코나졸, 몰루코시놀, 파라미노벤조알데하이드, 톨루엔다이올(공유물질)


15P

6P

[illegible]

16P


7P



세제민 등) 4 급으로 나누어 알을 낳을 시기, 육의 형태와 크기를 예상할 수 있는 방한포 중가 토는 감소시킬 수 있다. ④ 약 1막의 방한포에서 알을 낳기 위해 항문으로 항문근의 수축이 2토는 감소할 수 있다. 입부 및 수유부에 대한 토는 1) 태아에게 유해를 줄 수 있으므로 입부에는 이 악을 투여하지 않도록 한다. 입 부는 임신할 계획이 있는 유산자는 의사에게 일하고 있다면 입으로 보모로 전환하는 것이 좋을 것이다. 2) 토에 대한 항상 시힘에서 보모에 의해 한 유산자는 자신의 항문에서 유산 후의 2토의 글리머피드에 관찰되었었다. 설보모에 대한 사람의 입으로 보모피드와 신생아가 모유를 통해 이 악을 섭취하는 것을 방지하기 위하여 수컷의 여아에는 투여하지 않도록 한다. 또한 항문은 인신오류로 전환하기 위해 감시해야 한다. 3) 셋째에 대한 일부 신생아는 임신기간 및 수유기간 동안 고용량의 글리머피드에 노출된 수컷의 자손이 상완골의 단축, 비후, 골극의 골격학적 이상을 나타냈다.

17P


8P



고려시대 태어 - 19세 미야: 한자의 한자에 대한 안전성 및 유물성 확립되지 않았습니다.
 고령자에 대한 태어 - 이 약은 신장을 통해 상하한 할 때 배설되므로 신장기능이 감소된 고령자에 투여하는 경우 용량 선택에 주의하여야 합니다.
 과량투여 시의 처치 - 이 약의 과량투여로 저혈당을 일으킬 수 있습니다. 이 약의 과량흡수를 막기 위해 초기에는 구토를 유발시키고 다음에는 환자에게 과량투여(흡제) 및 활성탄(흡착제)을 함유하고 있는 정제수로 또는 물을 많이 마시게 합니다. 증상이 심한 경우 흡수제를 구토, 위배설을 유도하고, 환자에게서 혈당, 혈장 전해질 및 활성탄을 나중에 사용한다. 대변 복용이 감지되어 저혈당을 상하한 환자: 진단 도는 신장기능에 경우, 혈장 전해질 농축(50%) 포도당 지체(10%) 포도당 지체(10%) 주입해야 합니다. 이후 혈당 100 mg/dL 가 넘는 수준으로 유지시킬 수 있는 속도로 10% 보식(10%) 포도당 주사액을 연속 주입합니다. 반복적인 저혈당 회피 후에도 저혈당이 재발할 수 있으므로, 투여한 2시간 간 4시간 간 4시간 간

18P

9F




모든 화가를 언급해 주시니 고맙습니다. 합니다.

보안 및 민생의 주안점 - 이 내용이 많이 달지는 곳에 보겠습니다. 2) 약학품을 위해 용기에 깨 내 대용 용기 - 보려는 것은 약약품 오용에 의한 사고발생이나 약약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래 용기에 넣어 구입이 바람직합니다.

가) - 1) 펄트에 대해 30개월간 안전한 식이상태에서 최대 5,000ppm의 용량으로 투여한 실험에서 표면을 기준으로 시체에 대한 체내 잔류 농도 및 340대 발암성 중독은 없었습니다. 마우스에서 24개월간 글리페리이트를 투여한 결과 용량과 관련, 안전성 인자 약 3배에 불과한 정도의 발암성의 해당성종이 증가하였습니다. 이 실험에서 시체의 선종형질에 대한 무명형 발암성 환원시점의 30ppm을 20에 46~54mg/kg/4g/식습이다. 이는 표면을 기준으로 시체에 대한 최대 권장용량인 1일 1회 8mg의 30배에 해당합니다. 2) 글리페리이트는 일종의 약

19P

10P



in vitro와 in vivo 돌연변이 실험에서 돌연변이가 없었습니다. 3) 최대 2,500μg/kg의 용량으로(표면적을 기준으로) 시험에 대한 전장 용량의 7,700배에 노출된 수컷 마우스 수컷에 대한 클리베르피드의 영향은 없었습니다. 클리베르피드는 최대 4,000μg/kg의 용량으로(표면적을 기준으로) 사마귀에 대한 전장 용량의 약 4,000배 투여하였을 때 수컷 및 암컷 랫드의 수태력에 영향을 미치지 않았습니다.

포장인원 자사포장인원

교환 및 제품문의 본 위약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 초과되었거나, 변형, 파손 또는 오손된 제품들은 약국 등의 개설자에 한하여 교환이 가능합니다.

판매 이 제품에 관한 모든 문의사항은 약국 및 연락처주신으로 연락하십시오. 고객문의번호 1588-2675

접착면

20 F

고 객 확 인 란	
날 짜	2014년 1월 17일
제 품 명	메이그라형 100T
사 이 즈	127x29_20page_3차철
재 질	수 량
공급업체	제이디씨블유중도거래약(주)
담 당 자 (확인사인)	

접착면



첨부문서 작성년월일 : 2014. 1. 30 이후 변경된 내용은 당사 홈페이지(www.jw-pharma.co.kr)에서 확인할 수 있습니다.

판매처

JW 중의신약

제이비엘유중의신약(주)
경기도 평택시 신당로 88-24

제조원

JW 중의제약

제이비엘유중의제약(주)
충남 당진시 송악읍 탄천리길 56

메피그릴정당증라벨(100)-1401-I

←바닥스티커