

소화기능 조절제

메부라틴 정 150mg (트리메부틴말레산염)

Trimebutine Maleate 150mg

일반의약품
분류번호: 02390

■ 원료약품 및 분량 : 1정 중

- 유효성분: 트리메부틴말레산염(KP) - 150mg
- 첨가제(동물유래성분): 유당수화물(소, 우유), 젤라틴(소, 가축내피)
- 기타 첨가제: 옥수수전분, 스테아르산마그네슘, 카르복시메틸셀룰로오스칼슘

■ 성상 : 흰색의 원형정제

■ 효능·효과

1. 주요효능·효과

- 1) 식도역류 및 열공(구멍, 틈새)헤르니아(탈장), 위·십이지장염, 위·십이지장장애에 있어서의 소화기능이상(복통(배아픔), 소화불량, 구역, 구토)
- 2) 과민성대장증후군 및 경련성 결장
- 3) 소아질한 : 습관성 구토, 비감염성 장관(창자)통과장애(변비, 설사), 동요(안절부절)자극, 수면장애

■ 용법·용량

성인 : 트리메부틴말레산염으로서 1회 100~200mg 1일 3회 식전에 경구투여한다.(먹는다, 복용한다)
연령(나이), 증상에 따라 적절히 증감한다.

■ 사용상의 주의사항

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.

이 약은 유당수화물을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당수화물 분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption)등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2. 부작용

- 1) 소화기계 : 드물게 변비, 설사, 복명(창자 가스소리), 구역, 구토, 소화장애, 구갈(목마름), 구내마비감 등이 나타날 수 있다.
- 2) 순환기계 : 드물게 심계항진(두근거림)이 나타날 수 있다.
- 3) 정신신경계 : 드물게 피로감, 졸음, 현기(어지러움), 권태감, 두통 등이 나타날 수 있다.
- 4) 간장 : 드물게 GOT, GPT상승이 나타날 수 있다.
- 5) 과민증 : 드물게 발진등이 나타날 수 있으므로 이러한 증상이 나타나는 경우에는 투여를 중지한다.

3. 임부에 대한 투여

임신중의 투여에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 치료상의 유익성이 위험성을 상회(웃돌, 웃돌다)한다고 판단되는 경우에만 투여한다.

4. 수유부에 대한 투여

수유중의 투여에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으므로 수유중인 부인에는 투여를 피하고 부득이 투여시는 수유를 중지한다.

■ 저장방법 : 밀폐용기, 실온(1~30℃) 보관

■ 사용기간 : 제조일로부터 36개월

■ 포장단위 : 10정/PTP, 30정/병, 100정/PTP, 200정/PTP, 1000정/병

- ※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 위한 제품입니다. 구입시 사용기한이 경과 하였거나 유통과정 중 변질·변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입하신 약국을 통하여 교환하여 드립니다. 제품에 관한 문의는 전화 070-4346-1213으로 하시기 바랍니다.
- ※ 본 의약품을 복용(사용)하기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽어야 하며, 첨부문서는 의약품과 함께 보관하여 주십시오.
- ※ 본 의약품에 대한 기타 정보는 식품의약품안전처 온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)의 '의약품검색'에서 확인할 수 있습니다.
- ※ 약은 어린이의 손이 닿지 않도록 보관하여야 합니다.

개정연월일 : 2017년 09월 21일

■ 제조자 : (주)넥스팜코리아 충북 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명4로 168-41



■ 판매자 : 광동제약(주) 경기도 평택시 산단로 114

 Kwangdong