

뮤코존 정

(메틸-N,S-디아세틸시스테인)

전문의약품

분류번호 222

기관지 질환 치료제

MUCOZONE Tablets

■ 원료약품 및 분량 : 1정 중

메틸-N,S-디아세틸시스테인(별규)-----200mg

■ 성 상

흰색의 원형 당의정

■ 효능·효과

다음 질환에서의 객담 배출 곤란 : 급성 기관지염 및 만성 폐기관지질환의 급성 발작

■ 용법·용량

성인 및 7세이상어린이: 메틸-N,S-디아세틸시스테인으로서 1회200mg을 1일 3회 경구투여한다.

■ 사용상의 주의사항

1. 다음과 같은 사람은 이약을 복용하지 말 것.

- 1) 신장애평자
- 2) 만 7세 미만의영아

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.

- 1) 기침 및/또는 가래를 제거하는 제제

3. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의 할 것.

- 1) 위장관(창자)에 아픈부위(소화성궤양)가 있는사람
- 2) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성(임상자료가 없어서 추천되지 않는다.), 수유부
- 3) 다른 약물을 복용하고 있는 사람
- 4) 고름, 화농성 가래가 있거나, 열이 나거나, 만성 기관지 및 폐 질환이 있는사람

4. 기타 이약의 복용(사용)시 주의할사항

- 1) 정해진 용법용량을 잘 지킬 것.
- 2) 여러 차례 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우 투여를 중지하고 약사 또는 의사와 상의할 것.
- 3) 소화장애 현상(복통, 구토, 설사)이 나타난 경우 복용량을 줄일 것.
- 4) 가려움, 두드러기홍반성 발진, 얼굴 부기와 같은 알레르기 피부 이상반응이 나타날 수 있다.

■ 저장방법

밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

■ 포장단위

30정, 200정

* 본 제품에 이상이 있을 경우 공정거래위원회에서 고시한 소비자분쟁해결기준에 따라 교환·환불 받을 수 있습니다.

* 의사 또는 약사의 지시에 따라 사용하십시오.

* 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한 또는 유효기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는
오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

이 첨부문서의 작성일(2013년 02월 20일)이후 변경된 내용은 당사 홈페이지(www.dongkoo.co.kr)나
소비자상담실 080-611-8690(수신자부담)로 문의하시어 확인할 수 있습니다.