

치질전문치료제

프라렉신 크림

(프라목신염산염)



「프라렉신크림」은 치질로 인한 가려움증, 항문주위 화끈감 및 불쾌감 등 치질의 제반증상을 제거하여 주는 우수한 효과와 안전성을 지닌 치질 전문 치료제입니다. 「프라렉신크림」의 주성분인 Pramoxine HCl은 미국 등지에서 20년이상 병원 처방되어 사용되어진 안전한 성분입니다.

[원료약품 및 그 분량] 1g 중

프라목신염산염(USP)	10mg
보존제 : 파라옥시벤조산프로필(KP)	0.5mg

[성 상] 백색의 크림제

[효능 · 효과] 치질로 인한 다음 증상의 일시적 완화 : 불쾌감, 작열감(화끈감), 가려움

[용법 · 용량]

성인 : 1일 3회까지 환부(질환 부위)에 직접 바른다.
12세 이하의 소아 : 의사와 상의한다.

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

[포장당량] 35g / 튜브

- * 본 의약품은 우수의약품 제조 및 품질관리 기준(KGMP)에 따라 엄격한 품질검사를 필한 제품입니다. 만약 구입 시 사용(유효)기한이 지났거나 변질 · 변패 · 오염되거나 손상된 의약품일 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.
- * 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관해 주십시오.
- * 사용(유효)기한이 지난 의약품은 사용(복용)하지 마십시오.
- * 이 약을 사용(복용)하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽고, 본 첨부문서를 이 약과 함께 보관하십시오.
- * 자세한 의약품 정보는 당사 홈페이지(<http://www.taiguk.co.kr>) 또는 식품의약품안전처 온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)을 참조하십시오.
- * 부작용 보고 : 한국의약품안전관리원(1644-6223)

첨부문서 개정 연월일 : 2017. 05. 31

일반의약품

분류번호 : 256

[사용상의 주의사항]

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하지 말 것.
이 약 및 이 약의 구성성분에 과민반응이 있는 사람
2. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.
 - 1) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성
 - 2) 의사의 치료를 받고 있는 환자
 - 3) 혈압강하제, 항우울약을 복용 중인 환자
3. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한한 이 첨부문서를 소지할 것.
 - 1) 이 약의 사용에 의해 발적(출혈되어 붉어짐), 부종(부기), 자극감 등의 증상이 나타나는 경우
 - 2) 7일 정도 사용하여도 증상의 개선이 나타나지 않을 경우
 - 3) 출혈이 있는 경우
 - 4) 사용 후에 증상이 심해지는 경우
4. 기타 이 약의 사용시 주의할 사항
 - 1) 정해진 용법, 용량을 잘 지킬 것.
 - 2) 이 약은 항문부위에만 사용하고 안과용으로는 사용하지 말 것.
 - 3) 소아에는 보호자의 지도 · 감독하에 사용할 것.
5. 저장상의 주의사항
 - 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
 - 2) 직사일광(햇빛)을 피하고 될 수 있으면 서늘한 곳에 보관할 것.
 - 3) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 따른 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.
 - 4) 회기 근처에 두지 않을 것.

제조사
 태극제약(주)

경기도 화성시 행남읍 제약공단3길 123
☎ 소비자상담전화 080-300-8282
🌐 <http://www.taiguk.co.kr>