

뉴젠비싸이모정

NewGen B-CYMO Tab.

【원료약품의 분량】 1정중

피리독신염산염 (KP)	50mg
시아노코발라민 (KP)	500 μ g
폴산 (KP)	250 μ g

【성 상】 분홍색의 원형정제

【효능·효과】

다음 증상의 완화 : 구각염, 구순염, 구내염, 설염, 습진, 피부염
다음 경우의 비타민 보급 : 임신·수유기, 병중·병후 체력 저하시

【용법·용량】

8세이상 어린이 및 성인 : 1일 2회, 1회 1정

【사용상의 주의사항】

- 다음 환자에는 투여하지 말 것
 - 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민증이 있는 환자
 - 3개월 미만의 영아
 - 이 약은 유당을 함유하고 있으므로 갈락토오스 불내성 (galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증 (Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애 (glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자 에게는 투여 하지 말 것
- 다음 환자에는 신중히 투여할 것
 - 의사의 치료를 받고 있는 환자
- 부작용
 - 이 약 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우에는 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의 합니다.
 - 구역, 식욕부진, 복부팽만감
 - 피리독신을 1일 500mg~2g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상 (neuropathy : 말초시경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있다.
 - 엽산이 부족한 환자에게 비타민 B12를 1일 10 μ g 이상 투여할 경우 혈액학적 반응이 나타날 수 있다.
- 일반적 주의
 - 정해진 용법·용량을 잘 지킨다.
 - 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도·감독하에 투여한다. (어린이 용법이 설정되어 있는 제제)
 - 1개월 정도 투여하여도 증상이 개선이 없을 경우에는 의사 또는 약사와 상의한다.
- 상호작용
 - 이 약을 투여할 경우에는 레보도파와 병용투여하진 않는다.
- 저장상의 주의사항
 - 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
 - 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여 보관한다.
 - 오·남용을 피하고, 품질을 보호·유지하기 위해 다른 용기에 넣지 않는다

【포장단위】 300정

【저장방법】 차광기밀용기, 실온(1~30℃)보관

*사용기한이 지난 의약품은 사용하지 마십시오.

*첨부문서를 읽고, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.

*본 의약품은 우수 의약품제조관리기준 (KGMP)을 필한 제품입니다. 만약 사용기한이 경과되었거나 유통과정중 변질, 변색 또는 오손된 제품을 구입했을 때에는 구입한 약국이나 병·의원을 통해 교환해 드립니다. 기타 자세한 문의사항은 당사 학술개발부(Tel : 02-580-5900(대))로 문의하여 주시기 바랍니다. 제품의 변경사항은 당사 홈페이지(www.newgenpharm.com)의 각 제품란에 기재되오며, 의약품용어 설명 및 기타 자세한 의약품정보는 이지드럭(<http://ezdrug.kfda.go.kr>)→[정보마당]→[의약품등 정보]를 참고하시기 바랍니다.

약은 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관해야 합니다.

생명공학 제약기업
newgen (주) 뉴젠팜
전라북도 익산시 석암동 649
우수 의약품제조관리기준
KGMP 적격 지정업체