

중추성 근이완제

알페손정 50mg

(에페리손염산염)

【원료약품 및 그 분량】이 약 1정 중

유효성분 : 에페리손염산염 (JP).....50mg

첨가제 (동물유래성분) : 유당수화물 (소, 우유), 젤라틴 (소, 가축 안쪽부위)

결합제 : 히드록시프로필셀룰로오스

당의제 : 백당, 침강탄산칼슘, 탈크, 히프로멜로오스

부형제 : 구연산칼슘, 투디프레스, 미결정셀룰로오스, 크로스카르멜로오스나트륨

시상제 : 카르나우바납

유타제 : 스테아르산마그네슘

【성상】

흰색 원형의 당의정

【효능·효과】

- 근골격계 질환에 수반하는 동통성 근육연축 : 경간완충증, 견관절주위염, 요통
- 신경계 질환에 의한 경직성 마비 : 뇌혈관장애, 경직성 척수마비, 경부척추증, 수술후 후유증 (뇌·척수종양 포함), 외상후유증 (척수손상, 두부외상), 근위축성 측색경화증, 뇌성마비, 척수소뇌변성증, 척수혈관장애, 아급성 척수서신경병변, 기타의 뇌척수질환

【용법·용량】

◎ 성인 : 에페리손염산염으로서 1회 50mg, 1일 3회 식후에 경구투여 한다. 연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

【사용상의 주의사항】

- 다음 환자에는 투여하지 말 것. - 1) 이 약에 과민증 환자 2) 중증의 근무력증 환자 3) 이 약은 유당수화물을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성 (galactose intolerance), Lapp유당분해효소 결핍증 (Lapp lactose deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애 (glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.
- 다음 환자에는 신중히 투여할 것. - 1) 약물과민증의 병력이 있는 환자 2) 간장애 환자 (간기능을 악화시킬 수 있다.)
- 부작용 - 1) 속 : 드물게 속을 일으킬 수 있으므로 관찰을 충분히 하여 증상이 나타나는 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다. 2) 간장 : 드물게 ALT, AST, ALP의 상승 등이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하여 이상이 인정되는 경우에는 투여를 중지하는 등 적절한 처치를 한다. 3) 신장 : 드물게 단백뇨, BUN의 상승 등이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하여 이상이 인정되는 경우에는 투여를 중지하는 등 적절한 처치를 한다. 4) 혈액 : 드물게 빈혈 등이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하여 증상이 나타나는 경우에는 투여를 중지하는 등 적절한 처치를 한다. 5) 과민증 : 때때로 발진, 드물게 가려움 등이 나타날 수 있다. 6) 정신신경계 : 때때로 불면, 졸음, 두통, 사지마비, 드물게 몸의 굳어짐, 사지떨림 등이 나타날 수 있다. 7) 소화기계 : 때때로 구역, 구토, 식욕부진, 위부불쾌감, 구갈, 변비, 설사, 복통, 드물게 복부팽만감, 구내염 등이 나타날 수 있다. 8) 비뇨기계 : 드물게 요폐, 요실금, 잔뇨감이 나타날 수 있다. 9) 전신증상 : 때때로 무력감, 비틀거림, 전신권태감, 드물게 어지러움, 근긴장저하 등이 나타날 수 있다. 10) 기타 : 때로 안면홍조, 드물게 발한, 부종이 나타날 수 있다. 11) 국내 시판 후 수집된 중대한 이상사례 분석·평가 결과 확인된 이상사례는 다음과 같다. 다만, 이로서 곧 해당성분과 다음의 이상사례 간에 인과관계가 입증된 것을 의미하는 것은 아니다. • 면역계 : 아나필락시스반응 12) 의약품 시판 후 이상사례 보고자료 (1989~2018년 12월)를 토대로 실마리정보 분석·평가 결과 새로 확인된 이상사례는 다음과 같다. 다만, 이로서 곧 해당성분과 다음의 이상사례 간에 인과관계가 입증된 것을 의미하는 것은 아니다. • 피부 및 피하조직계-혈관부종 13) 독성 표피 괴사 용해 및 점막-피부-눈 중후군 (스티븐스-존슨 중후군) : 에페리손염산염은 독성표피괴사용해 및 점막-피부-눈 중후군 등 심각한 피부 이상을 유발할 수 있기 때문에, 발열, 홍반, 물집, 가려움, 눈충혈, 구내염 등의 증상이 나타나는지 잘 관찰하여야 하고, 이러한 증상이 나타나는 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.
- 일반적 주의 - 1) 이 약 투여중에 무력감, 비틀거림, 졸음 등이 나타날 수 있으므로, 이러한 경우에는 감량 또는 투여를 중지한다. 2) 졸음, 주의력·집중력·반사운동능력 등의 저하가 나타날 수 있으므로 이 약을 투여중인 환자는 자동차운전 등 위험을 수반하는 기계조작을 하지 않도록 주의한다.
- 상호작용 - 이 약의 유사약물인 염산테라손과 메토카르바몰을 병용시 시조절장애가 나타났다는 보고가 있다.
- 임부 및 수유부에 대한 투여 - 1) 임신중의 투여에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여한다. 2) 수유부에는 투여를 피하는 것이 바람직하나 부득이하게 투여할 경우에는 수유를 중단한다.
- 소아에 대한 투여 - 소아에 대한 안전성이 확립되어 있지 않다 (사용경험이 적다).
- 고령자에 대한 투여 - 일반적으로 고령자에서는 생리기능이 저하되어 있으므로 감량하는 등 주의한다.

【저장방법】 밀폐용기, 실온 (1~30℃) 보관

【포장단위】 30정/병, 300정/병

【제조회사】 유니메드제약(주) - 충남 아산시 실목로 110-27

【제조사】 영종제약(주) - 인천광역시 남동구 함박로 333

첨부문서 작성년월일 : 2022. 03. 25

※ 이 의약품은 엄격한 품질관리를 펼친 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질·변태 또는 오손된 제품은 약국·병의원 등의 개설자에 한하여 교환하여 드립니다.

※ 본 첨부문서 작성일자 이후 변경된 내용은 아래의 유니메드제약 홈페이지 또는 고객센터를 통해 확인하실 수 있습니다.

※ 부작용보고 및 피해구제 신청 : 한국약품안전관리원 (1644-6223)

홈페이지 (www.unimed.co.kr) ☎ 고객센터 : 080-500-5100

UNIMED 유니메드제약

서울특별시 송파구 삼전로 69 (잠실동) 유니메드빌딩