

잔시큐 정75mg

(라니티딘염산염)

일반 의약품
분류번호 232

복용이 간편한 위염·속쓰림 치료제

ZANCI-Q Tablets 75mg

- **원료약품 및 분량** : 1정 중
유효성분 : 라니티딘염산염(USP) -----84mg
(라니티딘으로서 75mg)
첨가제(타르색소) : 적색40호(AL), 청색1호(AL), 황색203호(AL)
기타첨가제 : 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 이산화규소, 오파드라이분홍색(80W44083), 크로스카르멜로오스나트륨
- **성상**
분홍색의 오각형 필름코팅정제
- **효능·효과**
위산과다, 속쓰림, 심트림
- **용법·용량**
16세 이상 1회 1정(75mg), 1일 2정(150mg)까지 복용할 수 있다.
- **사용상의 주의사항**
 1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것
 - 1) 이 약의 성분에 과민증의 병력이 있는 환자
 2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 약사와 상의할 것
 - 1) 음식을 삼키기 어렵거나 삼킬 때 통증이 있는 경우 및 토혈(혈액구토)이나 혈변이 있는 경우
 - 2) 속쓰림 증상이 3개월 이상 지속되는 경우
 - 3) 속쓰림 증상이 어지러움, 식은땀 또는 현기증과 함께 나타나는 경우
 - 4) 짧은 호흡과 함께 가슴 또는 어깨 통증을 동반하는 경우
 - 5) 가슴통증이 빈번히 나타나는 경우
 - 6) 예상치 않은 체중감소, 오심(구역), 구토, 위장과 통증 등의 증상이 나타나는 경우
 - 7) 비스테로이드성 소염진통제를 복용하고 있는 경우
 - 8) 약물들에 대한 과민증의 병력이 있는 환자
 - 9) 신장에 환자(혈중 농도가 증가될 수 있다)
 - 10) 간장애 환자
 - 11) 고령자
 - 12) 급성 포르피린증 병력이 있는 환자
 - 13) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성 (이 약은 태반을 통과하고 임신중의 투여에 대한 안전성은 확립되어 있지 않다.)
 - 14) 수유부 (이 약은 모유 중으로 이행한다.)
 - 15) 다음의 약물을 복용하는 경우(상호작용) : 이 약은 다른 약물의 흡수, 대사 또는 신배설에 영향을 줄 수 있다. 이러한 약동학적 변화로 영향 받는 약물의 용량 조정 또는 투여 중지가 필요할 수 있다. 상호작용은 다음과 같은 몇몇 기전에 의해 발생된다. :
 - ① 시토크롬 P450과 관련된 복합기능유시게나아제계의 억제 : 일반적인 치료 용량에서, 이 약은 이 효소계에 의해 비활성화되는 약물(예, 디아제팜, 리도카인, 페니토인, 프로프라놀롤, 테오필린)의 작용을 증강시키지 않는다. 쿠마린 항응고제(예, 와파린)와 병용투여 시 프로트롬빈 시간의 변화가 보고된 바 있다. 쿠마린 항응고제의 치료 지수가 좁기 때문에, 이 약과의 병용투여 기간에는 프로트롬빈 시간의 증가 또는 감소를 면밀하게 모니터링한다.
 - ② 신세뇨관 분비 경쟁 : 이 약은 일부 양이온계로 제거되기 때문에, 동일 경로로 제거되는 다른 약물의 클리어런스에 영향을 줄 수 있다. 이 약 고용량(예, 졸렐링-엘리스 중후군 치료 시)은 프로카인아미드 및 N-아세틸프로카인아미드의 배설을 감소시켜 이들 약물의 혈장 농도를 증가시킬 수 있다.
 - ③ 위 pH의 변화 : 어떤 약물의 생체이용률에 영향을 줄 수 있으며, 이는 흡수 증가(예, 트리아졸람, 미다졸람, 글리피피지드) 또는 흡수 감소(예, 케토코나졸, 아타자나비어, 델라비리딘, 게피티니브)를 유발 할 수 있다.
 3. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것
 - 1) 증상이 지속되거나 악화되는 경우
 - 2) 이 약은 14일 이상 복용하지 않는다.
 - 3) 이 약의 복용으로 아래와 같은 이상반응이 보고되었으므로, 이러한 증상이 나타나는 경우 복용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의한다.
 - ① 속: 아나필락시스 속
 - ② 과민증: 두드러기, 혈관신경부종, 발진, 발열, 기관지경련, 저혈압, 흉통
 - ③ 혈액: 과립구감소증, 혈청크레아티닌치 상승, 백혈구감소증, 혈소판감소증, 골수형성지하증, 골수무형성증, 재생불량성 빈혈, 무과립구증, 범혈구감소증, 후천성 면역결핍증, 호산구증가증
 - ④ 간장: 간기능장애(AST, ALT, γ-GTP, ALP치의 상승), 간염
 - ⑤ 순환기계: 서맥(느린맥), 방실블록, 빈맥, 혈관염
 - ⑥ 소화기계: 변비, 구역, 구토, 복부팽만감, 복통, 식욕부진, 설사, 체장염

- ⑦ 정신신경계: 어지러움, 졸림, 경련, 두통, 두중(머리무거움), 불면, 흥분, 불안, 가역적 정신혼동, 우울증, 환각, 흐린 시력, 불수의 운동장애, 의식장애, 경련, 간대성 근경련
 - ⑧ 내분비계: 여성형유방, 젖분비과다, 가역적인 발기부전, 성욕감퇴
 - ⑨ 근골격계: 관절통, 근육통, 횡문근융해증(근육통, 무력감, CK 상승, 혈중 및 요중 미오글로빈의 상승이 특징임)
 - ⑩ 피부: 피부발진, 다형홍반, 탈모증
 - ⑪ 기타: 설염(혀염), 피부가려움, 스티븐스-존슨 증후군(피부점막만중후군), 리엘 증후군(중독성표피괴사증), 재생불량성빈혈, 방실차단 등의 심저단, 급성 간질성 신염
4. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항
 - 1) 이 약의 투여로 위암에 의한 증상이 은폐될 수 있으므로 증상완화 목적으로 일시적으로만 사용한다.
 - 2) 이 약이 아목시실린, 메트로니다졸과 상호작용을 일으킨다는 증거는 없다.
 - 3) 고용량(2g)의 수크랄페이트와 이 약을 병용투여할 경우 이 약의 흡수가 감소될 수 있으므로 2시간 정도의 간격을 두고 따로 복용한다.
 - 4) 이 약을 과량투여한 경우는 적절한 대증요법 및 보조요법이 필요하다. 이러한 경우에는 최토, 위세척을 하고 동시에 적절한 치료를 한다. 필요하다면 혈액투석에 의해 제거한다.
 - 5) 알코올이 함유된 음료와 복용하지 말 것
 - 6) 이 약을 투여 후 투약 전과 신체 기능에 변화가 있는 경우 의사 또는 약사와 상담한다.
 - 7) 고령자, 만성 폐질환, 당뇨병, 면역이 약화된 환자에서 유행성 폐렴의 발병 위험도가 증가할 수 있다. 대규모 역학 연구에서 H₂ 수용체 길항제를 복용하는 환자는 치료를 중단한 환자보다 유행성 폐렴 발병의 상대 위험도가 1.63이었다. (95% CI, 1.07-2.48)
 - 8) 시험지법에 의한 요단백 검사에서 위양성이 나타날 수 있다.
 5. 저장상의 주의사항
 - 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것
 - 2) 의약품은 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용에 따른 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것
 - **자장방법**
차광밀폐용기, 건조한 장소에서 실온(1~30℃)보관
 - **사용기간**
제조일로부터 36개월
 - **포장단위**
100정 (10정/alu·alu X 10)
 - **제조원**
(주)동구바이오제약, 경기도 화성시 향남읍 제약공단 2길 18

- * 본 제품에 이상이 있을 경우 공정거래위원회에서 고시한 소비자분쟁해결기준에 따라 교환·환불 받을 수 있습니다.
- * 의사 또는 약사의 지시에 따라 사용하십시오.
- * 본 의약품은 엄격한 품질관리를 통한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한 또는 유효기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

이 첨부문서의 작성일(2017년 07월 05일)이후 변경된 내용은 식품의약품 안전처 온라인약도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)이나 당사 소비자상담실 080-6111-8690(수신자부담)로 문의하시어 확인할 수 있습니다.