

모메타손푸로에이트

라벨리아 로션  
RAVELIA

- 라벨리아로션은 불소를 함유하지 않으면서 강력한 항염효과를 나타냅니다.
- 라벨리아로션은 코르티코이드의 일반적인 이상반응인 전신 및 국소 이상반응을 나타내지 않으면서 1일 1회 적용만으로도 충분한 효과를 발현하여 환자의 순응도를 높여줍니다.
- 라벨리아로션은 기타 코르티코이드와 Cross Sensitivity가 없고 피부위축을 일으키지 않으므로 민감하게 코르티코이드에 반응하는 민감한 염증성 피부질환에 매우효과적으로 다양한 임상작용이 가능한 제제입니다.
- 라벨리아로션은 기타 연고나 크림제제와 차별화된 제형으로 부드러운 사용감의 로션제 개발되었으므로 보다 빠른 흡수율과 신뜻한 사용감의 작용이 가능한 제제입니다.

## 【원료약품 및 그 분량】1g 중

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| 모메타손푸로에이트(USP) .....            | 1 mg   |
| 첨가제(보존제) : 파라옥사벤조산메틸(KP) .....  | 1.5 mg |
| 첨가제(보존제) : 파라옥사벤조산프로필(KP) ..... | 0.5 mg |

## 【성상】 흰색 또는 옅은 황색의 로션제

## 【효능·효과】 코르티코이드에 반응하는 피부질환의 가려움 및 염증의 완화

## 【용법·용량】

1일 1회 환부에 얇게 비르고 완전히 스며들 때까지 가볍게 문지른다.  
밀봉용대접은 삼간다.

## 【사용상의 주의사항】

## 1. 다음 환자에는 투여하지 말 것

- 1) 세균(결핵, 매독 등)·진균(칸디다증, 백선 등)·바이러스(대상포진, 단순포진, 수두, 풍두증 등)·동물(곰, 사면발이 등)성 피부감염증 환자(증상이 악화될 수 있다)
- 2) 이 약 또는 이 약 성분에 과민증 및 그 병력이 있는 환자
- 3) 고막 천공이 있는 습진성 외이도염 환자(천공부위의 치유 지연이 나타날 수 있다)
- 4) 귀양(메티셀 병 제외), 제2도 심재성 이상의 화상·동상 환자(피부재생이 억제되어 치유가 지연될 수 있다)
- 5) 입주위피부염, 보트머드름, 주사 환자
- 6) 항문주위·생식기 가려움 환자
- 7) 2세 이하의 영아

## 2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것

- 1) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인 및 수유부
- 2) 유·소아
- 3) 고령자
- 4) 이 약은 프로필렌글리콜을 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.

## 3. 이상반응

## 1) 피부

- ① 감염증 : 피부의 세균성·진균성·바이러스성(대상포진, 단순포진, 수두, 풍두증 등) 및 진균성(칸디다증, 백선 등), 바이러스성 감염증이 나타날 수 있다[밀봉용대접(ODT)의 경우 나타나지 않다]. 이와 같은 증상이 나타날 경우에는 적절한 항균제나 항진균제 등을 병용하고 증상이 신속히 개선되지 않을 경우에는 사용을 중지한다.
- ② 일반적 피부증상 : 모낭염, 부스럼, 피부자극, 자통, 발열, 작열감, 발진, 발적, 홍조, 가려움, 피부건조, 농포성 피부염, 알레르기성 접촉피부염, 멍피, 한진, 상처악화, 욕창, 농포증 등이 나타날 수 있으며, 이러한 증상이 나타날 경우에는 사용을 중지한다.
- ③ 장기 연용 : 스테로이드성 여드름, 스테로이드성 피부(피부위축, 모세혈관확장, 자반), 스테로이드성 주사, 입주위 피부염, 입주위·인면천재에 흉반, 구진, 모세혈관확장, 딱지, 인설, 아린선(魚鱗癬)양 피부변화, 다모, 색소탈실, 선조, 수포성피부염, 이토 피부피부염, 피부출혈 등이 나타날 수 있다. 이러한 증상이 나타날 경우에는 천천히 사용량을 줄여 코르티코이드를 함유하지 않은 약으로 바꾸어 사용한다.
- 2) 내분비계 : 대량 또는 장기간에 걸친 광범위한 사용, 밀봉용대접에 의해 코르티코이드 전신 투여와 같은 노화수체·부신피질계 기능의 억제될 수 있으므로 주의한다.
- 3) 눈 : 인접피부에 사용시 인접 상충, 녹내장을 일으킬 수 있으므로 주의한다. 대량 또는 장기간에 걸친 광범위한 사용, 특히 밀봉용대접을 사용할 경우 후안방백배장, 녹내장 등이 나타날 수 있다.

## 4. 일반적주의

- 1) 피부 감염을 수반하는 습진·피부염에는 사용하지 않는 것을 원칙으로 하지만 부득이하게 이 약을 사용하는 경우에는 먼저 적절한 항균제(전신적용), 항진균제로 치료하거나 이들과의 병용을 고려한다.
- 2) 국소 코르티코이드의 전신적 흡수는 몇몇 환자에서 가역적인 사상하부-노화수체-부신(HPA) 축의 억제, 쿠싱증후군, 과혈당증, 당뇨 등을 일으킬 수 있으므로 국소 코르티코이드를 광범위한 체표면 또는 밀봉용대접 하에 사용하는 환자는 정기적으로 혈당 코르티솔 농도, 요중에 유리되는 코르티솔을 측정하거나 ACTH 자극시험을 하여 HPA축 억제를 감시한다.
- 3) 국소 코르티코이드의 전신적 흡수로 인해 HPA축이 억제되었다면 약물사용의 중지, 투여빈도의 감소, 활성이 약한 코르티코이드로 대체 등의 방법을 시도하고 일반적으로 국소 코르티코이드 약물투여 중지 후 HPA축 기능은 신속히 회복된다.
- 4) 증상이 개선되지 않거나 악화되는 경우에는 사용을 중지한다.
- 5) 증상이 개선되면 가능한 빠른 시일 내에 사용을 중지한다.

## 5. 임부 및 수유부에 대한 투여

- 1) 동물실험에서 비교적 적은 용량의 코르티코이드를 전신적으로 투여한 경우, 좀 더 강력한 코르티코이드 피부도포로 인해 기형발생이 나타났다.
- 2) 임부에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에 대해서는 대량 또는 장기간에 걸친 광범위한 사용을 피하고 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여한다.
- 3) 국소적으로 투여한 코르티코이드가 모유로 이행되는지 여부는 알려져 있지 않으나 전신적으로 투여한 코르티코이드가 모유 중으로 이행하므로 수유부에 투여시 주의한다.

## 6. 소아에 대한 투여

- 1) 소아는 체중당 체표면적의 비율이 성인보다 커서 코르티코이드로 인해 HPA축 억제, 쿠싱증후군, 발육장애, 두개내 압항진 등이 나타나기 쉬우므로 주의한다.
- 2) 기저귀 등은 밀봉용대접과 같은 작용을 나타낼 수 있으므로 주의한다.
- 3) 3주 이상 연용하여 사용하지 않는다.

## 7. 고령자에 대한 투여

일반적으로 고령자에서는 부작용이 나타나기 쉬우므로 대량, 장기간, 광범위하게 특히 밀봉용대접 사용할 경우 충분히 관찰하는 등 주의한다.

## 8. 적용상의 주의

- 1) 인과응으로 사용하지 않는다.
- 2) 화상 또는 면도 후 등 치료 이외의 목적으로 사용하지 않는다.
- 3) 의사의 감독 없이 밀봉용대접을 사용하지 않는다(특히 밀봉용대접을 사용할 경우 세균감염이 나타나기 쉬우므로 적용전에 환부를 청결히 한다).

## 9. 저장상의 주의사항

어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.

## 10. 기타

- 1) 국소 코르티코이드가 실험동물의 수태능력에 미치는 영향이나 발암성 여부를 평가하는 만성시험은 실시되지 않았다.
- 2) 이 약의 유전독성시험(Ames시험, 마우스 림프종 시험, 소핵시험)에서는 돌연변이 유발가능성이 나타나지 않았다.

## 【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

## 【포장단위】 20g, 25g, 30g, 50g(50mL), 60g(60mL), 118g / 병

\* 본 의약품은 우수의약품 제조 및 품질관리 기준(KGMP)에 따라 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입 시 사용(유효)기한이 지났거나 변질·변패·오염되거나 손상된 의약품일 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.  
\* 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관해 주십시오.  
\* 사용(유효)기한이 지난 의약품은 사용(복용)하지 마십시오.  
\* 이 약을 사용(복용)하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽고, 본 첨부문서를 이 약과 함께 보관하십시오.  
\* 자세한 의약품 정보는 당사 홈페이지(<http://www.taiguk.co.kr>) 또는 식품의약품안전처 온라인약품사전(<http://drug.mfds.go.kr>)을 참조하십시오.  
☎ 소비자상담전화 : 080-300-8282

첨부문서 개정 연월일 : 2017. 02. 22