

Calteo

4 | 0

ACTUAL SIZE(F/R)

8



분리배출

【제품명】 칼테오-40정

일반의약품

분류번호:321

【원료약품 및 분량】 1정(1,020mg)중

구연산칼슘(주성분, USP) ----- 750mg(칼슘으로서 150mg)

팔레칼시페롤(주성분, USP) ----- 10μg(비타민D로서 400IU)

【성상】 백색의 장방형 필름코팅정제

【효능·효과】 - 칼슘결핍 및 칼슘의 보급,

- 뼈, 이의 발육불량, 구루병의 예방,

- 비타민D의 보급: 임신·수유기, 발육기, 노년기

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【용법·용량】 12세 이상 및 성인: 1일1회, 1회2정을 식후 복용한다.

【포장단위】 500정

【제조사】 Delavan U.C. 10101 Roosevelt Blvd, Philadelphia, Pennsylvania (PA) 19154, USA

【수입자】 (주)파마텍코리아 경기도 용인시 기흥구

흥덕중앙로120, 2408 (영덕동, U-Tower)

TEL: 031-211-1103, FAX: 031-211-2522

【판매자】 대원제약(주) 서울특별시 성동구 천호대로 386 (용답동)

(대)080-497-8272 / (주)피엔씨팜 서울특별시 서초구 동광로

57(방배동) (대)02-592-2526

【제조번호·사용기한】 제품 측면 또는 바닥면 별도표기(Lot,

제조일: DOM-월/일/년도)로부터 3년

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 구입시 사용기한이 경과되었거나 유통과정 중 변질·변색 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입하신 약국을 통하여 교환하여 드립니다. 제품에 관한 문의는 전화 (080-497-8272 / 02-592-2526) 로 하시기 바랍니다.

※ 본 의약품에 대한 자세한 허가사항은 식품의약품안전처 온라인의약품도서관 [http://drug.mfds.go.kr]을 참조하시기 바랍니다.

※ 사용기한이 지난 의약품을 사용하지 마십시오.

※ 이 약을 사용하기 전에 반드시 첨부문서를 주의깊게 읽어보시고, 첨부문서는 항상 약과 함께 보관하시기 바랍니다.

※ 의약품을 어린이의 손에 닿지 않게 보관하여야 합니다.

FIGHT OSTEOPOROSIS

Calteo⁴⁰ULTRADENSE[®]CALCIUM CITRATE
Vitamin D₃

Promotes Good Bone Health

500 Tablets

사용상의 주의사항

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것

1) 고칼슘혈증(hypercalcemia: 혈액중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태)환자, 유육종증(sarcoidosis: 원인을 알 수 없는 전신 염증질환), 신장질환 환자

2) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자

3) 만 12개월 미만의 젖먹이

4) 신장결석 환자

5) 심한 증상의 신부전 환자

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.

1) 인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제

3. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것

1) 의사의 치료를 받고 있는 환자

2) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아

-비타민 D는 모유로 분비되어 신생아에게 고칼슘혈증을 일으킬 수 있다

3) 심장·순환기계기능 장애 환자

4) 신장장애 환자

5) 저단백혈증 환자

6) 감심배당체를 투여 중인 환자

7) 신장결석 병력이 있는 환자

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

상당 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우

구역, 구토, 설사, 변비, 저혈압, 얼굴달아오름, 심박동불규칙, 피부발진

2) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈성심부전, 부종(무기) 등의 증상이 나타날 수 있다.

3) 장기투여에 의해 고칼슘혈증 및 결석증이 나타날 수 있다.

4) 할알도스테론제, 트리암테렌과 병용투여시 고칼슘혈증을 일으킬 수 있으므로 주의할 것

5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.

2) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피할 것

6. 저장상의 주의사항

1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.

2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것

3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것

[최종 작성일자] 2015. 06.25