

감기로 인한 인후통·기침

이누렉신

(은교산)

INUREXIN Cap.

캡슐

※ 본 의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽으시고, 항상 본 의약품과 함께 보관하시기 바랍니다.

이누렉신캡슐은 발열에 의한 각종 질환(인후(목구멍)염, 기관지염 등) 및 감기의 제증상(여러 증상)(입이 마르고, 두통, 기침 등)에 탁월한 해열, 진해(기침을 그치게 함), 진통작용을 나타냅니다.

이누렉신캡슐의 주성분 중 하나인 금은화는 항균, 면역부활, 소염(항염), 항바이러스 등의 약리작용이 밝혀져 있어 악성종기, 인후(목구멍)염 등에 효능이 있습니다. 또한 연교는 열을 내리고 해독하며 부기를 가라앉히는 소염(항염)작용과 항염, 항균작용이 뛰어나 종양, 단독 등에 사용됩니다.

이러한 성분들이 이상적으로 배합되어 있는 이누렉신캡슐은 각종 염증 질환에 우수한 효과를 나타내며 감기, 후두염, 기관지염, 폐렴 등에도 사용할 수 있는 제제입니다. 특히 이누렉신캡슐은 순수 생약성분으로만 구성되어 있는 제제로서, 기존의 항생제나 소염제(항염증제)보다 부작용이 적은 제제입니다.

【원료약품 및 분량 : 1캡슐 중】

은교산진조엑스(8.16→1)(별규).....	490 mg
금은화(KP).....	1450 mg
연 교(KP).....	1450 mg
박 하(KP).....	869 mg
길 경(KP).....	869 mg
감 초(KP).....	869 mg
담죽엽(생규).....	580 mg
형 개(KP).....	580 mg
두 시(생규).....	727 mg
우방자(KP).....	727 mg
영양각(생규).....	45 mg

첨가제(타르색소): (캡슐) 적색 3호, 황색 203호, 청색 1호

첨가제(동물유래성분): 유당수화물(건강한 소의 우유)

【성 상】 갈색의 분말과 과립이 든 상·하부 암갈색의 경질캡슐제

【효능·효과】 감기로 인한 목구멍 통증, 목마름, 기침, 두통

【용법·용량】

보통 성인 1회 2캡슐, 7~14세 1캡슐을 1일 3회 식전 또는 식간에(식사때와 식사때 사이) 복용한다.

【사용상의 주의사항】

- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.
 - 1) 5세 미만의 영아(젖먹이)·유아
 - 2) 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.
- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 한의사, 치과의사, 약사, 한약사와 상의할 것.
 - 1) 고혈압 환자
 - 2) 심장에 또는 신장에(신장장애) 환자
 - 3) 부종(부기) 환자
 - 4) 몸이 허약한 환자(체력이 쇠약해진 환자, 몸이 약한 환자)
 - 5) 위장이 허약한 환자
 - 6) 지금까지 약에 의해 발진·발적(충혈되어 붉어짐), 가려움 등을 일으킨 적이 있는 환자

- 7) 의사의 치료를 받고 있는 환자(다른 약물을 투여 받고 있는 환자)
 - 8) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성
 - 9) 고령자(노인)(일반적으로 고령자(노인)는 생리기능이 저하되어 있으므로 감량(줄임)하는 등 주의할 것.)
3. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 한의사, 치과의사, 약사, 한약사와 상의할 것. 상담시 가능한한 이 첨부 문서를 소지할 것.

1) 이 약의 복용에 의해 다음의 증상이 나타난 경우

(1) 위알도스테론증 : 요량이 감소하거나 얼굴과 손발이 붓고, 눈꺼풀이 무거워지고, 손이 굳어지고, 혈압이 높아지거나 두통 등(1일 최대 복용량이 감소로서 1g 이상인 제제는 장기간 계속하여 복용할 경우 저칼륨혈증, 혈압상승, 나트륨 체액의 저류(고임), 부종(부기), 체중증가 등의 위알도스테론증이 나타날 수 있으므로, 관찰(혈청칼륨치의 측정)을 충분히 하고 이상이 확인되는 경우 복용을 중지할 것.)

(2) 근병증(근육병증) : 저칼륨혈증의 결과로서 근병증(근육병증)이 나타날 수 있으므로, 관찰을 충분히 하고 무력감, 사지경련, 마비 등의 이상이 확인되는 경우 복용을 중지할 것.

(3) 피부 : 발진 · 발적(충혈되어 붉어짐), 가려움 등

(4) 소화기계 : 식욕부진, 위부불쾌감, 구역 등

2) 수일간 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

4. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항

1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지킬 것.

2) 장기간 계속하여 복용하지 않는 것이 원칙이나 부득이 장기간 계속하여 복용할 경우에는 의사, 한의사, 치과의사, 약사, 한약사와 상의할 것.

3) 어린이에게 복용시킬 경우에는 보호자의 지도 · 감독 하에 복용시킬 것.

4) 칼륨 함유제제, 감초 함유제제, 글리시리진산 또는 그 염류 함유제제, 루프제 이뇨제(푸로세미드, 에타크린산) 또는 티아지드제 이뇨제(트리클로르메타이디드)와 병용(함께 복용)시 위알도스테론증이나 저칼륨혈증으로 인하여 근병증(근육병증)이 나타나기 쉬우므로 신중히 복용할 것.

5) 다른 한약제제 등과 함께 복용할 경우에는 함유 생약의 중복에 주의할 것.

5. 저장상의 주의사항

1) 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것(사용 후 반드시 밀폐 보관할 것.).

2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.

3) 의약품은 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 의한 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【포장단위】 자사포장단위(10캡슐)

【사용기간】 제조일로부터 36개월

※ 자세한 품목허가 또는 신고사항은 이지드럭(ezdrug.kfda.go.kr) 의약품 정보 참조

※ 사용기한이 지난 의약품은 사용하지 마십시오.

※ 본 의약품은 우수 의약품 제조관리 및 품질관리기준(KGMP)에 따라 엄격한 제조관리와 품질관리를 거쳐 생산된 의약품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패, 오염 또는 손상된 의약품은 약국개설자 및 의약품 판매업자를 통해 교환하여 드립니다. ♣ 080-311-2222

※ 최신의 정보 확인방법 : 이 첨부문서의 개정일자(2012년 9월 3일) 이후 변경된 내용은 홈페이지(www.ilhwa.co.kr)또는 전화 (031)550-0472-8 (주)일화 학술 · 개발부를 통해 확인할 수 있음

최종개정연월일 : 2012년 9월 3일



ILHWA^{Ph.}

● 제조의뢰자 : (주)일화

· 경기도 구리시 안골로56번길 25 · <http://www.ilhwa.co.kr>

● 제조자 : 한국웨일즈제약(주) / 경기도 안산시 단원구 성곡로146번길 20

0079 I 120903