



에페릭스정은 척수와 상위 중추신경계에 작용하며 monosynaptic, polysynaptic reflex를 강력히 억제하여 근육 긴장상태를 완화시킵니다. 에페릭스정은 calcium antagonist로 작용하여 혈관을 이완시키고, 뇌혈류를 증가시켜 뇌혈관장애를 포함한 신경계 질환에 의한 마비에 뛰어난 효과를 나타냅니다.

에페릭스정은 통증 발현시 생성되는 prostaglandin, thromboxane A₂의 생성을 억제해 진통효과를 나타냅니다.

에페릭스정은 과도한 근육의 악화를 초래하지 않아, 뇌졸중 환자 등의 경련성 마비에 적용시 근력을 저하시키지 않고 팔·다리 수의 운동을 원활하게 해줍니다. 에페릭스정은 운동신경에 직접작용하기 때문에 진정·최면작용 등의 부작용이 매우 적어 안전하게 투여할 수 있습니다.

【성분·함량】 (1정 중)

에페리슨염산염(JP) 50mg

【성상】

흰색 원형의 필름코팅정

【효능·효과】

1. 근골격계 질환에 수반하는 동통성 근육연축 : 경건완중후군, 견관절주위염, 요통
2. 신경계 질환에 의한 경직성 마비 : 뇌혈관장애, 경직성 척수마비, 경부척추증, 수술후 후유증(뇌·척수 손상 포함), 외상후유증(척수손상, 두부외상), 근위축성 측색경화증, 뇌성마비, 척수소뇌변성증, 척수혈관장애, 이급성 척수신경병증, 기타의 뇌척수질환

【용법·용량】

성인 : 에페리슨염산염으로서 1회 50mg, 1일 3회 식후에 경구투여하십시오.

* 연령, 증상에 따라 적절히 증감하십시오.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.

- 1) 이 약에 과민증 환자
- 2) 중증의 근무력증 환자
- 3) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당 분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 됩니다.

2. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.

- 1) 약물과민증의 병력이 있는 환자
- 2) 간장애 환자(간기능을 악화시킬 수 있습니다.)

3. 이상반응

- 1) 속 : 드물게 속을 일으킬 수 있으므로 관찰을 충분히 하여 증상이 나타나는 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 하십시오.
- 2) 간장 : 드물게 ALT, AST, ALP의 상승 등이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하여 증상이 나타나는 경우에는 투여를 중지하는 등 적절한 처치를 하십시오.
- 3) 신장 : 드물게 단백뇨, BUN의 상승 등이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하여 증상이 나타나는 경우에는 투여를 중지하는 등 적절한 처치를 하십시오.
- 4) 혈액 : 드물게 빈혈 등이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하여 증상이 나타나는 경우에는 투여를 중지하는 등 적절한 처치를 하십시오.
- 5) 과민증 : 때때로 발진, 드물게 가려움 등이 나타날 수 있습니다.
- 6) 정신신경계 : 때때로 불면, 졸음, 두통, 사지마비, 드물게 몸의 굳어짐, 자떨림 등이 나타날 수 있습니다.

- 7) 소화기계 : 때때로 구역, 구토, 식욕부진, 위부불쾌감, 구갈, 변비, 설사, 복통, 드물게 복부팽만감, 구내염 등이 나타날 수 있습니다.
- 8) 비뇨기계 : 드물게 오배, 요실금, 잔뇨감이 나타날 수 있습니다.
- 9) 전신증상 : 때때로 무력감, 비틀거림, 전신권태감, 드물게 어지러움, 근긴장저하 등이 나타날 수 있습니다.
- 10) 기타 : 때때로 안면홍조, 드물게 발한, 부종이 나타날 수 있습니다.

4. 일반적 주의

- 1) 이 약 투여중에 무력감, 비틀거림, 졸음 등이 나타날 수 있으므로, 이러한 경우에는 감람 또는 투여를 중지하십시오.
- 2) 졸음, 주의력·집중력·반사운동능력 등의 저하가 나타날 수 있으므로 이 약을 투여중인 환자는 자동차운전 등 위험을 수반하는 기계조작을 하지 않도록 주의하십시오.

5. 상호작용

이 약의 유사약물인 톨페리슨염산염과 메토키카를을 병용시 시조절장애가 나타났다는 보고가 있습니다.

6. 임부 및 수유부에 대한 투여

- 1) 임신 중의 투여에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단될 경우에만 투여하십시오.
- 2) 수유부에는 투여를 피하는 것이 바람직하나 부득이하게 투여할 경우에는 수유를 중단하십시오.

7. 소아에 대한 투여

소아에 대한 안전성이 확립되어있지 않습니다(사용경험이 적습니다.).

8. 고령자에 대한 투여

일반적으로 고령자에서는 생리기능이 저하되어 있으므로 감람하는 등 주의하십시오.

【저장방법 및 사용기간】 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관, 제조일로부터 3년

【포장단위】 자사포장단위(외부용기 표기)

* 구입시 사용기한이 경과되었거나 유통과정중 변질, 변패 또는 오손된 제품일 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드리며, 공정거래위원회고시 "소비자 분쟁 해결 기준"에 의거 소비자의 정당한 피해는 보상하여 드립니다.

* 본 설명서 작성(개정)년월일 이후 변경된 내용은 아래 제품문의 및 홈페이지를 통하여 확인할 수 있습니다.

■ 제품문의의 (02)2211-6700, www.sinilpharm.com



본사 : 서울시 동대문구 사기정로 272
공정 : 충청북도 충주시 양성면 북성골길 28



설명서 개정년월일 : 2014.06.27