

뇌 및 말초혈액순환촉진제

진큐크린 120mg 정

은행엽엑스 120mg



진큐크린정120mg은 천연 생약제제로서 생존하는 식물군 중 최고의 수명을 가진 은행나무의 생명력이 강한 푸른 은행잎에서 추출한 키크플라본 배당체(Ginkgoflavon glycoside)가 함유된 제품입니다.

혈액은 온몸을 순환하면서 각 부위에 영양소와 산소를 운반해주고 신체 각 부위는 이 영양소와 산소로 에너지를 만들어 제 기능을 유지하게 됩니다. 이때 혈액순환이 잘 되지 않는 부위는 고유의 제 기능을 발휘하지 못할 뿐 아니라 각종 질환과 장애를 일으키게 됩니다.

진큐크린정120mg은 말초혈액순환장애로 인한 손발이 차고 저린 증상 및 보행 시 통증 및 뇌혈액순환장애로 인한 두통, 현훈(어지러움), 기억력 감퇴, 우울감, 불안으로 인한 정서적 불안정 및 이명(귀울림) 등 청력감퇴의 보조치료에 우수한 치료효과를 나타내는 말초혈액순환개선 및 청혈제입니다.

【약리작용 및 특징】

1. 뇌혈관 및 말초혈관 확장작용(치매성증상을 수반하는 기질성 뇌기능장애의 치료) 진큐크린정120mg은 혈관 확장인자(EDRF, PGI₂)를 유리하여 혈액공급이 부족한 부위의 혈관을 확장시켜 혈류량을 증가시켜줍니다.
2. 혈액의 점도 저하작용
진큐크린정120mg은 혈액의 점도를 증가시켜 혈액의 흐름을 방해하는 혈소판의 응집기 전을 억제하여 혈액순환을 원활하게 해 줍니다.
3. 혈관벽 손상 방지작용
진큐크린정120mg은 혈관 세포를 파괴하여 혈관의 경화를 가속화하는 유리기(Free radical)를 억제하므로 혈관을 보호하고 탄력성을 유지시켜 줍니다.

【원료약품의 분량】 1정 중

은행엽엑스(생규) 120mg

- 첨가제(동물유래) : 루디프레스[유당수화물(기원동물 : 소, 사용부위 : 우유)]
- 첨가제(타르색소) : 청색1호알루미늄레이크, 황색203호알루미늄레이크, 황색5호알루미늄레이크

【성상】 녹색 원형의 필름코팅정

【효능·효과】 주효능·효과

- 1) 말초동맥 순환장애(간혈성파행증(이따금 절뚝거림))의 치료
- 2) 어지러움, 혈관성 및 퇴행성 이명(귀울림)
- 3) 이명(귀울림), 두통, 기억력감퇴, 집중력 장애, 우울감, 어지러움 등의 치매성증상을 수반하는 기질성 뇌기능장애의 치료

【용법·용량】 성 인

- 1) 말초동맥 순환장애, 어지러움, 이명(귀울림) : 은행엽엑스로서 1회 40mg 1일 3회 또는 1회 80mg 1일 2회 경구투여하십시오.(복용하십시오.)
- 2) 기질성 뇌기능장애 : 은행엽엑스로서 1회 40~80mg 1일 3회 또는 1회 120mg 1일 2회 경구투여하십시오.(복용하십시오.) 연령, 증상에 따라 적절히 증감하십시오.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.

- 1) 이 약의 과민증 환자
- 2) 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하지 마십시오.

2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것

이 약은 황색5호(산선텔로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여합니다.

3. 부작용

- 1) 드물게 가벼운 위장관 불편감, 두통, 알레르기성 피부반응이 나타날 수 있다.
- 2) 국내 자발적 이상사례 보고자료(1989~2013년)를 분석한 결과, 이상사례가 보고된 다른 의약품에서 발생한 이상사례에 비해 통계적으로 유의하게 많이 보고된 이상사례는 다음과 같이 나타났다. 다만, 이로써 곧 해당성분과 다음의 이상사례 간에 인과관계가 입증된 것은 아니다.
· 어지러움 · 가려움증

4. 일반적 주의

이 약은 고혈압치료제가 아니므로 특별한 치료를 요하는 고혈압 환자에는 투여하지 마십시오.

5. 임부에 대한 투여

동물실험에서 기형발생은 없었으나 임신 중의 투여에 대한 충분한 사용경험이 적습니다.

6. 소아에 대한 투여

소아의 사용경험이 충분하지 않으므로 12세 이하의 소아에는 투여하지 마십시오.

7. 저장상의 주의사항

직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전하여(뚜껑을 꼭 닫아) 보관하십시오.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【포장단위】 200정(100정×2)

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품이며, 만약 구입 시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

※ 유효기간 또는 사용기한이 지난 의약품을 사용하시면 안 되며, 의약품 사용하시기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽으시고, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.

※ 개정연월 이후 변경된 내용은 온라인 의약도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)을 통하여 확인하실 수 있습니다.



제조발매원

영종제약주식회사

인천광역시 남동구 함박외로 333

제품문의 (032)812-8356

설명서개정연월 2015. 05