

시메티딘

시메티딘 200mg

전문의약품

[성분 · 함량] 1정 중
시메티딘 (KP) 200.0mg
첨가제 (타르색소) : 청색 1호, 황색 4호
첨가제 (동물유래) : 유당수화물 (건강한 소, 우유)

[성 성] 연녹색의 정방형 정제

[효능 · 효과]

- 위 · 십이지장궤양, 역류성식도염, 재발성궤양, 문합부궤양, Zollinger-Ellison 증후군
- 다음 질환의 위점막병변 (미란, 출혈, 발적, 부종)의 개선 : 급성 위염, 만성위염의 급성악화기

[용법 · 용량]

- 성 인** : 시메티딘으로서 1회 400mg 1일 2회 (오전, 취침시) 경구투여하거나 1일 1회(취침 시) 800mg을 투여하십시오. 또한 1회 300mg 1일 4회 (식후, 취침시) 경구투여하십시오. 1회 400mg 1일 4회 (식후, 취침시) (총 1.6g)까지 증량할 수 있습니다.
단, 다음 질환의 위점막병변 (미란, 출혈, 발적, 부종)의 개선 : 급성 위염, 만성위염의 급성악화기에 1회 200mg 1일 2회 또는 1일 1회 400mg을 투여하십시오.
- 소 아** : 1일 체중 kg당 20~40mg을 분할 경구투여하십시오.
- 통증의 완화를 위해서 필요시 제산제를 투여할 수 있습니다. 환자에 따라서는 용량을 증가시킬 수 있으므로 이때에는 1회 투여량을 증가하지 말고 투여횟수를 늘리십시오. 1일 2.4g을 초과하지 않습니다.
- 신기능부전 환자** : 이 약으로서 1회 300mg 1일 2회, 12시간마다 투여하십시오. 환자의 증상에 따라 필요하다면 투여횟수를 1일 3회, 8시간마다 또는 그 이상 늘릴 수 있으나 주의하십시오. 중증의 신기능부전 환자는 약물이 체내에 축적될 수 있으므로 환자의 반응에 따라 투여횟수를 최소한으로 줄이십시오. 혈액투석은 혈액 중 시메티딘치를 낮춥니다. 혈액투석이 끝나면, 스케줄에 따라 약물을 다시 투여하십시오. 연령, 증상에 따라 적절히 증감하십시오.

[사용상의 주의사항]

- 다음 환자에는 투여하지 마십시오.
 - 시메티딘 또는 이 약의 다른성분에 과민증 및 그 병력이 있는 환자
 - 도페틸라이드를 투여하고 있는 환자(심실성 부정맥(torsades de pointes)을 포함)의 위험을 증가시킵니다.
 - 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안됩니다.
- 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.
 - 신장에 환자(혈중 농도가 지속되므로 투여량을 감소하거나 투여간격을 두고 사용하십시오.)
 - 간장애 환자
 - 약물 과민반응의 병력이 있는 환자
 - 고령자
 - 19세 미만의 소아
- 혈액투석을 받고 있는 환자(시메티딘은 혈액 투석에 의해 제거되기 때문에 투석 후 투여하십시오.)
- 이 약 투여로 위장애 증상이 언제될 수 있으므로 약성이 아닌 것을 확인한 후에 투여하십시오.
- 혈리코르티코이드 피임로리 양성인 위 · 십이지장궤양 환자 : 세균박멸을 위한 노력이 필요합니다.
- 이 약은 황색 4호 (타르트리진)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여하십시오.
- 이상반응
 - 혈액계 : 흔히하지 백혈구감소증, 드물게 과립구감소증, 무과립구증, 혈소판 감소, 범혈구 감소, 재생불량성빈혈이 나타날 수 있으며 초기 증상으로서 전신권대, 무력, 피하출혈, 점막하출혈, 발열 등이 나타납니다. 그 시점에서 혈액검사를 실시하고 이상이 인정되는 경우에는 즉시 투여를 중지하고 적절한 처치를 하십시오. 매우 드물게 면역혈청성빈혈의 보고가 있습니다.
 - 간장 : 드물게 황달, 간염이 나타날 수 있습니다. 또한 때때로 ALT, AST의 상승 등 간기능 이상이 나타날 수 있으며 반복투여에 의해 더욱 심하게 나타납니다. 문맥주위의 간섬유증이 보고되어 있습니다.
 - 신장 : 간질성 경련, 급성 신부전, 드물게 간질성 신염 및 요저류, BUN 상승이 나타날 수 있습니다. 또한 신부전 환자에서 일과성의 혈청 크레아티닌 상승이 나타날 수 있습니다. 초기증상으로 발열, 신기능 검사시 이상(BUN, 크레아티닌 상승 등이 인정되는 경우에는 즉시 투여를 중지하고 적절한 처치를 하십시오.
 - 과민반응 : 드물게 쇼크, 아나필락시스모양 반응(전신발적, 호흡곤란 등), 과민성 혈관염, 때때로 발진 등이 나타날 수 있습니다. 이러한 증상이 나타날 경우에는 투여를 중지하십시오.
 - 내분비계 : 때때로 여성형유방, 드물게 유즙분비과다, 대하증가, 발기부전이 나타날 수 있습니다. 이러한 증상이 나타날 경우에는 투여를 중지하십시오.
 - 소화기계 : 때때로 복부팽만감, 변비, 설사 등의 증상이 나타날 수 있습니다.
 - 정신신경계 : 드물게 두통, 어지럼, 경련, 사지저림 및 굳은감, 졸음, 히포콘드리아 증상, 무력 등의 증상이 나타날 수 있습니다. 또한 의식장애, 경련이 나타날 수 있으므로, 관찰을 충분히 하고 이상이 인정되는 경우는 투여를 중지하고, 적절한 처치를 하십시오. 특히 고령자 또는 신부전 등의 중증 질환이 있는 환자에서 드물게 가역성의 착란 상태(초조, 정신병, 우울, 흥분, 환각, 방향상실 등)가 쉽게 나타날 수 있으므로 주의하십시오.
 - 순환기계 : 드물게 동성색맥, 빈맥, 심계항진, 방실차단이 나타날 수 있습니다.
 - 기타 : 매우 드물게 피부점막만증후군(스티븐스-존슨증후군), 독성표피괴사증후군(리델증후군), 표피괴사, 다형홍반, 박탈피부염, 전신발적홍반부종과 같은 중증의 전신 피부반응이 나타날 수 있습니다.
 - 기타 : 흔하게 피로, 드물게 발열, 전신열감, 배뇨곤란, 근육통, 관절통, 해당증, 탈모현상이 나타날 수 있습니다.
 - 이 약과의 상반성은 밝혀지지 않았으나 매우 드물게 가역성 발기부전, 다발성 근염이 보고된 바 있습니다.
- 일반적 주의
 - 경과를 충분히 관찰하여 병의 상태에 따라 필요한 최소량을 사용하고 이 약으로 효과가 보이지 않는 경우에는 다른 요법으로 바꾸십시오. 또한 혈액상, 간기능, 신기능 등에 주의하십시오.
 - 소화성 궤양의 병력이 있는 환자, 특히 고령자가 이 약 및 비스테로이드성진통제를 복용중인 경우 정기적으로 환자를 관찰하는 등 주의를 기울여야 합니다.

- 혈액세포수가 감소될 수 있는 약물을 복용중이거나 그러한 질환이 있는 환자에게 H2 수용체 차단은 그 작용을 더욱 강화시킬 수 있음을 주의해야 합니다.
- 고령자, 만성 폐질환자, 당뇨병 환자 또는 면역력이 약한 환자의 경우 지역사회 획득 폐렴 (community acquired pneumonia)으로 발전할 수 있는 위험성이 증가할 수 있습니다. 대규모 역학조사 결과 H2 수용체 차단제의 복용을 중단한 환자에 비해 H2 수용체 차단제를 복용하고 있는 환자에서 지역사회 획득 폐렴 발생 위험도가 증가하였습니다. (보정 비교위험도: 1.63)
- 상부소화관출혈의 경우에는 보통 주시제로 치료를 개시하십시오. 일반적으로 1주 이내에 효과가 나타나는데, 경구투여가 가능하게 된 후에는 경구투여로 바꾸십시오.
- 쿠마린계 항응고제와 병용투여 시 상호작용이 있을 수 있으므로 프로트롬빈시간을 세심히 관찰 하십시오.
- 치료계수가 작은 약물(페니토인, 테오필린 등)은 이 약과 병용하는 경우 시메티딘 투여의 시작 또는 중단 시 용량을 조절하도록 하십시오.
- 상호작용
다음 약물의 흡수, 대사, 배설에 영향을 주어 혈중 농도를 변화시킨다는 보고가 있으므로 병용할 경우 다음과 같은 약물을 감량하거나 휴약하는 등 신중하게 투여하십시오.
 - 쿠마린계 혈액응고저지제 (와르파린 등), 미다졸람, 디아제팜, 클로르다이아제폭시드, 프로프라놀롤, 메토프롤롤, 테오필린, 페니토인, 클래스부정맥용제 (리도카인, 퀴닌), 니페디핀, 딜티아졸, 이미프라민, 프로카인아이드, 메트로나지돌, 일부 삼환계 항우울약, 에리트로마이신, 시클로스포린, 타크롤리무스, 메트포르민, 도페틸라이드, 설포닐우레아계 경구혈당강화제 (글리피자이드), 아타자-비어, 아줄제 항진균제(케토코나졸, 이트라코나졸, 포사코나졸)
상호작용은 다음과 같은 몇 가지 기전에 의해 일어납니다.
 - 시토크롬P450효소(CYP1A2, CYP2C9, CYP2D6, CP3A3/A4, CYP2C19)의 억제 : 이들 효소를 억제함으로써 쿠마린계 항응고제(와르파린 등), 삼환계 항우울약(아미트립틸린 등), 클래스 I 항부정맥제(리도카인, 퀴닌 등), 칼슘채널차단제(니페디핀, 딜티아졸 등), 설포닐우레아계 경구혈당강화제(글리피자이드 등), 페니토인, 테오필린, 메토프롤롤, 시클로스포린, 타크롤리무스, 디아제팜 등 특정 약물의 혈중 농도를 증가시킵니다.
 - 유기양이온수송체 단백질(organic cationic transporter(OCT) proteins)을 통한 신세뇨관 분비를 억제 : 프로카인아이드, 퀴닌, 메트포르민, 도페틸라이드 등 특정 약물의 혈중 농도를 증가시킵니다.
 - 위 pH의 변화 : 약물의 생체이용률에 영향을 주어 흡수를 증가시키거나(아타자-비어 등) 흡수를 감소시킨다(아줄제 항진균제(케토코나졸, 이트라코나졸, 포사코나졸) 등).
 - 일려지지 않은 기전 : 시메티딘은 카르부스틴, 플루오로우라실, 에피루비신과 같은 화학요법제 또는 방사선과 같은 치료요법에 의한 골수가능저하 효과에, 호중구감소증, 무과립구증)를 증강시킵니다. 그 밖에 마약성진통제(예, 모르핀 등)와의 임상적으로 유효한 상호작용이 보고되었습니다.
- 임부 및 수유부에 대한 투여
 - 임신중의 투여에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성에는 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여하십시오.
 - 시메티딘은 임신중 태반벽을 통과합니다. 그러나 동물 생식독성 연구는 태아에 대한 해로운 영향의 증거를 보이지 않았습니다.
 - 이 약은 모유중으로 이행하므로 수유부에 투여할 경우에는 수유하지 않도록 주의하십시오.
- 소아에 대한 투여
소아에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여하십시오(사용경험이 적습니다).
- 고령자에 대한 투여
주로 신장으로 배설되지만, 고령자에는 신기능이 저하되어 있는 경우가 많아 혈중 농도가 유지될 수 있으므로 감량하여 투여 간격을 연장하는 등 신중히 투여하십시오.
- 과량투여시의 처치
20 g을 투여하였을 때 임상 청색증을 동반한 호흡억제가 보고되었습니다. 호흡억제의 강도에 따라 인공호흡기를 사용하거나, 체토, 위세척 등과 동시에 적절한 요법을 실시하십시오.
- 보관 및 취급상의 주의사항
 - 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
 - 다른 용기에 바꾸어 넣는 것은 사소한이라도 되거나 품질 유지면에서 바람직하지 않으므로 이를 주의하십시오.
- 기타
 - 동물의 독성실험에서 약한 항나트륨 작용에 의한 전립선 및 정낭의 중량 감소가 보고되었습니다.
 - 랫트에 24개월 투여한 독성시험에서 정소의 양성 간세포종 발생이 증가했다는 보고가 있습니다.
 - 임상시험에서 정자형성, 정자수, 운동성, 모양 또는 in vitro에서의 생식능력에 영향이 없었습니다.

[저장 방법] 밀폐용기, 실온(1 ~ 30℃)보관

[포장 단위] 30정, 1000정

- 제조자 : 영일제약(주) 충북 진천군 진천읍 문화12길 6-1
- 제조자의외자 : 삼익제약주식회사

- * 처방된 증상, 처방된 환자 이외에는 사용하지 마십시오.
- * 첨부문서를 읽고, 첨부문서를 보관하십시오.
- * 사용기한이 지난 의약품은 사용하지 마십시오.
- * 이 첨부문서 작성일자(2015. 12. 17)이후 변경된 내용은 삼익제약 홈페이지(www.samik.co.kr) 또는 온라인의약도서관(drug.mfds.go.kr)의약품 정보로 참조하십시오.
- * 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품은 구입처를 통해 교환해 드립니다. 본 제품은 공정거래위원회 고시 "소비자분쟁해결기준"에 의거 교환 또는 보상받으실 수 있습니다. 152101



삼익제약주식회사

인천광역시 부평구 청안로 13
하술/개발부 : (02)928-0661