

헬파론정 (비페닐디메틸디카르복실레이트)

Biphenyl Dimethyl Dicarboxylate 25mg

전문약품

분류번호 : 03910

■ 원료약품 및 분량: 1정 중

- 유효성분: 비페닐디메틸디카르복실레이트(별규) - 25mg
- 첨가제(동물유래성분): 스테아르산마그네슘(소, 우지), 유당수화물(소, 우유)
- 기타 첨가제: 옥수수전분, 포비돈, 카르복시메틸셀룰로오스칼륨

■ 성상: 흰색의 긴 타원형 정제

■ 효능·효과

지속적으로 ALT가 상승되어 있는 만성간염

■ 용법·용량

성인: 비페닐디메틸디카르복실레이트로서 1회 25~50mg, 1일 3회 경구투여한다.
증상에 따라 적절히 증감한다.

■ 사용상의 주의사항

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.

- 1) 이 약 또는 이 약의 구성성분에 과민반응 환자
- 2) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.

- 1) 만성 활동성 간염 환자
- 2) 간경변 환자

3. 이상반응

- 1) 입안마름, 메스꺼움, 피부발진이 일어날 수 있으며, 이러한 이상반응은 항과민약을 병용투여하면 소실된다.
- 2) 일과성 황달이 나타날 경우도 있으나 투약을 중지하거나 황달 치료제를 병용 투여하면 소실된다.
- 3) 드물게 구역과 복부팽만이 발생할 수도 있으나 곧 소실된다.

4. 상호작용

이노신(inosine)과 함께 투여 시에, 재발한 ALT의 상승이 개선될 수 있다.

5. 임부 및 수유부에 대한 투여

임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성 및 수유부에는 투여하지 않는다.

6. 고령자에 대한 투여

일반적으로 고령자는 생리기능이 저하되어 있으므로 감량하는 등 신중히 투여한다.

7. 임상검사에치에 영향

치료 중에 다시 ALT가 상승하는 환자는 거의 없다. 투여 중지 후에 ALT는 증가할 수 있으나 이 약의 재투여로 개선된다.

8. 보관 및 취급상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
- 2) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품오용에 의한 사고발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관한다.

■ 저장방법: 차광기밀용기, 실온(1~30℃)보관

■ 사용기간: 제조일로부터 36개월

■ 포장단위: 30정/병, 500정/병

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 펼친 제 phẩm입니다. 구입시 사용기한이 경과하였거나 유통과정 중 변질·변태 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입하신 약국을 통하여 교환하여 드립니다. 제품에 관한 문의는 전화 070-4346-1213로 주시기 바랍니다.

※ 본 의약품을 복용(사용)하기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽어와야하며, 첨부문서는 의약품과 함께 보관하여 주십시오.

※ 본 의약품에 대한 기타 정보는 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr>)의 '의약품검색'에서 확인할 수 있습니다.

※ 의약품 부작용 피해구제 신청: 한국의약품안전관리원(1644-6223, 14-3330)

개정연월일: 2021년 06월 29일

■ 제조자: 아주약품(주) 경기도 평택시 산단로 121번길 23

■ 제조의뢰자: (주)넥스팜코리아

충북 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명4로 168-41