

A **살균성 항생제** **록시로신정** **(록시트로마이신)**

분류번호: 614

KGMP

전문의약품

적격약제

【성분 · 함량】 1정 중

- 유효성분 : 록시트로마이신(KP) ----- 150mg(약가)
- 기타 첨가제 : 산화티탄, 스테아르산마그네슘, 옥수수전분, 저치한도트록시프로필셀룰로오스, 전분글리콜산나트륨, 폴로이드이산하이드록시, 텔크, 포비돈, 폴록사머, 프로필렌글리콜, 히드록시메틸셀룰로오스2910

【성 상】 양쪽이 볼록한 흰색의 원형 제파정

【효능 · 효과】

- 유효균종
 - 연쇄구균, 폐렴연쇄구균, 수막염균, 임균, 보르테텔라 백일해, 카타르구균, 디프테리아균, 클로스트리움 퍼프린겐스, 폐렴미코플라스마, 클라미디아 트라코마티스, 우레아플라스마 우레알리티쿰, 레지오넬라 뉴모필라, 캄필로박터 파릴로리, 공장직균로박터, 가드네렐라 바지날리스, 인플루엔자균, 황색포도구균, 클레라균, 엔무병 클라미디아
- 적응증
 - 인후두염, 급성기관지염, 편도염, 세균성폐렴, 미코플라스마폐렴 등 호흡기 감염증
 - 임균에 의한 감염을 제외한 생식기감염증 및 성병
 - 중이염, 부비동염
 - 모낭염, 종기, 충치증, 옹종, 단독, 연조직염, 림프관(절)염, 생인손, 화상성 손발톱주위염, 피하농양, 한신염, 응식성 여드름, 감염성 족종
 - 수막염균성 수막염환자와 접촉한 경우에 감염 예방 목적
 - 치관주위염, 치주조직염

【용법 · 용량】

성인 : 록시트로마이신으로서 1회 150mg(약가)을 1일 2회 아침, 저녁식전에 경구투여한다.
 폐렴의 경우 1일 1회 300mg(약가)을 아침 식전에 투여한다.
 연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

【사용상의 주의사항】

1. 경고

스트리프스-존슨 증후군, 독성표피괴사증후군, 급성전신성발진성증후군과 같은 중증 수포성 피부 반응이 보고되었다 (‘4.이상반응’ 항 참조). 만약 이러한 중증 수포성 피부 반응의 증상이나 징후(예, 물집이나 점막 손상과 같은 진행성 피부 발진)가 나타나면 투여를 중지해야 한다.

2. 다음 환자에는 투여하지 말 것

- 1) 약 및 마크로라이드계 항생물질에 과민반응 환자
- 2) 테르페나딘, 아스테미졸, 시사프리드, 피오질을 투여 중인 환자
- 3) 데오코트 알칼로이드(에르고타민, 디하드로에르고타민 함유제제), 미줄라스틴을 투여 중인 환자 (말초혈관경련, 사지허혈, 감각이상을 일으킬 수 있다.)

3. 다음 환자에게는 신중히 투여할 것

- 1) 간장애 환자
- 2) 고령자
- 3) 다른 항생물질(마크로라이드계 항생물질, 린코마이신, 클린다마이신, 클로람페니콜)와의 병용 시 교차작용에 주의한다.
- 4) 이 약을 포함한 마크로라이드계 항생물질은 일부 환자에서 심전도 상 QT 간격을 연장시킬 가능성이 있다. 그러므로 선천적으로 QT간격이 연장된 환자, 부정맥 발생 위험이 있는 환자(예: 교정되지 않은 저칼륨혈증, 혹은 저마그네슘혈증, 임상적으로 유의한 서맥), Class IA 또는 Class III의 항부정맥 약물과 아스테미졸, 시사프리드, 피오질 등을 투여 받고 있는 환자에게 이 약을 투여 시에는 주의가 필요하다.
- 5) 다른 마크로라이드계 항생물질에서 알려진 것과 같이, 이 약은 중증근무력증을 악화시킬 가능성이 있다.

4. 이상반응

- 1) 속 (아나필락틱 속) : 드물게 속을 유발하는 경우가 있으므로 관찰을 충분히 하고 이상이 확인되는 경우에는 투여를 중지하고 적절히 처치한다.
- 2) 과민반응 : 발열 때때로 발진, 알레르기성 피부반응, 맥관부종 등이 나타날 수 있으므로 이러한 증상이 나타나는 경우에는 투여를 중지한다.
- 3) 혈액계 : 때때로 호산구 증가, 무관림구증, 백혈구 감소, 혈소판 감소가 나타날 수 있다.
- 4) 간장 : 담즙울체성 또는 간세포성 급성간염(때때로 황달 동반) 또는 AST, ALT, ALP, 혈청 빌리루빈 등의 상승이 나타날 수 있다.
- 5) 소화기 : 때때로 식욕부진, 구역, 구토, 위부불쾌감(소화불량), 위통, 복통, 복부팽만감, 설사(때때로 출혈을 동반), 위막성대장염, 묽은 변 등이 나타날 수 있다. 드물게 출혈성 대장염 등의 혈변을 동반하는 중증의 대장염이 나타나는 경우가 있으므로 복통, 빈번한 설사가 있는 경우에는 즉시 투여를 중지하는 등 적절한 처치를 한다. 해당증 증상이 보고된 바 있으나 대부분의 환자는 해당증이 이상반응으로 알려진 약물을 병용하였다.
- 6) 클로스트리듐 디피실(Clostridium difficile)에 의한 질환 : 이 약의 치료 중 또는 치료 이후 중증이거나 지속적이거나 출혈이 있는 설사를 하면, 위막성대장염의 증상일 수 있다. 만약 위막성대장염이 의심되면, 즉시 투여를 중지해야 한다.
- 7) 호흡기계 : 기관지경련, 드물게 발열, 기침, 호흡곤란, 흉부 X선 이상, 호산구 증가 등을 동반하는 간질성 폐렴이 나타나는 경우가 있으므로 이와 같은 증상이 나타나는 경우에는 투여를 중지하고 코르티코이드 투여 등의 적절한 처치를 한다.
- 8) 신경계 : 졸음, 드물게 두통, 어지러움, 혀의 마비, 마비 등이 나타날 수 있다.
- 9) 감각기계 : 다른 마크로라이드계 항생물질과 마찬가지로 미각이상(무미각증 포함) 및 후각이상(후각 상실 포함)이 나타날 수 있다.
- 10) 피부 : 다형홍반, 자반증, 스트리프스-존슨 증후군, 독성표피괴사증후군에 이르는 피부반응은 드물게 나타날 수 있다. 시판 후 조사에서 급성전신성발진성증후군이 보고되었다.
- 11) 감염 : 다른 항생제에서와 마찬가지로, 이 약 사용 시 특히 장기간 투여하는 경우 비감수성 병원균의 과잉성장으로 인한 중복감염을 일으킬 수 있으므로 환자의 상태를 지속적으로 평가하는 것이 필요하다. 치료 중 중복감염이 나타나면 적절한 조치를 취해야 한다.
- 12) 귀 및 내이 : 일시적인 난청, 청각장애, 어지러움
- 13) 눈 : 시판 후 조사에서 시력 장애, 시야흐림, 안구출혈이 보고되었다.
- 14) 기타 : 전신권태감, 무력감, 심계항진, QT 연장, 심실성빈맥(Torsades de pointes 포함), 관절통, 비출혈, 월경이상 드물게 구강 및 질점막의 염증(칸디다에 의한 중복감염), 환각, 착란이 보고되어 있다.

5. 일반적 주의

- 1) 이 약의 사용에 있어서 내성균의 발전 등을 방지하기 위하여 감수성을 확인하고 치료상 필요한 최소 기간만 투여하는 것이 바람직하다.
- 2) 간기능이 손상된 환자에는 투여하지 않는 것이 바람직하나 부득이 투여해야 하는 경우에는 정기적

으로 간기능 검사를 실시하여 용량을 조절해야 한다.

- 3) 신장을 통해 배설되는 양이 적기 때문에 신부전 환자의 경우에도 용량을 조절할 필요가 없다.
- 4) 정상적인 치료 용량의 10배 이상을 투여한 어린 동물에서 골단연골층의 이상이 보고되었다. 따라서 1일 제초 Kg당 5~8mg의 용량으로 최고 10일을 초과하여 투여하지 않도록 한다(소아용 제제에 한함.).

6. 상호작용

- 1) 이 약은 간장에서 대사되는 각종 약들의 대사를 억제하여 다음 약들의 혈중농도를 높여 드물게 QT 연장, 심실부정맥(Torsades de pointes 포함) 등의 심혈관계 이상반응이 나타날 수 있으므로 병용하지 않는다: 테르페나딘, 아스테미졸, 시사프리드, 피오질
- 2) 에르고트 알칼로이드(에르고타민, 디하드로에르고타민): 중증의 말초혈관경련, 사지허혈, 감각이상과 같은 급성 에르고트 독성이 나타날 수 있으므로 병용투여하지 않는다.
- 3) 데오필린과 병용투여 시에 데오필린의 혈중농도가 상승하여 중독증상(구역, 구토)을 일으킬 수 있다.
- 4) 카르바마제핀 (1일 1회 200mg)과 병용투여하여도 카르바마제핀의 혈장농도는 변하지 않는다.
- 5) 와파린칼륨의 작용을 증가시켜 출혈증상을 일으킬 수 있다.
- 6) 시클로스포린: 이 약과 병용투여 시 시클로스포린의 혈중농도가 약간 상승되나 용량을 조절할 필요는 없으나 신부전 환자의 경우 신독성이 증가된다.
- 7) 미다졸람: 이 약과 병용투여 시 미다졸람 농도-시간 곡선에서 AUC를 높이고 미다졸람의 반감기를 연장시켜 효과를 강하고 오래 지속시킬 수 있다.
- 8) 디곡신의 흡수를 높일 수 있으며 디곡신의 과다복용을 초래할 수 있다.
- 9) 다른 마크로라이드계 항생물질과 마찬가지로 Class IA 또는 Class III의 항부정맥 약물을 투여 받고 있는 환자에게 이 약을 투여 시에는 주의가 필요하다.
- 10) 미줄라스틴과 병용투여 시 말초혈관경련, 사지허혈, 감각이상을 일으킬 수 있다.
- 11) 이 약은 약한 CYP3A 억제제이다. CYP3A에 의해 주로 대사되는 약물은, 이 약에 의해 약 2배 이하의 상승 효과를 나타낸다. CYP3A에 의해 대사되는 약(리파부딘, 브로모크립틴 등)과 함께 처방된 경우 주의가 필요하다.

7. 임부 및 수유부에 대한 투여

- 1) 동물실험(랫)에서 임상용량의 약 80배에서 태자의 외표이상 및 골격이상의 발현빈도가 대조군에 비하여 높다는 보고가 있으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성에는 치료 상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여한다.
- 2) 모유로 소량 이행되므로 수유부에는 투여하지 않는 것이 바람직하나 부득이 투여하는 경우에는 수유를 중지한다.

8. 고령자에 대한 투여

고령자에서는 반감기가 연장된다. 그러나 12시간 간격으로 150mg(약가)을 반복투여한 후에 정상 상태에서의 최고혈중농도와 투여간 혈중농도시간곡선하면적(AUC)이 젊은 환자에서의 경우와 동일하므로 고령자에게 투여 시 용량을 조절할 필요가 없다.

9. 기제 조작 및 운전에 대한 영향

어지러움, 시력장애, 시야흐림은 환자의 기제 조작 또는 운전 능력에 영향을 미칠 수 있다. (‘3.이상반응’ 항 참조)

10. 보관 및 취급상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것
- 2) 다른 용기에 바꾸어 넣는 것은 사고원인이 되거나 품질 유지면에서 바람직하지 않으므로 이를 주의할 것

11. 의약품동등성시험 정보*

가. 시험약 록시로신정150밀리그램(록시트로마이신)[국제약품㈜]과 대조약 루리드정(록시트로마이신)(㈜한독)을 2×2 교차시험으로 각 2정씩 건강향 성인에게 공복 시 단회 경구투여하여 24명의 혈중 록시트로마이신을 측정한 결과, 비교평가항목치(AUCt, Cmax)를 로그변환하여 통계처리하였을 때, 평균치 차의 90%신뢰구간이 log 0.8에서 log 1.25 이내로서 생물학적으로 동등함을 입증하였다.

구분		비교평가항목		참고평가항목
		AUC _{0-36hr} (ng · hr/mL)	C _{max} (ng/mL)	T _{max} (hr)
대조약	루리드정 (록시트로마이신) (㈜한독)	116.2 ± 39.6	9.06 ± 2.60	2.00 (0.67~4.00)
시험약	록시로신정150밀리그램 (록시트로마이신) [국제약품㈜]	123.9 ± 41.5	9.28 ± 2.05	1.25 (0.67~4.00)
90% 신뢰구간* (기준 : log 0.8 ~ log 1.25)		log 0.9976 ~ 1.1330	log 0.9797 ~ 1.1034	-

(AUCt, Cmax ; 평균값±표준편차, Tmax ; 중앙값(범위), n=24)

AUC : 투약시간부터 최종혈중농도 정량시간 t까지의 혈중농도-시간곡선하면적

Cmax : 최고혈중농도

Tmax : 최고혈중농도 도달시간

* 비교평가항목치를 로그변환한 평균치 차의 90%신뢰구간

주1) 이 약은 국제약품㈜의 록시로신정150밀리그램(록시트로마이신)과 동일한 원료를 사용하여 동일한 제조방법으로 전공정을 국제약품㈜에 위탁 제조하였음. 골.

【저장방법 및 유효기간】 밀폐용기, 실온보관, 제조일로부터 36개월

【포장단위】 30정, 100정, 300정

- ※ 의약품용 사용기한 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽어와 하며, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.
- ※ 본 제품은 우수 의약품제조 및 품질관리기준(KGMP)을 필한 제품입니다. 구입 시 사용기한이 지났거나 변질, 변태 또는 오손된 제품은 구입하신 약국을 통하여 교환 가능합니다.
- ※ 사용(유효)기한이 지난 의약품은 사용하지 마십시오.
- ※ 의약품 용어설명, 의약품 정보, 첨부문서 작성(개정)연월일 이후 변경된 내용은 의약품통합정보시스템 (http://nedrug.mfds.go.kr)에서 확인하실 수 있습니다.
- ※ 의약품 부작용 신고 및 피해구제 신청 : 한국약품안전관리원(1644-6223, 14-3330)

【제조자】 국제약품(주) / 경기도 안산시 단원구 산성로 47

개정연월일 : 2023. 10.23

13/202310

【제조외리지】

Arlico

알리코제약|주

충북 진천군 공평면원 용소2길 21
http://www.arlico.co.kr