

하이조신정2mg(테라조신염산염수화물)



【원료약품의 분량】 1정중

테라조신염산염수화물(이수화물) (KP) 2.374mg
(테라조신으로서 2.0mg)

·첨가제(동물유래): 유당수화물(기원동물: 소, 사용부위: 우유)

·첨가제(타르색소): 황색5호 알루미늄레이크

【성 상】 열은 오렌지색 내지 황색의 원형 정제

【약리작용】

1. 탁월한 전립선비대증 치료효과

전립선비대증에 의한 배뇨장애는 방광경부와 전립선에 밀집된 α1-수용체를 차단시킴으로서 전립선 평활근의 긴장도를 완화시켜 각종 배뇨장애 증상을 개선시킵니다.

2. 선택적인 α1-adrenergic receptor 차단작용

α1-adrenergic receptor만을 선택적으로 차단하므로 반사성빈맥의 발생우려가 적어 중추자극효과에 의한 부작용을 방지할 뿐만 아니라 β-차단제에서 수반되는 말초혈관 및 폐기능에 유해한 작용이 없습니다.

3. 고혈압이 있는 BPH 환자에 유용한 약물

전립선비대증과 고혈압을 동시에 앓고 있는 남성환자 에게는 동시에 해결할 수 있는 매우 경제적이고 효과적인 약물입니다.

4. 지질대사 개선 작용

혈중 지질대사를 개선시키고 총 콜레스테롤치를 저하시켜 관상동맥성 질환의 발생위험인자를 감소시켜 줍니다.

5. 1일 1회 복용의 간편한 투여방법

장기투여시 내성 발현이 거의 없으며 약효지속시간이 24시간으로 1일 1회 복용이 가능하여 환자의 치료순응도를 높여줍니다.

6. 다양한 약물과의 병용투여

다양한 약물과의 상호작용없이 병용투여하여 약효의 상승효과를 기대할 수 있는 훌륭한 약물입니다.

【효능·효과】

양성전립선비대에 의한 배뇨장애, 고혈압(경증-중등도)

【용법·용량】

이 약은 다른 약물이 부적절하거나 비효과적일 경우 단독 또는 치아짓게 이노제 및 다른 혈압강화제와 병용요법으로 투여할 수 있다. 음식물은 이 약의 생체내이용률에 거의 또는 전혀 영향을 미치지 않으므로 식사와 관계없이 투여할 수 있다. 연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

1. 양성전립선비대에 의한 배뇨장애

<성 인>

1) 초회량(처음복용(사용)량): 테라조신염산염수화물으로서 초회량(처음복용(사용)량)으로 취침전 1mg을 경구투여(먹는다)하며 이 용량을 초과해서는 안 된다. 초회투여로 인한 급성 저혈압 발현(드러냄) 가능성을 최소화하기 위하여 초회투여의 복약상태를 신중히 관찰한다.

2) 유지량: 이 약으로써 증상이 개선될 때까지 천천히 증량한다. 유지량으로 1일 1회 5-10mg을 경구투여(먹는다)한다.

3) 치아짓게 이노제 및 다른 혈압강화제와 병용투여: 치아짓게 이노제 또는 다른 혈압강화제와 병용투여하는 경우에는 이 약의 용량을 감량(줄임)하며 필요한 경우 증량(양을 늘림)한다. 이러한 병용 투여 요법시 저혈압이 나타날 수 있으므로 신중히 관찰한다.

2. 고혈압

용량은 환자의 혈압반응에 따라 조절한다.

1) 초회량(처음복용(사용)량): 테라조신염산염수화물으로서 초회량(처음복용(사용)량)으로 취침전 1mg을 경구투여(먹는다)하며, 이 용량을 초과해서는 안 된다. 초회투여로 인한 급성 저혈압 발현(드러냄) 가능성을 최소화하기 위하여 초회 투여의 복약상태를 신중히 관찰한다.

2) 유지량

① 단독투여: 유지량으로 1일 1회 2-10mg을 투여하며 아침 또는 저녁에 복용하되 계속해서 같은 시간에 투여하는 것이 바람직하다. 바람직한 혈압반응을 얻기 위해 1주간격으로 용량을 2배로 증량(양을 늘림)할 수 있다. 20mg 이상의 용량을 투여해도 더 큰 효과를 나타내지는 않으며 40mg 이상의 용량투여에 관한 연구는 실시된 바 없다.

② 치아짓게 이노제 및 다른 혈압강화제와 병용투여: 치아짓게 이노제 또는 다른 혈압강화제와 병용투여하는 경우에는 이 약의 용량을 감량(줄임)하며 필요한 경우 증량(양을 늘림)한다. 이러한 병용 투여 요법시 저혈압이 나타날 수 있으므로 신중히 관찰한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.

- 1) 이 약 또는 α-차단제에 과민증의 병력이 있는 환자
- 2) 12세 이하의 소아
- 3) 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당)분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.

- 1) 중증(심한 증상)의 간·신기능장애 환자
- 2) 다음 질환으로 진단받거나 이러한 질환의 병력이 있는 환자
기립성 저혈압, 기절발작, 의식상실, 심근경색, 뇌혈관장애, 일과성(한번 나타나고 없어지는) 허혈발작, 협심증, 위궤양, 알코올중독, 기타 간질환, III-IV 급 고혈압성 망막증, 인슐린 의존성 당뇨병
- 3) 이 약은 황색5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.

3. 이상반응

일반적으로 이 약의 투여와 관련된 이상반응은 경증(가벼운 증상) 내지 중등도이다.

1) 다른 α-차단제와 마찬가지로 이 약은 실신을 일으킬 수 있다(임상발현율: 약 1%). 때때로 실신은 심박수 120-160회/분의 빈맥(빠른맥)의 발작이 전제가 되는 경우도 있으나, 대개의 경우 과도한 기립성 저혈압에 의한 것으로 생각된다. 초회량(처음복용(사용)량) 투여 후 30-90분에 실신이 나타난 예가 있으며, 때때로 급하게 증량(양을 늘림)할 경우에 나타난 예가 있다. 실신하면 환자를 양와 위로 한 후 필요하면 보조요법을 실시한다. 이러한 이상반응은 자기제어 적어서 대개의 경우 초회 투여후 또는 그 이후 증량(양을 늘림) 도중에는 재발하지 않는다.

2) 이 약을 40mg까지 과량투여 받은 환자에서 일반적으로 어지러움, 약 네지 결림, 말초성 부종(부기)이 나타났다. 대부분 이 이상반응은 지속적인 요법으로 소실(없어짐)되거나 감량(줄임)하지 않고도 내약되었다.

3) 정신신경계: 우울, 신경과민, 때때로 어지러움, 두통, 권태감, 무력감, 발한(땀이 남), 불면, 냉감, 어귀결림, 드물게 졸음, 구갈(목마름), 마비감 등이 나타날 수 있다.

4) 순환기계: 빈맥(빠른맥), 혈관확장, 때때로 기립성 조절장애, 심계항진

- (두근거림), 부종(부기), 부정맥(기외수축(조기수축), 심방세동 등), 흉통(가슴통증), 드물게 협심증, 빈맥(빠른맥) 등이 나타날 수 있다.
- 5) 장장 : 때때로 AST, ALT, ALP, 총빌리루빈상승이 나타날 수 있다.
- 6) 소화기계 : 소화불량, 복부팽만감, 배탈, 때때로 복통(배아픔), 설사, 변비, 구역, 구토, 드물게 식욕부진 등이 나타날 수 있다.
- 7) 호흡기계 : 코피, 인플루엔자 증상(flu symptom), 인두염, 비염(코염), 호흡곤란, 감기증상, 비출혈(코막힘), 기침 증가, 부비강염 등이 나타날 수 있다.
- 8) 비뇨기계 : 때때로 빈뇨, 드물게 요설금(폐경기 이후의 여성), BUN, CPK 상승 등이 나타날 수 있다.
- 9) 감각기계 : 감각이상, 균형장애, 시각장애, 약시, 결막염, 이명(귀울림) 등이 나타날 수 있다.
- 10) 대사 : 수분 저류, 드물게 부종(부기) 등이 나타날 수 있다.
- 11) 과민증 : 때때로 발진 등이 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 투여를 중지한다.
- 12) 기타 : 체중 증가, 감각, 관절종창, 관절쇠약, 근육통, 성욕감퇴, 발한(땀이 남), 발기부전, 음경지속발기, 혈소판 감소, 때때로 흉분감, 코막힘, 숨막힌감, 눈의 위화감, 가려움 등이 나타날 수 있다. 또한 때때로 항핵항체(ANA) 양성도 나타날 수 있습니다.
- 13) 시판후 경험 : 드물게 이 약의 투여 후 아나필락시스를 포함한 알러지 반응이 관찰되었다. 시판후 조사 동안 지속발기증, 저혈소판증, 심방세동이 보고되었다. 또한 백내장 수술시 α_1 차단제 투여와 관련하여 '수술 중 홍채이완증후군'으로 알려져 있는 작은 동공 증후군의 변형이 보고되었다.
4. 일반적 주의
- 1) 이 약의 초회투여 또는 투약누락 후 요법재개와 관련하여 어지러움, 가벼운 두통증(머리무거움), 기립성 조절장애, 심계항진(두근거림), 두통, 졸음이 나타날 수 있으므로 환자에게 이러한 이상반응 및 그것이 발생할 수 있는 상황에 관해 주의시켜야 한다.
- 2) 투여초기 또는 용량을 증감하는 경우에 혈압강화작용에 의한 어지러움, 기립성 조절장애등이 나타날 수 있으므로 고소작업이나 자동차운전 등 위험이 수반되는 기계조작을 하지 않도록 주의해야 한다.
- 3) 눈을 자세히 않은 자세로부터 빨리 일어설 때 어지러움, 가벼운 두통증(머리무거움), 기절이 나타날 수 있으므로 환자에게 그 가능성에 관해 주의시키고, 이러한 증상이 나타나면 눈을 다음 제발을 막기 위해 일어시기 전에 수 분간 앉아 있도록 지시하여야 한다.
- 4) 이 약은 전립선비대증에 의한 배뇨장애의 대증요법(증상별로 치료하는 방법)이므로 이 약의 투여에 의해 효과가 나타나지 않는 경우에는 수술 등 다른 적절한 처치를 취해야 한다.
- 5) 양성 전립선비대증과 전립선암은 유사한 증상을 나타내고 함께 발병하기 쉬우므로 이 약으로 양성전립선비대증을 치료하기 전에 전립선암의 발생 여부를 확인해야 한다.
- 6) α_1 차단제를 복용하고 있거나 이전에 복용했던 일부 환자에서 백내장 수술을 하는 동안 '수술 중 홍채이완증후군(Intraoperative Floppy Iris Syndrome, IFIS)'이 관찰되었다. 따라서 안과에서는 수술시 홍채 족(iris hook), 홍채 확장 고리(iris dilator ring)또는 점탄성물질(viscoelastic substance)등 주로 사용하는 수술방법에 있어서 가능한 수술방법의 변화를 준비해야 한다.
5. 상호작용
- 1) 다른 약물과 뚜렷한 상호작용 없이 투여되고 있다.
- (1) 진통소염제(아세트아미노펜, 아스피린, 인도메타신, 이부프로펜, 페닐부타존, 텍스트로프로콕시드, 톨레민)
- (2) 강심배당체(디곡신)
- (3) 혈당강화제(클로르프로파미드, 인슐린, 톨라자미드, 톨부타미드)
- (4) 부정맥용제(프로카인아미드)
- (5) 항불안약, 진정제(클로라제페이트, 클로르디아제콕시드, 디아제팜, 플루라제팜)
- (6) 통풍약(알로푸리놀, 프로베네시드)
- (7) 항생물질(암피실린, 에리스로마이신, 페니실린, 테트라사이클린, 트리메토프림, 설파메복사졸)
- (8) 호르몬.스테로이드 제제(에스트로겐 제제)

- (9) 항히스타민제(클로르페니라민)
- (10) 심혈관약물(아테놀올, 히드로클로로치아지, 메틸글로르치아지, 프로프라놀롤)
- (11) 항콜린성교감신경효능약(페닐에프린, 페네프로판올아민, 히드로클로라이드, 슈도에페드린)
- (12) 위장관약(제산제)
- 2) 혈압강화제와 병용투여하는 경우에는 혈압강화작용이 증가될 수 있다.
- 3) 베라파밀과 병용투여하는 경우에는 상호작용이 증가될 수 있다.
6. 임부 및 수유부에 대한 투여
- 1) 동물실험에서 기형발생이 나타나지 않았으나 사람에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 치료상의 유효성이 위험성을 상회(위둘, 웃둘다)한다고 판단되는 경우에만 투여한다.
- 2) 동물실험(랫트)에서 모유중으로의 이행이 보고되어 있으므로 수유중에는 투여를 피하고 투약이한 경우에는 수유를 중단한다.
7. 소아에 대한 투여
- 소아에 대한 안전성 및 유효성이 확립되지 않았다(사용경험이 없다).
8. 고령자(노인)에 대한 투여
- 일반적으로 고령자(노인)에서의 과도한 혈압강화는 바람직하지 않으므로(머경색 등이 나타날 수 있다.) 저용량(1회 0.25mg 1일 2회)에서 투여를 시작하는 등 환자의 상태를 관찰하면서 신중히 투여한다.
9. 임상검사치에의 영향
- 이 약을 장기간 투여하여도 다음의 실험실적 검사치에는 임상적으로 유의성 있는 변화가 없었다. : 포도당, 요산, 크레아티닌, 요소, 간기능검사, 전해질, 혈액학적 검사치
10. 과량투여시의 처치
- 이 약의 투여로 급성 저혈압이 나타날 경우에는 심혈관계 보조요법이 가장 중요하다. 환자를 양압위로 뉘면 혈압이 회복되고 심박수가 정상화될 수 있다.
- 만일 이러한 처치가 부적절할 경우에는 우선 체액 증량제로 속을 치료한 후 필요하면 혈관수축제를 투여할 수 있다. 신기능을 검사하고 필요에 따라 일반적인 보조요법을 실시한다. 이 약은 단백질결합력이 높으므로 투석은 효과가 없다.
11. 보관 및 취급상의 주의사항
- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 2) 다른 용기에 바꾸어 넣은 것은 사교원인이 되거나 품질 유지면에서 바람직하지 않으므로 이를 주의할 것.
12. 기 타
- 1) 수컷 랫트에게 고용량으로 장기투여시 종양이 생성되었으나 마우스를 대상으로 한 유사한 시험에서는 이러한 증상이 없었다. 사람에 대한 이러한 증상과의 관련성은 알려진 바 없다.
- 2) 유사화합물(염산프로자신)에서 신장 부위의 동맥협착, 다리부위의 동맥류 등의 혈관장애가 있는 고혈압 환자에서 급성 열성 다발성(여러부위에서 동시에 나타나는)관절염이 나타났다는 보고가 있다.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관 【포장단위】 자사포장단위

- * 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품이며, 만약 구입시 사용 기한이 경과되었거나 변질, 변태 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.
- * 설명서개정년월 이후 변경된 내용은 온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)을 통하여 확인하실 수 있습니다.
- * 이 약을 사용하기 전에 반드시 설명서를 주의 깊게 읽으시고, 사용(유효)기한이 지난 의약품은 사용하지 마시고, 설명서는 항상 의약품과 함께 보관하시기 바랍니다.
- 제주문의: (032)812-8356 설명서개정년월: 2014년 04월



제조별매일

영종제약주식회사

인천광역시 남동구 월곶로 333