의약품을 복용하기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽고, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하여 주십시오.

KGMP 적격업체

고지혈증 치료제
조바코 정
(심바스타틴)

Zovaco Tab.

전 문 의 약 품
분류번호 : 218

■원료약품의 분량 1 정 중
- 유효성분: 심바스타틴(USP) ····· 20 mg
- 첨가제(타르색소): 황색5호 알루미늄레이크
- 첨가제(동물유래): 유당수화물(소-우유)
- 기타 첨가제: 라우릴황산나트륨, 미결정셀룰로오스, 산화티탄, 스테아르산마그네슘, 전분글리콜산나트륨, 탤크, 폴리에틸렌글리콜 6000, 히프로멜로오스

■성 상 황갈색의 타원형 필름코팅정

■효능·효과
1. 다음의 심장혈관 질환에 대한 위험성 감소
 관상동맥 심장 질환, 당뇨, 말초혈관질환, 뇌졸중 또는 기타 뇌혈관질환 병력으로 인해 관상동맥 사고의 위험성이 높은 성인 환자
 1) 관상동맥 심장 질환 사망의 위험성 감소
 2) 비치명적 심근경색 및 뇌졸중의 위험성 감소
 3) 관상동맥 및 비관상동맥 혈관재생술의 위험성 감소
2. 고지혈증
 1) 원발성 고콜레스테롤혈증(이형접합 가족형 및 비가족형) 및 혼합형 이상지질혈증(Fredrickson Type IIa 및 IIb형) 환자의 상승된 총콜레스테롤, LDL-콜레스테롤, 아포-B 단백 및 트리글리세라이드 수치를 감소시키고 HDL-콜레스테롤을 증가시키는 식이요법의 보조제
 2) Ⅱ형: 원발성 이상베타리포프로테인혈증
 3) Ⅳ형: 고트리글리세라이드혈증
 4) 동형접합 가족형 고콜레스테롤혈증의 총 콜레스테롤, LDL-콜레스테롤을 저하시키기 위해 다른 지질저하치료(예: LDL apheresis)와 병행하거나 다른 지질저하치료가 불가능한 경우
 이 약 치료 개시 전 속발성 고지혈증의 원인이 있는지 확인하여야 하며 총콜레스테롤, HDL-콜레스테롤 및 트리글리세라이드 등의 지질농도를 측정한다.
3. 이형접합 가족형 고콜레스테롤혈증의 소아 환자
 10 ~ 17 세의 이형접합 가족형 고콜레스테롤혈증을 가진 소아 환자(여성의 경우, 초경 이후 적어도 1 년이 지난 환자)에서 식이요법에도 불구하고 아래의 기준에 해당되는 경우 총 콜레스테롤, LDL-콜레스테롤, 아포-B 단백 수치를 감소시키기 위한 식이요법의 보조제
 가. LDL-콜레스테롤이 여전히 190 mg/dL 이상(≥ 190 mg/dL)이거나
 나. LDL-콜레스테롤이 여전히 160 mg/dL 이상(≥ 160 mg/dL)이고, 조기 심장혈관 질환에 대한 가족력이 있는 경우 또는 해당 소아 환자가 두 가지 이상의 다른 심장혈관 질환 위험인자를 가지고 있는 경우

■용법·용량
이 약 투여 전 및 투여 중인 환자는 반드시 표준 콜레스테롤 저하식을 해야 한다.
1. 심장혈관 질환에 대한 위험성감소
 관상동맥 심장 질환, 당뇨, 말초혈관질환, 뇌졸중 또는 기타 뇌혈관질환 병력으로 인해 관상동맥 심장 질환 사고의 위험성이 높은 성인 환자
 권장되는 초회 개시용량은 심바스타틴으로서 1 일 40 mg이다.
2. 고지혈증
 1) 관상동맥 심장 질환이 있는 고콜레스테롤혈증 환자의 위험성 감소 및 고지혈증
 일반적인 초회 개시용량으로 이 약으로서 20 mg을 1 일 1 회 저녁에 투여하는 것이 권장된다. 경증에서 중등도의 고콜레스테롤혈증 환자의 경우에는 이 약 10 mg으로 시작할 수 있다.
 1 일 1 회 저녁에 이 약 5 ~ 40 mg을 투여하는 것이 권장된다.
 투여 시작 전 초기의 LDL-콜레스테롤치, 치료의 목표치 및 환자의 약물에 대한 반응에 따라 용량을 적절히 조절한다. 콜레스테롤치를 치료 시작 후 4 주 및 그 이후 정기적으로 측정하여 투여량을 조절한다. 콜레스테롤 수치가 목표 수치 이하로 저하되면 감량한다.
 횡문근융해를 포함한 근육병증의 위험성 증가로 인해 특히, 치료 첫해 동안 이 약 80 mg 용량의 사용은 근육 독성의 증거 없이 이 약 80 mg을 12 개월 이상 복용한 환자에게만 투여한다(사용상의 주의사항 중 "1. 경고" 항 참조).
 2) 피브레이트계 약물(겜피브로질 및 페노피브레이트는 제외), 아미오다론, 베라파밀, 딜티아젬, 암로디핀과 이 약을 병용 투여하는 환자, 특정 환자군(즉, 동형접합 가족형 고콜레스테롤혈증 환자, 고령자, 신장에 환자)에게 권장되는 용량에 대해서는 아래의 내용을 참조한다.
  (1) 동형접합 가족형 고콜레스테롤혈증 환자에의 투여
  대조 임상시험 결과 동형접합 가족형 고콜레스테롤혈증 환자의 경우, 이 약을 1 일 40 mg씩 저녁에 투여한다. 다른 지질저하치료(예: LDL Apheresis)와 병행하거나 다른 지질저하치료가 불가능한 경우, 이 약을 투여한다.
  (2) 고령자에서는 이 약으로서 1 일 용량 20 mg으로도 콜레스테롤치의 최대감소 효과를 얻을 수 있다.
  (3) 베라파밀 또는 딜티아젬 또는 드로네다론을 투여하는 환자에의 투여
  베라파밀 또는 딜티아젬 또는 드로네다론을 투여하는 환자에게 이 약을 병용 투여하는 경우, 이 약의 용량은 1 일 10 mg을 초과해서는 안 된다.
  (4) 아미오다론 또는 암로디핀 또는 라놀라진을 투여하는 환자에의 투여
  아미오다론 또는 암로디핀 또는 라놀라진을 투여하는 환자에게 이 약을 병용 투여하는 경우, 이 약의 용량은 1 일 20 mg을 초과해서는 안 된다(사용상의 주의사항 중 "6. 상호작용" 항 참조).
  (5) 다른 지질저하제제의 병용 투여
  이 약은 단일투여 또는 담즙산제거약과 병용 투여 시 효과적이다. 이 약을 피브레이트계 약물(겜피브로질(사용상의 주의사항 중 "2. 다음 환자에는 투여하지 말 것" 항 참조) 및 페노피브레이트는 제외)과 병용 투여하는 경우, 이 약의 용량은 1 일 10 mg을 초과해서는 안 된다(사용상의 주의사항 중 "6. 상호작용" 항 참조).
  (6) 신장애 환자에의 투여
  이 약은 신장으로 많이 배설되지 않으므로 경증 내지 중등도의 신장애 환자의 경우, 용량 조절을 필요로 하지 않으나 중증 신장애 환자의 경우에는 초기 투여량을 1 일 5 mg으로 시작하여 세심하게 모니터링하여야 한다.
3. 이형접합 가족형 고콜레스테롤혈증 소아 환자(10 ~ 17 세)에의 투여
 권장 초회용량은 이 약으로서 1 일 1 회 10 mg으로 저녁에 투여한다. 권장 용량 범위는 1 일 10 ~ 40 mg으로 권장 최대용량은 1 일 40 mg이다. 투여용량은 권장되는 치료목표에 따라 개개 환자에서 적절히 증감한다. 용량 조절 시 4 주 또는 그 이상의 간격을 두어야 한다.

■사용상의 주의사항

1. 경고

근육병증/횡문근융해: 횡문근융해를 포함한 근육병증은 용량과 연관이 있다.
횡문근융해를 포함한 근육병증의 위험성은 유사한 LDL-콜레스테롤 감소 효능을 가진 다른 스타틴계 약물 치료 또는 저용량의 심바스타틴에 비해 이 약 80 mg을 복용하는 환자군에서 더 높다. 그러므로, 심바스타틴 80 mg을 복용하는 환자가 심바스타틴과 상호작용하는 약물을 복용해야 하는 경우, 저용량의 심바스타틴 또는 약물 상호작용 가능성이 낮은 다른 스타틴계 약물을 투여해야 한다("5. 일반적 주의" 항의 "1) 근육병증/횡문근융해" 항 참조).

2. 다음 환자에는 투여하지 말 것
 1) 이 약 및 이 약의 구성성분에 과민반응 환자
 2) 활동성 간질환 환자 또는 혈청 아미노전달효소 수치가 원인불명으로 지속적으로 높은 환자("5. 일반적 주의" 항 참조)
 3) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성 또는 수유부("7. 임부 및 수유부에 대한 투여" 항 참조)
 4) 강력한 CYP3A4 억제제를 투여 중인 환자("6. 상호작용" 항 참조)(예: 이트라코나졸, 케토코나졸, 포사코나졸, 보리코나졸, HIV 프로테아제 저해제, 보세프레비르, 텔라프레비르, 에리트로마이신, 클라리트로마이신, 텔리트로마이신, 네파조돈)
 5) 겜피브로질, 시클로스포린 또는 다나졸을 투여 중인 환자("6. 상호작용" 항 참조)
 6) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로 갈락토오스 불내성(Galactose Intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp Lactase Deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(Glucose-Galactose Malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다(유당함유 제제에 한함).

3. 다음 환자에는 신중히 투여할 것
 1) 알코올 중독자, 간장애 또는 그 병력이 있는 환자(이 약은 주로 간에서 대사되고 작용하므로 간장애를 악화시킬 우려가 있다. 알코올 중독자에서 횡문근융해가 나타나기 쉽다는 보고가 있다.)
 2) 신장애 또는 그 병력이 있는 환자(횡문근융해의 보고 사례 대부분이 신기능 장애를 갖는 환자이며 횡문근융해와 수반하여 급격한 신기능 악화가 인정되었다.)
 3) 갑상선기능저하증 환자, 유전성근육질환(근디스트로피 등) 또는 그 가족력이 있는 환자, 약물에 의한 근장애의 병력이 있는 환자(횡문근융해가 나타나기 쉽다는 보고가 있다.)
 4) 고령자
 5) 여성
 6) 이 약은 황색5호(선셋엘로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.

4. 이상반응

허가 전 대조임상시험 및 이후 연장 공개임상시험(2,423 명을 대상으로 평균 18 개월 간)에서 이 약으로 인한 이상반응으로 투약을 중지한 환자는 1.4 %였으며 대개 경증이며 일시적이었다. 21,000 명 이상에서 이 약의 심각한 이상반응을 평가하였으며 일반적으로 내약성이 양호하였다.
근육병증은 드물게 보고되었다("1. 경고" 항 참조).
임상적 이상반응
투여약과의 관련성을 고려하지 않은 상태에서 1 % 이상의 발현율을 보인 이상반응은 아래의 표와 같다.

	이 약(1,583 명) %	위약(157 명) %	콜레스티라민(179 명) %
전신반응			
복통	3,2	3,2	8,9
무력증	1,6	2,5	1,1
소화기계			
변비	2,3	1,3	29,1
설사	1,9	2,5	7,8
소화불량	1,1	–	4,5
팽만감	1,9	1,3	14,5
구역	1,3	1,9	10,1

전문의약품
분류번호 : 218

고지혈증 치료제
조바코 정
(심바스타틴)

ZVIT-2-210421

정신신경계			
두통	3,5	5,1	4,5
호흡기계			
상기도감염	2,1	1,9	3,4

4S 임상시험(Scandinavian Simvastatin Survival Study)
4,444 명을 대상으로 한 4S 임상시험에서 이 약 20 ~ 40 mg/일(n=2,221) 또는 위약(n=2,223)을 평균 5.4 년(중앙치) 동안 투여한 후 안전성 및 내약성을 비교한 결과 발현율이 위약군보다 크고 2 % 이상인 이상반응은 다음 표와 같다.

	이 약(N=2,221) %	위약(N=2,223) %
전신		
부종	2,7	2,3
복통	5,9	5,9
심혈관계		
심방세동	5,7	5,1
소화기계		
변비	2,2	1,6
위염	4,9	3,9
내분비계		
당뇨병	4,2	3,6
근골격계		
근육통	3,7	3,2
신경계/정신계		
두통	2,5	2,1
불면	4,0	3,8
어지러움	4,5	4,2
호흡기계		
기관지염	6,6	6,3
골염	2,3	1,8
피부		
습진	4,5	3,0
생식기계		
요로감염	3,2	3,1

HPS 임상시험(Heart Protection Study)
20,536 명을 대상으로 한 HPS 임상시험에서 이 약 40 mg/일(n=10,269) 또는 위약(n=10,267)을 평균 5 년 동안 투여하였을 때 두 군의 안전성 프로파일이 유사하였다. 이 대규모 임상시험에서는 중대한 이상반응 및 이상반응으로 인한 임상시험 중단만을 기록하였다. 이상반응으로 인한 임상시험 중단율은 두 군간에 유사하였다(이 약 투여군의 4.8 %; 위약 투여군의 5.1 %). 이 약 투여군에서의 근육병증/횡문근융해 발현율은 0.1 % 미만이었다. 아미노전달효소 수치 상승(제검사로 확정된 정상상한치의 3 배 이상)은 위약 치료군에서 0.09 % 발생한 반면 이 약 치료군에서는 0.21 % 발생하였다.
기타 임상시험
이 약으로 치료 받은 심근경색 병력이 있는 12,064 명을 대상으로 한 임상시험에서(평균 추적검사 6.7 년), 근육병증(크레아틴키나아제치(CK)가 정상 상한치의 10 배 초과를 갖으며 설명되지 않은 근육 약화 또는 통증으로 정의) 발병률은 1 일 80 mg 환자군에서 약 0.9 %에 비교하여 1 일 20 mg 환자군에서 0.02 %였다. 횡문근융해(크레아틴키나아제치(CK)가 정상 상한치의 40 배 초과를 갖는 근육병증으로 정의) 발병률은 1 일 80 mg 환자군에서 약 0.4 %에 비교하여 1 일 20 mg 환자군에서 0 % 였다. 횡문근융해를 포함한 근육병증의 발병률은 치료 첫해 동안 가장 높았으며 그 다음 년도 동안 현저하게 감소되었다.
다음의 이상반응은 동일 계열(HMG-CoA 환원효소 억제제) 약물군에서 보고되었으며 반드시 이 약에 의한 이상반응은 아니다.
1) 근골격계: 근육경련, 근육통, 근육병증, 횡문근융해, 관절통
 스타틴 사용과 관련하여 자가면역 근육병증인 면역-매개 괴사성 근육병증(Immune-Mediated Necrotizing Myopathy, IMNM)이 보고되었다. IMNM은 다음을 특징으로 한다. : 스타틴 투여 중단 후에도 지속되는 근위근 약화 및 혈청 크레아틴키나아제 상승, 근육 생검결과 유의한 염증이 없는 괴사성 근육병증 소견, 면역억제제에 의한 완화("5. 일반적 주의" 항의 "1) 근육병증/횡문근융해" 항 참조)
2) 신경계: 특정 뇌신경 기능장애(미각이상, 외안구운동장애, 안면불완전마비 등), 진전, 어지러움, 감각이상, 말초신경병증, 말초신경마비, 정신장애, 불안, 수면장애(불면 및 악몽 포함), 우울
 스타틴계 약물 투여와 관련하여 인지장애(예: 기억력감퇴, 건망증, 기억상실, 기억장애, 혼동)와 관련된 시판 후 보고가 드물게 있었다. 모든 스타틴계 약물군에서 이러한 인지 사례가 보고되었다. 일반적으로 증상이 심각하지 않고 스타틴 투여중단 시 회복 되었으며 증상 발생(1 일 ~ 수 년) 및 증상 소실(중앙값: 3 주) 시점에 대한 편차가 있다.
3) 호흡기계: 특히, 장기투여 시 간질성 폐질환과 같은 예외적인 사례
4) 과민반응: 다음과 같은 과민성 증후가 드물게 보고된 바 있다. : 아나필락시스, 혈관부종, 홍반루푸스모양 증후군, 류마티스성다발성 근육통, 피부근육염, 혈관염, 자색반, 혈소판 감소증, 백혈구 감소증, 용혈성빈혈, 혈핵형체양성, 적혈구 침강속도 증가, 호산구 증가증, 관절염, 관절통, 두드러기, 무력증, 광과민증, 발열, 오한, 홍조, 권태, 호흡곤란, 독성표피괴사사용해(리엘 증후군), 피부점막안 증후군(스티븐스-존슨 증후군)을 포함한 다형홍반
5) 소화기계/간담도계: 췌장염, 간염(만성 활성간염 포함), 치명적인 그리고 치명적이지 않은 간부전(매우 드물게), 쓸개즙 정체성 황달, 간지방 변화 및 드물게 간경화, 전격성 간괴사, 간암, 식욕부진, 구토
6) 피부: 탈모증, 가려움증, 다양한 피부변화(결절, 착색, 피부/점막건조, 머리카락/손톱의 변화)
7) 생식기계: 여성행유방증, 성욕감퇴, 성기능장애(발기부전 포함)
8) 눈: 백내장 진행(수정체혼탁), 눈근육마비
9) 혈액 및 림프계: 빈혈
10) 임상검사치 이상: 아미노전달효소, ALP, γ-GTP, 빌리루빈치 상승, 감상선기능 이상, 혈청 크레아틴키나아제(CK)치 상승, 일시적이고 경증인 간기능 검사 이상
11) 내분비계: 이 약을 포함한 스타틴계 약물 치료를 받은 환자에서 HbA1c 및 공복 혈당수치의 증가가 보고되었다.
 당뇨병: 위험요인의 존재여부에 따라 빈도가 달라질 것이다(공복혈당 ≥5,6 mmol/L, BMI >30 kg/m², 트리글리세라드의 증가, 고혈압 병력).
10 ~ 17 세 소아 환자
이형접합 가족형 고콜레스테롤혈증인 10 ~ 17 세의 소아환자(n=175, 여성의 경우, 초경 후 적어도 1 년이 지난 환자)를 대상으로 한 48 주간의 임상시험에서 이 약 투여군(1 일 10 ~ 40 mg)의 안전성 및 내약성 프로필은 위약군에서와 대체로 유사하였다. 두 군 모두에서 가장 빈번하게 관찰된 이상반응은 상기도 감염, 두통, 복통, 구역이었다("8. 소아에 대한 투여" 항 참조).

5. 일반적 주의
1) 근육병증/횡문근융해
 이 약은 다른 HMG-CoA 환원효소 억제제와 마찬가지로 근육병증을 유발할 수 있다. 근육병증은 근육통과 압통 혹은 근육약화를 주증상으로 하고 크레아틴키나아제(CK)의 상승(정상상한치의 10 배 이상)을 동반한다. 미오글로빈뇨증에 이차적으로 급성 신부전을 동반하거나 동반하지 않는 횡문근융해가 드물게 보고된 바 있다. 근육병증의 위험성은 현장 HMG-CoA 환원효소의 높은 억제 활성에 의해 증가된다. 근육병증을 유발하는 요소로는 65 세 이상의 고령자, 여성, 조절되지 않는 갑상선기능 저하와 신기능 손상 등이 있다.
 다른 HMG-CoA 환원효소 억제제와 같이 근육병증/횡문근융해에 대한 위험성은 용량과 관련이 있다.
 이 약을 투여한 41,413 명 환자의 임상시험 데이터베이스 중 평균 추적조사 기간이 4 년 이상인 24,747 명의 환자(약 60 %)에서 이 약 20 mg, 40 mg, 80 mg/일을 투여하였을 때 근육병증의 발현율은 각각 약 0.03 %, 0.08 % 및 0.61 %였다. 이 임상시험들에서 환자는 주의깊게 모니터링되었으며 약물상호작용이 있는 몇몇 의약품들은 제외되었다.
 심근경색증의 병력을 가진 환자에게 이 약 20 mg/일 또는 80 mg/일을 투여한 임상시험에서(평균 6.7 년 동안 추적조사) 근육병증 발현율은 20 mg 투여군에서 0.02 %(1/6,033 명)인 것에 비해 80 mg 투여군에서는 약 0.9 %(52/6,031 명) 였다. 근육병증 발현의 거의 절반이 치료받는 첫해에 발생하였으며 그 다음 해부터 약 0.1 %씩 발생하였다.
 횡문근융해를 포함한 근육병증의 위험성은 유사한 LDL-콜레스테롤 감소 효능을 가진 다른 스타틴계 약물 치료 또는 저용량의 심바스타틴에 비해 이 약 80 mg을 복용하는 환자군에서 더 높다. 또한, 이 약의 근육병증 발병시 치료받은 첫해에 가장 높게 발생하였으므로 1 년 이상 심바스타틴 80 mg을 근육독성의 증거 없이 사용해왔던 환자에 한하여 80 mg 용량을 유지할 수 있다.
 이 약 80 mg을 복용하는 환자가 이 약과 상호작용하는 약물을 복용해야 하는 경우, 저용량의 심바스타틴 또는 약물 상호작용 가능성이 낮은 다른 스타틴계 약물을 투여해야 한다(아래 내용 및 "용법·용량", "2. 다음 환자에는 투여하지 말 것" 항 참조).
 이 약의 투여를 시작하는 모든 환자 또는 이 약의 용량을 증량한 모든 환자에게 근육병증의 위험성을 알려야 하며 설명되지 않는 근육통, 압통 또는 근육약화가 생기거나 이 약 투여중지 후에도 근육의 징후나 증상이 지속된다면 즉시, 의사에게 알리도록 해야 한다("4. 이상반응" 항 참조). 만일, 근육병증이 진단되거나 의심되면 이 약의 투여를 즉시 중지해야 한다. 이런 증상이 나타나고 크레아틴키나아제가 정상상한치의 10 배 이상이면 근육병증을 의미한다. 대부분의 경우, 이 약의 즉각적인 투여중지 후 근육증상과 크레아틴키나아제 상승이 완화된다. 이 약의 투여를 시작하거나 용량을 증가시킨 환자에게는 정기적으로 크레아틴키나아제를 검사하는 것이 고려될 수 있다. 특히, 80 mg/일까지 증량한 환자는 정기적인 크레아틴키나아제 검사를 권장한다. 그러나, 크레아틴키나아제 모니터링으로 근육병증을 예방할 수 있는 것은 아니다.
 이 약의 투여로 횡문근융해가 발생하는 환자의 다수가 대개 장기간 당뇨병의 합병증인 신장애를 포함한 복합한 병력을 가지고 있다. 이러한 환자는 더욱 주의깊은 모니터링이 필요하다. 대수술 며칠 전과 중요한 내과적 또는 외과적 상황이 발생하였을 경우, 일시적으로 이 약의 투여를 중지해야 한다.
 심혈관질환의 위험성이 높은 환자들을 대상으로 심바스타틴 40 mg/일 또는 에제티미브/심바스타틴 10/40 mg/일(평균 3.9 년 동안 추적조사)을 투여한 임상시험에서 근육병증 발현율은 중국인 환자(n=5,468)에서 0.24 %인 것에 비해 비중국인 환자(n=7,367)에서는 약 0.05 %였다. 이 시험에서 분석한 아시아 피험자군은 중국인 뿐이었으나 이 약을 아시아 환자에게 처방할 때 주의를 기울여야 하고 필요로 하는 가장 낮은 용량만 사용해야 한다.
 약물 상호작용
 근육병증/횡문근융해의 위험성은 이 약과 다음 약의 병용 투여에 의해 증가된다.
 강력한 사이토크롬 CYP3A4 억제제: 이 약은 치료용량에서 CYP3A4에 대한 강력한 억제 효과를 가지는 것으로 알려져 있는 약물(예: 이트라코나졸, 케토코나졸, 포사코나졸, 보리코나졸, 에리트로마이신, 클라리트로마이신, 텔리트로마이신, HIV 프로테아제 저해제, 보세프레비르, 텔라프레비르, 네파조돈)과 병용 투여하지 않는다. 만일 강력한 CYP3A4 억제제의 단기투여가 불가피하다면 그 투여 기간 동안 일시적으로 이 약의 투여를 중지한다.
 겜피브로질, 시클로스포린 또는 다나졸: 이 약은 겜피브로질, 시클로스포린, 다나졸과 병용 투여하지 않는다("2. 다음 환자에는 투여하지 말 것" 및 "6. 상호작용" 항 참조).
 다른 피브레이트계 약물(겜피브로질 또는 페노피브레이트는 제외): 겜피브로질("2. 다음 환자에는 투여하지 말 것" 항 참조) 또는 페노피브레이트를 제외한 피브레이트계 약물을 병용 투여하고 있는 환자에서 이 약의 용량은 1 일 10 mg을 초과해서는 안된다. 이 약과 페노피브레이트를 병용 투여 하였을 때 병용 투여로 인한 근육병증의 위험성이 각각의 약물에 의한 위험성의 합보다 크다는 증거는 없다. 단독투여 시 근육병증을 유발할 수 있는 다른 약제와 마찬가지로 페노피브레이트를 이 약과 병용 투여할 때 주의를 기울여야 한다. 이 약과 피브레이트계 약물의 병용 투여 시 LDL-콜레스테롤의 추가저하 효과는 거의 없으나 트리글리세리드의 추가저하 및 HDL-콜레스테롤의 추가상승 효과가 나타날 수 있다. 주의깊게 모니터링을 실시한 소규모의 단기 임상시험에서 이 약과 피브레이트계 약물을 병용 투여 하였을 때 근육병증이 발현하지 않았다("6. 상호작용" 항 참조).
 류마티스: 이 약과 류마티스을 병용 투여하는 환자는 근육병증의 위험이 증가할 수 있다("6. 상호작용" 항 참조). 이 약과 류마티스산의 병용은 권장되지 않는다. 류마티스의 전신 사용이 필수적인 환자의 경우, 류마티스 치료 기간 동안 심바스타틴의 사용을 중지하여야 한다. 예외적으로 장기적인 류마티스의 전신 사용이 필요한 경우(예: 중증의 감염에 대한 치료), 이 약과 류마티스의 병용 투여에 대한 필요성을 각 사례별로 의사의 주의 깊은 감독 하에 고려해야 한다.
 아미오다론: 임상시험에서 이 약 80 mg과 아미오다론을 병용 투여한 환자의 6 %에서 근육병증이 보고되었다. 이 약의 용량은 아미오다론을 병용 투여하고 있는 환자에서 1 일 20 mg을 초과해서는 안 된다("6. 상호작용" 항 참조).
 드로네다론: 이 약의 용량은 드로네다론을 병용 투여하고 있는 환자에서 1 일 10 mg을 초과해서는 안 된다.
 라놀라진: 이 약의 용량은 라놀라진을 병용 투여하고 있는 환자에서 1 일 20 mg을 초과해서는 안 된다.
 칼슘채널차단제
 – 베라파밀 또는 딜티아젬: 임상시험에서 이 약 80 mg과 딜티아젬을 병용 투여한 환자는 근육병증의 위험성이 더 증가하였다. 이 약의 용량은 베라파밀 또는 딜티아젬을 병용 투여하고 있는 환자에서 1 일 10 mg을 초과해서는 안 된다("6. 상호작용" 항 참조).
 – 암로디핀: 임상시험에서 이 약 80 mg과 암로디핀을 병용 투여한 환자는 근육병증의 위험성이 약간 더 증가하였다("6. 상호작용" 항 참조). 이 약의 용량은 암로디핀을 병용 투여하고 있는 환자에서 1 일 20 mg을 초과해서는 안 된다.
 중간 정도의 CYP3A4 억제제: 이 약 특히, 고용량의 심바스타틴과 CYP3A4에 대한 중간 정도의 억제 효과를 가지는 것으로 알려져 있는 약물을 병용 투여하는 경우, 근육병증의 위험성이 증가할 수 있다. 중간 정도의 CYP3A4 억제제와 이 약을 병용 투여할 때 이 약의 용량 조절이 필요할 수 있다.
 니코틴산(1 일 1 g 이상): 이 약과 지질저하 용량(1 일 1 g 이상)의 니코틴산을 병용 투여 하였을 때 근육병증/횡문근융해가 관찰되었다. 심혈관질환의 위험성이 높고 심바스타틴 40 mg/일 단독 또는 에제티미브 10 mg과 병용하여 LDL-콜레스테롤치가 잘 조절되는 환자를 대상으로 한 임상시험(평균 3.9 년 동안 추적조사)에서 지질저하 용량(1 일 1 g 이상)의 니코틴산 추가에 따른 심혈관질환 개선 효과는 없었다. 따라서 이 약과 니코틴산 병용의 이점은 병용으로 인한 잠재적인 위험과 함께 고려해야 한다.
 추가로 이 시험에서 근육병증 발현율은 심바스타틴 40 mg 또는 에제티미브/심바스타틴 10/40 mg을 서방형 니코틴산/라로피프란트 2 g/40 mg과 병용 투여한 중국인 환자에서 1.24 %인 것에 비해 심바스타틴 40 mg 또는 에제티미브/심바스타틴 10/40 mg을 투여한 중국인 환자에서는 약 0.24 %였다. 이 시험에서 분석한 아시아 피험자군은 중국인 뿐이었으나 비중국인보다 중국인 환자군에서 근육병증 발현율이 높았기 때문에 지질저하 용량(1 일 1 g 이상)의 니코틴산과 이 약의 병용은 아시아 환자에게 권장되지 않는다. 비아시아 환자들의 경우, 1 일 20 mg을 초과하는 용량의 이 약과 지질저하 용량(1 일 1 g 이상)의 니코틴산을 병용 투여하기 않도록 한다("6. 상호작용" 항 참조).
2) 간기능 이상 환자
 임상시험 결과, 이 약을 투여한 환자의 1 %에서 혈청 아미노전달효소 수치의 지속적 상승(정상상한치의 3 배 이상)이 보고된 바 있다. 약물 투여를 일시적 또는 완전히 중지하였을 때 투여 전의 수치로 서서히 감소하였다. 또한, 황달이나 다른 임상증후, 증세를 수반하지 않았고 과민반응은 보이지 않았다. 이 중 일부 환자들의 경우, 심바스타틴 치료 이전에 간기능 검사치가 비정상이었고 또는 상당한 양의 알코올을 섭취하였다.
 4S(Scandinavian Simvastatin Survival Study) 임상시험 기간 동안 1 회 이상 아미노전달효소 수치가 상승(정상상한치의 3 배 이상)된 피험자는 심바스타틴군과 위약군(14 명[0,7 %], 12 명[0,6 %]) 간에 차이가 없었다. 임상시험 실시 첫해에는 심바스타틴군에서 ALT가 정상상한치의 3 배까지 단독으로 상승하는 빈도가 유의하게 높은 것으로 나타났으나(20 명 vs 8 명, p=0.023), 이후에는 그렇지 않았다. 심바스타틴군(n=2,221)의 경우 8 명 및 위약군(n=2,223)의 경우 5 명이 아미노전달효소 수치의 상승으로 투약을 중단하였다. 심바스타틴군의 1,986 명이 시험을 시작하기 전에 실시한 간기능 검사에서 정상이었으며 이후 5.4 년(중앙치)의 투여기간 동안 간기능 검사치가 정상상한치의 3 배 이상으로 증가된 예는 8 명(0.4 %)이었으며 8 명 중 5 명은 투여 후 1 년 이내에 발병하였고 투여 개시용량은 모두 20 mg이었으며 이 중 37 %가 40 mg으로 증량하였다.
 2 회의 대조임상시험에서 총 1,105 명에 대해 12 개월간 40 mg 또는 80 mg을 투여하였을 때 투여약과의 관련성을 고려하지 않은 상태에서 간 아미노전달효소 수치가 지속적으로 상승한 경우는 각각 0.9 %, 2.1 %였으며 투여시작 6 개월 이후 지속적으로 간기능 검사 상 이상을 나타낸 경우는 없었다.
 이 약 치료 시작 전 및 임상적 증상이 있는 경우, 간기능 검사를 반복적으로 실시할 것을 권장한다.
 이 약을 포함한 스타틴을 복용하는 환자에서 치명적 그리고 비-치명적 간부전이 드물게 시판 후 조사에서 보고되었다. 이 약 치료 중 임상적 증상 그리고/또는 고빌리루빈혈증 또는 황달을 동반한 중증 간손상이 발현될 경우, 치료를 중단하여야 하고 다른 병인이 확인되지 않을 경우, 재 투여를 하지 않는다. ALT는 근육에서 방출될 수 있으므로 크레아틴키나아제 상승을 동반한 ALT의 상승은 근육병증을 의미할 수 있음을 유의해야 한다("1. 경고" 항 참조).
 과음하는 경우 또는 간질환 병력이 있는 환자에게 투여 시 세심한 주의를 요한다. 활동성 간질환 환자 또는 혈청 아미노전달효소 수치가 원인불명으로 지속적으로 높은 환자에게 이 약을 사용할 수 없다.
 다른 지질저하제와 마찬가지로 이 약 투여 시 혈청 아미노전달효소 수치가 중등도(정상치의 3 배 이하)로 상승하는 경우가 있다. 대개 이 약 치료시작 직후에 일시적으로 상승하나 다른 임상증상이 동반되지 않는 경우, 투약을 중지할 필요는 없다.
3) 환자를 위한 정보
 환자에게 이 약과 병용 투여할 수 없는 약물에 대해 알리고 이 약 투여 중 설명되지 않는 근육통, 압통, 근육약화가 생기거나 이 약 투여중지 후에도 근육의 징후나 증상이 지속된다면 즉시 의사에게 알리도록 해야 한다("4. 이상반응", "5. 일반적 주의" 항의 "1) 근육병증/횡문근융해" 항 참조). 환자는 다른 의사에게 새로운 약물을 처방받을 경우, 이 약을 복용하고 있음을 알려야 한다.
4) 중추신경계(CNS) 독성
 임상적으로 정상인 개에 이 약 180 mg/kg/일씩 14 주간 투여한 결과, 시신경퇴행(Retinogeniculate 섬유의 Wallerian 퇴행)이 관찰되었다. 이 때의 평균 혈중 농도는 사람에게 80 mg/일의 용량으로 투여 시 도달되는 혈중 농도의 약 12 배였다.
 화학적으로 구조가 유사한 이 계열의 다른 약을 임상적으로 정상인 개에 60 mg/kg/일을 초기 용량으로 투여하였을 때 용량의 존적인 시신경의 퇴행(Retinogeniculate 섬유의 Wallerian 퇴행)이 관찰된 바 있다. 이 때의 평균 혈중 농도는 사람에게 최대용량으로 투여 시 도달되는 혈중 농도의 약 30 배 이상이다. 개에 이 약 180 mg/kg/일씩 14 주간 투여한 결과, 전정 와우기관에 Wallerian 유사 퇴행 및 말막 갱글리온 세포의 염색질 용해가 관찰되었고 이 때의 혈중 농도는 60 mg/kg/일 투여 시와 유사하였다.
 이 약 360 mg/kg/일의 용량으로 개에 투여 시 혈관주위의 출혈 및 부종, 혈관주위의 단핵구 침윤, 혈관주위에 피브린의 침착 및 소혈관의 괴사를 특징으로 하는 CNS 혈관의 손상이 관찰되었으며 이 때의 평균 혈중 농도는 사람에게 80 mg/일의 용량으로 투여 시 도달되는 혈중 농도의 약 14 배였다. 이 계열의 다른 약에서도 이와 유사한 CNS 혈관손상이 관찰되었다.
 암컷 랫트에 이 약을 50, 100 mg/kg/일(사람에게 80 mg/일의 용량으로 투여 시 도달되는 AUC의 각각 22, 25 배)씩 2 년간 투여하거나 개에게 이 약을 90 mg/kg/일(19 배)씩 3 개월간 투여 시 또는 50 mg/kg/일(5 배)씩 2 년간 투여 시 백내장이 발생하였다.
5) 간염, 간기능 장애, 황달: 간염, 황달 등 간기능 장애가 나타날 수 있다. 또한, 간부전으로 진행될 수 있으므로 정기적으로 간기능 검사 등 관찰을 충분히 하고 이상이 인정되는 경우, 투여를 중지하는 등 적절한 처치를 한다.
6) 말초신경장애: 사지의 감각둔마, 저림감 · 냉감 등의 감각장애 또는 근력저하 등 말초신경 장애가 나타날 수 있으므로 이상이 인정되는 경우, 투여를 중지하는 등 적절한 처치를 한다.
7) 혈소판 감소: 혈소판 감소가 나타날 수 있으므로 혈액검사 등 관찰을 충분히 하고 이상이 인정되는 경우, 투여를 중지하는 등 적절한 처치를 한다.
8) 과민증후군: 홍반루프스모양 증후군, 혈관염 등을 포함하는 과민증후군이 보고되었으므로 이러한 증상이 나타났을 경우, 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.
9) 간질성 폐질환: 이 약을 포함한 일부 스타틴계열 약물과 관련하여 특히, 장기투여 시 간질성 폐질환과 같은 이례적인 사례가 보고된 바 있다. 발현되는 양상으로는 호흡곤란, 비생산성 기침 및 일반적인 건강의 악화(피로