

제2세대 점액용해성
급·만성호흡기 질환 거담제

엘도린 캡슐

(에르도스테인)

ELDORIN CAPSULE (Erdosteine 300mg)

엘도린캡슐은 담을 신속하게 제거하면서 기관지와 폐포를 정상화시켜 호흡을 원활하게 해주는 훌륭한 거담제입니다. 또한 급·만성기관지염을 비롯하여 기관지확장증, 폐기종, 폐결핵과 폐암등 담으로 인해 호흡이 불편한 모든 하기도 호흡기질환에 효과 빠른 치료제입니다. 기존제품과는 달리 기관지와 폐에만 집중적으로 작용하여 효과가 신속, 정확하며 위점액에 영향을 주지 않으므로 위장장애가 거의 없어 장기복용이 가능합니다.

【약리작용 및 특징】

- 1) 점액분비 정상화작용
엘도린캡슐은 끈끈한 점액을 신속히 분해하며 담을 묽게 하고, 섬모운동을 촉진하여 객담의 배출을 쉽게 하는 우수한 효과를 나타냅니다.
- 2) 항균작용 및 기관지 보호작용
엘도린캡슐은 기관지 폐포가 파괴되는 것을 막아주며, 호흡기 면역물질(면역글로불린 A)의 양을 증가시키고, 인체내 생리적 항균물질(리소짐, 락토펜)의 양을 증가시킴으로써 호흡기를 근본적으로 강화시키고 외부 세균에 대한 저항력을 강화시킵니다.
- 3) Pro-drug 로서 위장장애가 없습니다.
엘도린캡슐은 기관지와 폐에만 집중적으로 작용하며, 기존제품과는 달리 위에서 흡수되지 않으므로 위점액에 영향이 미치지 않습니다. 따라서 위장장애가 거의 없어 장기복용이 가능합니다.
- 4) 항생제 또는 기관지확장제와 병용시 상승효과작용
엘도린캡슐은 항생제와 병용시 상승작용을 나타내어 치료기간을 단축시킵니다.

【원료약품 분류】 (1캡슐 중)

에르도스테인(Erdosteine) (별규) 300mg
첨가제(타르색소): 황색 5호, 황색 203호, 청색 1호

【성 상】

백색 내지 미백색의 분말 또는 과립이 충전된 상부 초록색 하부 미황색의 경질캡슐제

【효능 · 효과】

급·만성 호흡기질환에서의 점액용해 및 거담

【용법 · 용량】

성인: 에르도스테인으로서 1회 300mg(1캡슐)을 1일 2~3회 경구투여한다.(먹는다.복용한다)
급성 호흡기질환에 투여 시 연속으로 10일 이상 투여하지 않는다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에게는 투여하지 말 것.
 - 1) 이 약 또는 이 약의 구성성분에 과민반응이 있는 환자
 - 2) 간경변 환자와 시스타티오닌 합성효소(cystathionine-synthase) 결핍환자(이 약의 대사물이 메티오닌 대사를 방해할 수 있다.)
 - 3) 소화성 궤양 환자
 - 4) 중증(심한증상) 신장장애(크레아티닌청소율이<25 mL/min) 환자
 - 5) 중증(심한증상) 간장애 환자
2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.
 - 1) 경증(경증상, 가벼운 증상) 및 중등도 간장애 환자(이 약으로 인한 이상반응의 증가는 관찰되지 않았으나 이 약으로서 1일 300mg을 초과해서는 안 된다.)
 - 2) 이 약은 황색5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.
3. 이상반응
 - 1) 사용량보다 과량투여(1일 1200mg 이상)시 발한(땀이 남), 어지러움, 홍조가 나타났다.
 - 2) 신경계 : 두통
 - 3) 호흡기계 : 감기, 호흡곤란
 - 4) 피부 : 두드러기, 홍반, 습진
 - 5) 소화기계 : 미각이상, 구역, 구토, 설사, 상복부통, 복통(배아픔), 속쓰림
 - 6) 국내 시판 후 조사결과(조사증례수: 캡슐제 3,303명, 시럽제 791명)보고된 이상반응은 다음과 같으며, 이 약과의 관련여부는 확실하지 않다. : 피로, 소화불량, 복통(배아픔), 위장장애, 설사, 구토, 두통, 신물이 올라옴, 결절홍반, 심계항진(두근거림), 얼굴부종, 전신부종, 가려움, 무력감, 몽롱함, 발진
4. 상호작용
거담제(가래약)는 기침약과 병용투여 시 기침 완화에 의한 기관지 내 가래 배출 곤란으로 기관지감염의 위험을 높일 수 있고 기관지연축을 야기할 수 있으므로 특별히 주의한다.
5. 임부 및 수유부에 대한 투여
동물실험에서 수태, 태자의 배자발육과 또는 산후 발육에 대해서 어떤 직·간접적 유독성은 발견되지 않았으나 임신 중 또는 수유중의 투여에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부에는 투여하지 않는 것이 바람직하다.
6. 보관 및 취급상의 주의사항
 - 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
 - 2) 다른 용기에 바꾸어 넣는 것은 사고원인이 되거나 품질 유지 면에서 바람직하지 않으므로 이를 주의한다.

【저장방법】 기밀용기, 실온보관(1~30℃)

【포장단위】 자사포장단위

- * 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품이며, 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.
- * 설명서개정연월 이후 변경된 내용은 온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)에서 확인하실 수 있습니다.
- * 유효기간 또는 사용기한이 지난 의약품을 사용하시면 안 되며, 설명서는 꼭 읽으시고 의약품과 함께 보관하십시오.

설명서개정연월 : 2014년 03월

제품문의 (032) 812-8356



제조발매원

영종제약주식회사

인천광역시 남동구 함포로 333



본 의약품은 정부의 KGMP
(우수약품 관리기준)에
의거하여 엄격한 관리에
의해 생산된 제품입니다.