

진해거담제

비도스캡슐

에르도스테인



진해거담제

일반의약품
분류번호 02220

조제용

비도스캡슐

Beedos Cap.

■ 성분 · 함량 1캡슐 중 에르도스테인(별규) 300mg

첨가제(타르색소) : 황색5호, 황색203호, 청색1호

■ 성상 흰색~ 유백색의 결정성 분말이 들어있는 상부 녹색, 하부 황색의 경질캡슐제

■ 효능 · 효과 급·만성 호흡기질환에서의 점액응해 및 거담

■ 용법 · 용량 성인: 에르도스테인으로서 1회 300 mg을 1일 2~3회 경구투여한다.

급성 호흡기질환에 투여 시 연속으로 10일 이상 투여하지 않는다.

■ 사용상의 주의사항

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.

1) 이 약 또는 이 약의 구성성분에 과민반응이 있는 환자

2) 간경변 환자와 시스타티오닌 합성효소(cystathionine-synthase)결핍환자(이 약의 대사물이 메티오닌 대사를 방해할 수 있다.)

3) 소화성궤양 환자 4) 중증 신장장애(크레아티닌청소율이 <25 mL/min) 환자 5) 중증 간장애 환자

2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.

1) 경증 및 중등도 간장애 환자(이 약으로 인한 이상반응의 증가는 관찰되지 않았으나 이 약으로서 1일 300 mg을 초과해서는 안 된다.)

2) 당뇨병 환자 및 저칼로리식이요법 중인 환자(시럽제에 한함)

3) 이 약은 황색 5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자

3. 이상반응

1) 사용량보다 과량투여(1일 1200 mg이상)시 발한, 어지러움, 홍조가 나타났다. 2) 신경계: 두통

3) 호흡기계: 감기, 호흡곤란 4) 소화기계: 미각이상, 구역, 구토, 설사, 상복부통, 복통, 속쓰림

5) 피부: 두드러기, 홍반, 습진

6) 국내 시판 후 조사결과(조사증례수: 캡슐제 3,303명, 시럽제 791명) 보고된 이상반응은 다음과 같으며, 이 약과의 관련 여부는 확실하지 않다. : 피부 소하불량, 복통, 위장장애, 설사, 구토, 두통, 신물이 올라옴, 결절홍반, 심계항진, 얼굴부종, 전신 부종, 가려움, 무력감, 몽롱함, 발진

4. 상호작용

거담제는 기침약과 병용투여 시 기침 완화에 의한 기관지 내 가래 배출 곤란으로 기관지감염의 위험을 높일 수 있고 기관지 연속을 야기할 수 있으므로 특히 주의한다.

5. 임부 및 수유부에 대한 투여

동물실험에서 수태, 태자의 배자발육과 또는 산후 발육에 대해서 어떤 진·간접적 유독성은 발견되지 않았으나 임신 중 또는 수유중의 투여에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부에는 투여하지 않는 것이 바람직하다.

6. 보관 및 취급상의 주의사항

1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.

2) 다른 용기에 바꾸어 넣는 것은 사고원인이 되거나 품질 유지 면에서 바람직하지 않으므로 이를 주의한다.

■ 저장방법 · 사용기간 기밀용기, 실온(1~30℃)보관, 제조일로부터 36개월

■ 포장단위 자사기준

연락처 (02)848-8487 / 소비자상담실 080-700-0052 / <http://www.koreaprime.co.kr>

본 의약품은 엄격한 품질관리하여 제조된 K.G.M. 마크업 제품입니다. 만약 구입시 사용기간이 경과되었거나 변질, 변형 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

개장일자: 2013.10

제조사 · 판매원



한국프라임제약

원마복도 한우고 병용림 한우산단9로 100