

원료약품 및 그 분량 : 1캡슐중

오메프롤졸정용성고분(발류) 233mg

(오메프롤졸로서 20mg)

침기제(타르색소) : 캡슐제작적색 3호, 청색 1호, 황색 203호)

성 : 마늘색의 정용성 고분이 충전된 상부 직각상 하부 분홍색의 경질캡슐제

효능 · 효과

- 위궤양, 십이지장궤양의 단기치료
- 역성식 식도염 및 위식도 역류질환(GERD)의 증상(가슴앓이, 토출증)치료
- 졸릴거릴때는 증후군
- 심한 역류성식도염과 잘 치료되지 않는 소화성궤양의 유지요법
- Helicobacter pylori에 감염된 십이지장궤양의 재발 방지를 위한 항생제 병용요법
- 비스테로이드성 소염진통제(NSAID) 투여로 인한 위 · 십이지장궤양 또는 미란의 치료
- 위 · 십이지장 병변의 병력이 있는 비스테로이드성 소염진통제(NSAID) 장기투여 환자에서 NSAID 투여로 인한 위 · 십이지장궤양 또는 미란 및 소화불량증상의 예방
- 역성식 식도염의 재발방지

용법 · 용량

1. 성인

- 1) 위궤양 : 오메프라졸로서 1회 20mg 1일 1회 경구 투여한다. 대부분 4주 이내에 치유될 수 있으나 간혹 환자에 따라 치유기간이 달라질 수 있다. 처음 4주 투여 후 완치되지 않은 경우에는 계속해서 4주 더 투여한다. 다른 제제를 투여하여 효과를 보지 못한 환자에 있어서는 1회 40mg 1일 1회 투여하면 통상 8주 이내에 치유된다. 간혹 환자에 따라 치유기간이 달라질 수 있다. 재발하는 경우에는 치료를 반복한다.
 - 2) 십이지장궤양의 단기치료 : 1회 20mg 1일 1회 경구 투여한다. 대부분 2주 이내에 치유될 수 있으나 간혹 환자에 따라 치유기간이 달라질 수 있다. 처음 2주 투여 후 완치되지 않은 경우에는 계속해서 2주 더 투여한다. 다른 제제를 투여하여 효과를 보지 못한 환자에 있어서는 1회 40mg 1일 1회 투여하면 통상 4주 이내에 치유된다. 간혹 환자에 따라 치유기간이 달라질 수 있다. 재발하는 경우에는 치료를 반복한다.
 - 3) 역성식 식도염 : 1회 20mg 1일 1회 경구 투여한다. 대부분 4주 이내에 치유될 수 있으나 간혹 환자에 따라 치유기간이 달라질 수 있다. 처음 4주 투여 후 완치되지 않은 경우에는 계속해서 4주 더 투여한다. 다른 제제를 투여하여 효과를 보지 못한 환자에 있어서는 1회 40mg 1일 1회 투여하면 통상 8주 이내에 치유된다. 간혹 환자에 따라 치유기간이 달라질 수 있다. 재발하는 경우에는 치료를 반복한다.
 - 4) 울혈기혈전 증후군 : 초기 용량은 1회 60mg 1일 1회 경구 투여한다. 복용량은 개인에 따라 적의 조절하여 계속 치료한다. 90% 이상의 환자가 1일 20~120mg의 용량으로 효과를 볼 수 있으며 1일 80mg 이상 투여할 경우에는 그 투여량을 1일 2회 분할 투여한다.
 - 5) 심한 역류성식 식도염과 잘 치료되지 않는 소화성 궤양의 유지요법 : 1회 20mg 1일1회 경구투여한다. 재발하는 경우에는 용량을 1회 40mg 1일 1회로 증량할 수 있다.
 - 6) Helicobacter pylori에 감염된 십이지장궤양의 재발 방지를 위한 항생제 병용요법
 - 2제 요법 : 이 약 20mg과 아목시실린수화물 750~1000mg을 1일 2회 2시간 병용 투여한다.
 - 3제 요법 : 다음 항생제와 병용하여 이 약 40mg을 1일 1회 투여하거나 20mg을 1일 2회 투여한다.
 - ① 클라리트로마진 250mg과 메트로니다졸 400mg을 1일 2회 1시간 투여한다.
 - ② 아목시실린수화물 1g과 클라리트로마진 500mg을 1일 2회 1시간 투여한다.치료효과가 충분치 않을 경우 오메프라졸 단독투여를 계속할 수 있다.
 - 7) 위식도 역류질환(GERD)의 증상(가슴앓이, 토출 등)의 치료 : 1회 20mg 1일 1회 경구 투여한다. 일반적으로 2~4주간 부속된 치유가 가능하다.
 - 8) 비스테로이드성 소염진통제(NSAID) 투여로 인한 위 · 십이지장 궤양 또는 미란의 치료 : 1회 20mg 1일 1회 경구 투여한다. 대부분 4주 이내에 치유될 수 있으나 간혹 환자에 따라 치유기간이 달라질 수 있다. 처음 4주 투여 후 완치되지 않은 경우에는 계속해서 4주 더 투여한다.
 - 9) 위 · 십이지장 병변의 병력이 있는 비스테로이드성 소염진통제(NSAID) 장기 투여 환자에서 NSAID 투여로 인한 위 · 십이지장 궤양 또는 미란 및 소화불량 증상의 예방 유지요법 : 1회 20mg 1일 1회 경구 투여한다.
- ※ 이 약을 복용할 때는 적어도 반 컵 이상의 물과 함께 그대로 삼킨다.
- 연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

사용상의 주의사항

1. 다른 환자에 투여하지 말 것.

- 1) 이 약의 성분에 과민증이 있는 환자
- 2) 약성중요의 가능성이 있는 위궤양 환자 (약성중양 환자에게 이 약을 투여하는 경우 그 증상이 완화되거나 진전이 지연될 수 있다.) 이 약을 포함한 프로토펙트 제제들은 이 약과 병용투여할 수 없다(‘5. 상호작용, 참조).
- 3) 이 약을 유당불내하고 있으므로 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2. 다른 환자에게는 신중히 투여할 것.

- 1) 간장애가 있는 환자 (이 약의 생체이용률과 반감기가 증가되므로 1일 투여량은 10~20mg으로 충분하며, 특히 중증의 간기능 손상 환자에게 투여하는 경우 1일 투여량은 1캡슐(20mg)을 초과하지 않는다.)
- 2) 고령자

3. 이상반응

- 1) 정신신경계 : 흔하게 두통, 때때로 졸림, 한기증, 불면증, 감각이상증, 실신감, 어지러움이 나타날 수 있다. 착란, 흥분, 공격성, 환각, 우울이 특히 중증 환자에서 드물게 나타날 수 있다.
- 2) 간장 : 때때로 GOT, GPT 등의 간효소의 상승이 나타날 수 있으므로 이상이 인자되는 경우에는 투여를 중지한다. 드물게 황달이 있거나 없는 간염, 간부전 등의 중증의 간질환이 있는 환자에게는 보충투여가 나타날 수 있다.
- 3) 소화기계 : 흔하게 설사, 연변, 변비, 구역, 구토, 복통, 복부팽만 등의 위장장애, 드물게 구강건조, 구내염, 위장관계 칸디다증이 나타날 수 있다.
- 4) 피부 : 때때로 발진, 가려움, 파진, 두드러기, 가려움, 피부염, 드물게 수포성 발진, 스티븐스-존슨 증후군, 중증독성 표피박리(TS), 다형홍반, 광감수성, 탈모증이 나타날 수 있으나, 이러한 증상이 나타나는 경우에는 투여를 중지한다.
- 5) 과민증 : 드물게 혈관부종, 발열, 기관지경련, 간질성 신염, 아나필락시스 쇼크와 같은 과민증이 나타날 수 있다.
- 6) 심혈관계 : 흉통, 빈맥, 사맥 심계항진이 나타날 수 있다.
- 7) 혈액 : 드물게 백혈구감소증, 혈소판감소증, 무리립구증, 범혈구감소증이 나타날 수 있다.
- 8) 근골격계 : 때때로 등통, 드물게 관절통, 근육약화, 근육통이 나타날 수 있다.
- 9) 내분비계 : 드물게 여성형 유방이 나타날 수 있다.
- 10) 기타 : 때때로 기침, 무력증, 권태, 드물게 발호증, 발한증가, 시야혼탁, 시력장애, 미각장애, 여성에서 유방통, 유방 멍울, 자근통출혈, 발기부전증 등이 나타날 수 있다.
- 11) 시력부조 조사에서 나타난 이상반응
 - 감광 : 클로스트리듬 디퍼테이션 설사가 나타날 수 있다. (빈도불명)
 - 다발 및 영영역 : 매우 드물게 저시각내삽증이 나타날 수 있다.

4. 일반적 주의

- 1) 약으로 인해 약성중양의 증상이 완화되거나 진전이 지연될 수 있으므로 약성 중증이 의심되는 경우 증상의도하지 않은 현저한 증상 감소, 재발성 구토, 부전설사증, 토혈이나 흑독증 등이 있으면서 위궤양이 있거나 의심되는 경우 검사를 실시하여 약성중양 여부를 확인하여야 한다.

- 2) 위궤양이 의심되는 경우에는 초기 단계에서 X-ray나 위내시경 검사 등을 실시하여야 하며, 위암으로 확인될 경우에는 이 약의 투여를 중단한다.
- 3) 이 약을 장기간(특히 1년 이상) 투여하는 환자의 경우 장기간으로 검사를 받아야 한다.
- 4) 치료시 결과를 충분히 관찰하고 증상에 따라 이 약을 최소용량 및 적절한 치료기간으로 투여하여야 한다.
- 5) 일부 해외 약학연구에서 프로토펙트제제(Proton Pump Inhibitor) 치료와 고관절, 손목 및 척추 골절의 위험성 증가와 관련이 있을 가능성이 있다고 보고되었다. 골절의 위험은 골강용량을 상하하는 고용량을 투여한 환자와 1년 이상의 장기간을 환자에서 증가되었다.
- 6) 3개월 이상 프로토펙트제제(Proton Pump Inhibitor) 치료를 받은 환자들에서서 저시각내삽증이 드물게 보고되었으 며, 1년 이상 치료를 받은 경우에 가장 많이 나타났다. 대부분의 환자들에게 저시각내삽증의 치료로서 시각내삽보충 및 프로토펙트제제(Proton Pump Inhibitor) 투여 중단이 필요하다. 장기간 치료가 필요하거나 다국산 또는 저시각내삽증들을 유발하는 약물에 이노제를 병용투여하는 환자들은 치료 시작을 포함한 주지적 마그네슘 수치 모니터링이 필요하다. 중대한 이상반응은 간직, 부정맥, 발작을 포함한다.
- 7) 메토크레아이트 : 프로토펙트 억제제와 메토크레아이트로 고용량을 사용하는 경우, 메토크레아이트의 ‘사용상의 주의사항’, 참조를 병용하는 경우 메토크레아이트 그리고 / 또는 그 대체제의 혈청 농도가 상승 및 지속되어 메토크레아이트의 독성이 나타날 수 있다는 문헌보고가 있었다. 고용량의 메토크레아이트를 사용하는 경우, 프로토펙트 억제제의 일시적인 투여 중단을 고려할 수 있다.(‘5. 상호작용, 참조)
- 8) 프로토펙트제제로 인해 위내 산도가 감소하면 위장관에 보통 존재하는 세균의 수가 증가한다. 이 약으로 치료할 때 살모넬라, 캄필로박터, 클로스트리듬 디퍼테이션과 같은 세균에 의한 위장균의 감염 위험이 약간 증가할 수 있다. 이것은 클로스트리듬 디퍼테이션 설사 위험성 증가와 연관이 있으며 특히 입원환자에서 이러한 위험성이 증가되었다는 여러 관찰연구 결과가 보고되었다. 이러한 진전들은 실시증에서 개선되지 않았을 때 고려되어야 한다. (‘3. 이상반응, 참고) 클로스트리듬 디퍼테이션 설사는 거의 모든 항균제 사용 중 보고되고 있다.
- 9) 헬리코박터 필로리 박멸을 위한 항생제 병용요법으로 이 약과 같이 투여하는 항균제의 사용설명서를 참조해야 한다.
- 10) 이 약의 장구투여로 인해 저염산증 또는 위위산도에 의해 바타민 B12 (사노코보랄민) 흡수장애가 나타날 가능성이 있다.

5. 상호작용

- 1) 위약의 pH가 생체이용률의 중요한 결정 요인이 되는 약물(에코노코놀, 철염, 인페실린에스테르 등)인 경우에는 이 약에 의한 장기간 위산분비억제작용 때문에 이론적으로 약물의 흡수가 저해될 수 있다. 다른 산분비 억제제나 제산제와 이 약의 투여중에는 케토프로콜과 티트라코나졸의 흡수가 감소될 수 있다.
- 2) 이 약은 간에서 주로 CYP2C19에 의해 대사된다. 디아제팜, 페니토인 및 다른 바타민 G 갈항제 등과 같이 CYP2C19에 의해 대사되는 약물과 병용시 이들 약물의 배설을 지연시켜 혈청 농도를 증가시킬 수 있다. 이들 약물을 특히 페니토인 및 와르파린과 병용투여시에는 환자에 대한 모니터링을 하는 것이 권장되며, 이들 약물의 감량이 필요할 수 있다. 그러나 페니토인으로 지속적인 치료를 받은 환자에게 이 약 20mg/day를 병용 투여시 페니토인의 혈청 농도에 변화가 없었다. 와르파린 또는 바타민 G 갈항제를 받은 환자에게 이 약을 병용 투여할 때는, INR 모니터링이 권장되며 와르파린 (또는 다른 바타민 G 갈항제)의 감량이 필요할 수 있다. 그러나 와르파린으로 지속적인 치료를 받은 환자에게 이 약 20mg/day를 병용 투여시 INR의 변화는 없었다.
- 3) 시아로로소닌, 디아실릴, 벤디카제핀 등 Oxydchome P450 효소계를 통해 대사되는 약물과 상호작용이 보고된 바 있다. 이 약물 이들 약물과 병용투여시 환자의 투여기간에 모니터링하고 필요시 이들 약물의 용량을 조정한다.
- 4) 이 약을 클라리트로마진과 병용투여시 두 약물의 혈청농도가 증가하였다. 그러나 이는 메트로니다졸이나 아목시실린수화물과는 상호작용을 나타내지 않았다. 이들 약물은 이 약과 함께 Helicobacter pylori 박멸요법에 사용되는 항생제이다.
- 5) 간장애 환자들에게 이 약과 다국산을 병용투여했을 때 위내 pH의 증가로 다국산의 생체이용률이 10% 증가하였다.
- 6) 이 약을 페니타민, 테오필린, 카페인, 프로프라놀롤, 메토프롤롤, 시아로로소닌, 리도카인, 퀴닌, 에스테르들을, 피록시판, 디클로페낙, 나프록센 또는 제산제와 병용투여한 경우 상호작용은 발견되지 않았다. 이 약의 흡수는 알코올 또는 음식에 의해 영향을 받지 않았다.
- 7) 간장애 환자들에게 오메프라졸(20mg 1일 1회) 투여와 아타자-비어 300mg/리토-비르 100mg을 병용투여했을 때 아타자-비어의 노출이 감소했다(AUC, Cmax, Cmin이 약 75% 감소), 아타자-비어 400mg 1일 4회 투여는 오메프라졸의 아타자-비어 노출에 대한 영향을 생략시킬 수 있다. 이 약을 포함한 프로톤 펌프 저해제들은 아타자-비어와 병용투여할 수 없다.
- 8) 오메프라졸과 테크로리무스의 병용투여는 테크로리무스의 혈청 농도를 높일 수 있다. 이 약을 투여하기 시작하거나 중단할 때 테크로리무스의 혈청 농도를 모니터링하도록 한다.
- 9) 오메프라졸과 CYP2C19, CYP3A4 저해제인 보리코나졸과의 병용 투여는 이 약의 노출을 두 배 이상 증가시킬 수 있다. 오메프라졸 1일 40mg 투여는 보리코나졸(CYP2C19의 저해)의 Cmax와 AUC를 각각 15% 및 41%로 증가시켰다. 이 때문에 이 약의 용량을 조절할 필요는 없다. 그러나, 중증의 간기능 장애환자와 장기간의 치료가 필요한 환자에게서는 용량 조절을 고려하여야 한다.
- 10) 부작용 사례 보고 집단약동학 연구(population pharmacokinetic studies) 및 후향적 연구 등에서 메토크레아이트로 고용량을 사용하는 경우, 메토크레아이트의 ‘사용상의 주의사항’, 참조와 프로토펙트 억제제를 병용하는 경우 메토크레아이트 그리고/또는 그 대체제의 하드록시메토크레아이트의 혈청 농도가 상승 및 유지되어 메토크레아이트의 독성이 나타날 수 있다고 보고되었다. 그러나 고용량의 메토크레아이트와 프로토펙트 억제제에 대한 정식 약물상호작용 연구는 수행되지 않았다.(‘4. 일반적 주의, 참조)

6. 일부에 대한 투여

동물실험 (돼지) : 133mg/kg 경구투여에서 태독독성이 보고되어 있으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에게는 태독성의 유입성이 위험성을 상하한다고 판단되는 경우에만 투여한다.

7. 수유부에 대한 투여

이 약의 모유중으로의 이행 여부는 알려지지 않았으나 수유부에는 투여하지 않는 것이 바람직하다. 또한 부족하게 투여하는 경우에는 수유를 중단한다.

8. 소아에 대한 투여

소아에 대한 안전성이 확립되어 있지 않다.

9. 과량 투여시의 처치

이 약의 과량투여로 오심, 구토, 한기, 복통, 설사, 두통 등이 보고되었으며, 무감정, 우울, 착란이 나타난 증례도 있었다. 현재까지의 자료에 의하면 이 약의 과량투여와 연관되어 나타난 증상은 일시적이었고 심각한 결과가 초래된 증례는 보고된 바 없었다.

10. 보충 및 취급상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것
- 2) 다른 용기에 바꾸어 넣는 것은 시끄러운이 되거나 품질 유지면에서 바람직하지 않으므로 이를 주의할 것
- 3) 이 약은 사용 후 용기의 무결함을 잘 확인이 보관한다.

11. 기타

한 취에 장기간 투여되었던 환자에서 용량과 상관없이 있는 위위암증 (Gastric carcinoid tumor) 및 장크로닌화 세포 (Enterocromin-like cell) 비후가 보고하였다는 보고가 있다.

저장방법 : 기밀용기, 실온보관(1~30℃)

포장단위 : 28캡슐

- ※ 이 약품을 어린이의 손에 닿지 않게 보관하여야 합니다.

※ 사용기한이 지난 약품을 사용하지 않도록 합니다.

※ 약품을 복용하기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽으시고, 첨부문서를 약품과 함께 보관하여야 합니다.

※ 이 첨부서 첫 초 작성일 자(2005년 01월 01일) 이후 변경된 내용은 “온라인 의약품 데이터(http://drug.mfds.go.kr)”에서 확인할 수 있습니다.

※ 제품 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변태 또는 오손된 제품이 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드리며, 재정경제부고시 “소비자피해보상규정” 외의 소비자 정당한 피해는 보상하여 드립니다.