

티로엠®

효과 빠른 진경제

티로엠®

티로프라미드염산염

[원료약품 및 분량] 1정 중

- 유효성분 : 티로프라미드염산염 (별규) 100.0mg
- 첨가제(동물유래성분) : 유당수화물(소, 우유)
- 기타 첨가제 : 산화티탄, 스테아르산마그네슘, 옥수수전분, 전분글리콜산나트륨, 탈크, 포비돈, 폴리에틸렌글리콜6000, 히프로멜로로스

[성상] 흰색의 원형 필름코팅정**[효능·효과]**

1. 다음 질환에서의 급성 경련성 동통 : 간담도산통, 여러 원인에 의한 복부산통, 신장·요관의 산통
2. 다음 질환에서의 복부 경련 및 동통 : 위장관 이상운동증, 담석증, 담낭염, 수술 후 유착

[용법·용량]

- 성인 : 티로프라미드염산염으로서 1회 100mg 1일 2~3회 경구투여하십시오.
- 연령, 증상에 따라 적절히 증감하십시오.

[사용상의 주의사항]**1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.**

- 1) 외부자극으로 인해 위장관이 협착된 환자
- 2) 거대 결장, 허탈 환자
- 3) 이 약에 과민증 환자
- 4) 중증의 간부전 환자
- 5) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안됩니다.

2. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.

항콜린작용을 나타내지 않지만 녹내장 또는 전립선비대 환자에는 신중히 투여하십시오.

3. 이상반응

- 1) 구갈, 구역, 구토, 변비 등이 나타날 수 있습니다.
- 2) 가려움, 홍반 등의 알레르기증상이 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 투여를 중지하십시오.

4. 상호작용

혈압강하약물을 투여받는 환자에게 이 약을 고용량 투여할 경우에는 혈압강하효과가 상승될 수 있으므로 주의하십시오.

5. 임부에 대한 투여

동물실험에서 임부나 태아에 대한 이상반응을 나타내지는 않았으나 임부의 사용은 필요성이 인정되는 경우로 제한하고 의사의 감독하에 투여하십시오.

6. 보관 및 취급상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 2) 다른 용기에 바꾸어 넣는 것은 사고원인이 되거나 품질유지면에서 바람직하지 않으므로 이를 주의하십시오.

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30℃)보관 **[포장단위]** 30정/병, 500정/병

- 제조자 : (주)유명제약 충청북도 진천군 관해원면 읍소2길 33
- 제조의뢰자 : 삼익제약(주) 인천광역시 부평구 청안로 13, (02) 928-0661

* 처방된 증상, 처방된 환자 이외에는 사용하지 마십시오.

* 첨부문서를 읽고, 첨부문서를 보관하십시오.

* 사용기한이 지난 의약품을 사용하지 마십시오.

* 본 제제의 적절한 사용에도 불구하고 부작용 발생 시, 한국약품안전관리원(1644-6223)으로 부작용 피해구제 신청을 할 수 있습니다.

* 이 첨부문서 작성일자(2024. 02. 07)이후 변경된 내용은 삼익제약 홈페이지(<http://www.samik.co.kr>) 또는 의약품통합정보시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr>) 의약품 정보를 참조하세요.

* 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품은 구입처를 통해 교환해 드립니다. 본 제품은 공정거래위원회 고시 "소비자분쟁해결기준"에 의거 교환 또는 보상받을 수 있습니다.