

위장관 운동 정상화제

타미론정

(티로프라미드염산염)

KGMP지정업소

전문의약품

분류번호 : 124

타미론정은 위장관계, 담도계, 비뇨기계, 여성생식기계 등에서 평활근의 과도한 수축으로 인한 통증에 빠르고 효과적으로 작용하는 제제로서, 단순히 위장관 운동을 차단하는 기존의 진경제와는 달리 근 수축을 일으키는 Ca^{2+} 을 평활근 세포의 근육세포질세망에 저장시켰다가 필요시 방출시킴으로써 위장관 운동을 정상화시킵니다. 또한 기존 진경제인 항콜린제에서 나타나는 전신 부작용이 없는 안전한 약물입니다.

【성분·함량】 1정(146mg) 중

티로프라미드염산염 (별규) 100mg

첨가제(동물유래성분) : 유당수화물(기원동물:소, 사용부위:우유)

【성상】

백색의 원형 필름코팅정

【효능·효과】

1. 다음 질환에서의 급성 경련성 동통 : 간담도산통, 여러 원인에 의한 복부산통, 신장·요관의 산통
2. 다음 질환에서의 복부 경련 및 동통 : 위장관 이상운동증, 담석증, 담낭염, 수술 후 유착

【용법·용량】

성인 : 티로프라미드염산염으로서 1회 100mg 1일 2-3회 경구투여한다. 연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.
 - 1) 외부 자극으로 인해 위장관이 협착된 환자
 - 2) 거대 결장, 허탈 환자
 - 3) 이 약에 과민증 환자
 - 4) 중증의 간부전 환자

5) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.

항콜린작용을 나타내지 않지만 녹내장 또는 전립선비대 환자에는 신중히 투여한다.

3. 이상반응

1) 구갈, 구역, 구토, 변비 등이 나타날 수 있다.

2) 가려움, 홍반 등의 알레르기증상이 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 투여를 중지한다.

4. 상호작용

혈압강하약물을 투여받는 환자에게 이 약을 고용량 투여할 경우에는 혈압강하효과가 상승될 수 있으므로 주의한다.

5. 임부에 대한 투여

동물실험에서 임부나 태아에 대한 이상반응을 나타내지는 않았으나 임부의 사용은 필요성이 인정되는 경우로 제한하고 의사의 감독하에 투여한다.

6. 보관 및 취급상의 주의사항.

1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.

2) 다른 용기에 바꾸어 넣는 것은 사고원인이 되거나 품질유지면에서 바람직하지 않으므로 이를 주의할 것.

【저장방법 및 사용기간】

기밀용기, 실온(1~30℃)보관, 제조일로부터 36개월

【포장단위】

30, 500정

【반품 및 교환】

본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 사용(유효)기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 의약품이 발견될 경우 구입처를 통하여 교환해 드립니다.

※ 유효기한 또는 사용기한이 지난 의약품은 사용하지 않도록 합니다.

※ 본 설명서 개정년월일 이후의 변경된 내용은 식품의약품안전처 온라인의약도서관(<http://drug.mfds.go.kr>) 또는 당사 홈페이지(www.yypharm.co.kr)에서 확인하실 수 있습니다.

※ 제품관련 문의사항은 (주)유영제약 소비자상담실(수신자 부담전화 080-808-6114)로 문의바랍니다.

설명서 개정년월일 : 2014.05.09

PR3231405

Y
YOOUNG PHARMACEUTICAL
유영제약

제조판매자 (주)유영제약
충청북도 진천군 광혜원면 용소2길 33