

유로나정 (프로피베린염산염)

유로나정10mg (프로피베린염산염)

Brand of Propiverine · HCl

분류번호 : 259

【원료약품 및 그 분량】

10mg : 1정(62.5mg)중 프로피베린염산염(KPC).....10mg
 첨가제(동물유래) : 유당수화물(건강한 젖소, 우유)
 20mg : 1정(125mg)중 프로피베린염산염(KPC).....20mg
 첨가제(동물유래) : 유당수화물(건강한 젖소, 우유)

【성상】

10mg : 흰색의 원형 필름코팅정
 20mg : 흰색의 원형 필름코팅정

【효능·효과】

1. 하기질환 또는 아래 상태에 의한 빈뇨, 요실금 :
 신경인성방광, 신경성빈뇨, 불안정방광, 방광자극상태(만성방광염, 만성전립샘염)
 2. 과활동 방광의 소변 절박감, 빈뇨 및 절박성 요실금

【용법·용량】

성인 : 프로피베린염산염으로서 1일 1회 20mg을 식후 경구투여 한다.
 증상에 따라 적정 증감하지만, 효과가 불충분하고 안전성에 문제가 없다면 20mg을 1일 2회까지 복용할 수 있다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.
 (1) 이 약 또는 이 약의 구성성분에 과민반응 병력이 있는 환자
 (2) 유문, 십이지장 및 장관 폐쇄 환자(위장 평활근의 수축 및 운동을 억제하여 증상을 악화시킬 수 있다.)
 (3) 위부역증 또는 장관 이완증 환자(항콜린작용으로 증상을 악화시킬 수 있다.)
 (4) 요배 환자(항콜린 작용에 의해 배뇨의 방광수축이 저하되고 증상이 악화될 수 있다.)
 (5) 폐색우각녹내장 환자(항콜린작용으로 안압이 상승해 증상을 악화시킬 수 있다.)
 (6) 중증 근부력증 환자(항콜린작용으로 증상을 악화시킬 수 있다.)
 (7) 중증 심질환 환자(기외수축 등이 보고되어 있으므로 증상을 악화시킬 수 있다.)
 (8) 독성거대결장증 환자
 (9) 폐양성 대장염 환자(중독성 거대결장이 나타날 수 있다.)
 (10) 중등도 또는 중증 간장애 환자
 (11) 부종 또는 그 병력이 있는 환자(기외수축 등이 보고되어 있으므로 증상을 악화 또는 재발시킬 수 있다.)
 (12) 이 약은 유당수화물을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당수화물분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.
2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.
 (1) 배뇨곤란 환자(전립샘비대증 등에는 배뇨곤란을 더욱 악화시키거나 잔뇨가 증가될 수 있다.)
 (2) 간장애 또는 그 병력이 있는 환자(주로 간에서 대사되므로 이상반응이 나타났다는 보고가 있다.)
 (3) 신장애 또는 그 병력이 있는 환자(신배설이 감소해 이상반응이 나타났다는 보고가 있다. 신장애나 울혈성신부전에 기인한 빈뇨, 야간뇨와 기질성 방광질환에, 오로감염, 악성종양은 치료에서 제외되어야 한다.)
 (4) 피인선염 증상 또는 뇌혈관 장애 환자(증상이 악화되거나 정신신경증상이 나타날 수 있다.)
 (5) 갑상선기능항진증 환자(항콜린작용으로 빈맥 등의 교감신경 흥분증상이 악화될 수 있다.)
 (6) 고령자(고령자에 대한 투여 경험 부족)
 (7) 자율신경병증, 관상동맥질환, 심각한 울혈성부전, 빈맥, 전립샘비대증, 뇌경화증, 역류성 식도염으로 인한 열공헤르니아(hiatus hernia) 환자
 (8) 녹내장 환자(이 약은 폐색우각녹내장 환자에 금기이다. 폐색우각녹내장 이외에도 항콜린 작용에 의해 안압이 상승하여 증상이 악화될 수 있다.)
3. 이상반응
 (1) 중대한 이상반응
 (가) 정신신경계 : 때때로 환각, 헛소리나 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하여 이러한 증상이 나타날 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.
 (나) 소화기계 : 드물게 마비성 장폐색증이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하여 현저한 변비, 복부팽만감 등이 나타날 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.
 (다) 순환기계 : 심계항진, 기외수축, 사맥, QT연장, 심실성빈맥, 방실블록 등이 나타날 수 있으므로, 충분히 관찰하여 이러한 이상반응이 나타나는 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.
 (라) 혈액계 : 혈소판 감소가 나타날 수 있으므로 이상반응이 나타나는 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.
 (로) 비뇨기계 : 때때로 BUN, 혈청크레아티닌의 상승과 같은 신기능 장애 및 요폐가 나타날 수 있으므로 충분히 관찰하여 이상반응이 나타날 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.
 (리) 피부 : 피부점막만종후군(스티브슨-존슨 증후군)이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고 발열, 홍반, 가려움, 눈충혈, 구내염 등의 이상반응이 나타나는 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.
 (리) : 드물게 안압항진이 일어나 급성 녹내장 발작을 야기해 구역, 두통을 수반한 인통, 시력 저하 등이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하여 이러한 이상반응이 나타날 경우에는 투여를 중지하고 즉시 적절한 처치를 한다.

- (8) 간장 : ALP, AST, ALT, γ -GTP의 상승 등을 수반하는 간기능 장애, 황달이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고 이상반응이 나타나는 경우에는 투여를 중지하는 등 적절한 처치를 한다.
- (9) 근골격계 : 근육통, 무력감, CK상승, 혈중 또는 요중 미오글로빈 상승을 특징으로 하는 횡문근융해증이 나타날 수 있으므로, 이러한 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.
- 2) 기타

	≥ 5%	0.1% ~ < 5%	0.1% >	빈도불명
소화기계	구갈	변비, 복통, 구역, 구토, 소화불량, 설사	식욕부진, 구내염, 설염	
비뇨기계		배뇨곤란, 잔뇨	요의소실	
정신신경계	어지럼, 두통		마비감, 졸음, 불면, 떨	의식장애(지각장애, 일과성 건망), 파킨슨증상(보행장애, 진전 등), 이상운동증
심혈관계	혈압저하		심계항진, 혈압상승	빈맥, 기외수축, 가슴통증
피인종	가려움, 발진		두드러기	
눈	조절장애		안구건조증	
간장	AST, ALT, ALP 상승			
신장			BUN, 크레아티닌상승	
혈액계	백혈구감소			
기타	피로	관태감, 부종, 무력감, 미각이상, 오통, 식욕소라, 객담, 흉부, 땀분비감소로 인한 열, 식악		인두통

- 3) 국내 시판 후 조사결과(조사종래수 : 751명) 보고된 이상반응은 다음과 같으며, 이 약과의 관련 여부는 확실하지 않다. : 상기조감염, 기침, 피부자색, 악노, 백혈구증가증, 이명, 통증
4. 일반적 주의
 (1) 이 약을 복용할 때, 충분한 삼킴으로 임상 증상이 확실해야하고 유사 증상을 보이는 질병(방광염, 전립샘염)을 포함하는 하부 요로에서의 요로감염, 요로결석증, 종양 등의 존재 유무에 주의해야한다.
 (2) 복잡한 하부요로의 폐색질환(전립샘비대 등) 환자는 그 질환의 치료에 우선시되어야 한다.
 (3) 안조절장애, 수면장애, 졸음, 어지럼이 나타날 수 있으므로 자동차운전 등 위험이 수반되는 기계 조작을 하지 않도록 주의한다.
5. 상호작용
 다음 약과 병용 투여하는 경우에는 주의한다 : 항콜린제, 산해제 항우울제, 페노티아진계 약물, MAO억제제(항콜린작용 등이 증가되었다는 보고가 있다.)
6. 임부 및 수유부에 대한 투여
 (1) 임신 중의 투여에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성에는 투여하지 않는 것이 바람직하다.
 (2) 동물실험(랫트)에서 유증으로의 분비가 보고되어 있으므로 수유중인 여성은 수유를 중지하는 것이 바람직하다.
7. 소아에 대한 투여
 소아에 대한 임상평가 및 안전성이 확립되어 있지 않으므로 투여하지 않는 것이 바람직하다.
8. 고령자에 대한 투여
 고령자는 간기능, 신기능이 저하되어 있는 경우가 많으므로 안전성을 고려하여 10 mg/일로 투여를 개시하는 등 신중히 투여한다.
9. 과량투여시의 처치
 (1) 증상 : 헛소리, 흥분, 정신경련, 보행장애, 언어장애, 산동, 마비성장폐색, 요폐, 빈맥, 혈압상승, 전신홍조, 간장에 등이 나타난다.
 (2) 처치 : 위세척후 아트로핀 과량투여의 경우와 마찬가지로 처치한다. 예를 들면, 네오스티그민(항콜린작용에 대한), 항불안제, 수액요법 등의 대응요법을 한다.
10. 보관 및 취급상의 주의사항
 (1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
 (2) 다른 용기에 바꾸어 넣는 것은 사고원인이 되거나 품질 유지면에서 바람직하지 않으므로 이를 주의한다.
11. 기타
 임수 랫트 또는 마우스에 2년간 경구투여했을 때, 수컷 랫트에 있어서 임상용량의 122배(49 mg/kg/일) 투여군에서 신중량, 수컷 마우스에 있어서 임상 용량의 447배(179 mg/kg/일) 투여군에서 간 종양의 발생률이 대조군에 비해 높다는 보고가 있다.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1-30℃)보관

【사용기간】 제조일로부터 36개월

【포장단위】 자사포장단위

※ 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품을 구입하였을 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

※ 첨부문서 작성일자 이후 변경된 내용은 명문제약 홈페이지나 소비자 상담전화로 확인하실 수 있습니다.

☎ 소비자 상담전화 : 080-022-5805 (무료전화서비스)

제조 · 판매원
명문제약주식회사
 경기도 화성시 향남읍 제막공단 2길 26
 www.mmpfarm.co.kr

〈설문서작성년월: 05, 02〉
 〈설문서개정년월: 14, 08〉
 (M09)