


원료약품 및 분량 (1캡슐 중)

- **유효성분 :**
폴리사카리드철착염(KP)(철(Fe)로서 150mg)..... 326.1mg
시아노코발라민1000배산(KP)(시아노코발라민으로서 25μg) 25.0mg
폴산(엽산)(KP).....1.0mg
- **첨가제(타르색소) :** 적색3호, 황색5호
- **첨가제(동물유래성분) :** 유당수화물(소, 우유), 캡슐(소/돼지, 가죽, 젤라틴)
- **기타 첨가제 :** 라우릴황산나트륨, 카복시메틸셀룰로오스칼슘, 크로스포비돈, 툴크, 포비돈

성상



엷은 갈색 ~ 검정색의 과립이 함유된 상 · 하부 중등색의 경질캡슐제

효능 · 효과

철 결핍성 빈혈의 예방 및 치료

용법 · 용량

성인 : 1일 1회, 1회 1캡슐을 복용합니다.

헤리타프에프캡슐은 어린이가 함부로 뚜껑을 열어 과량 복용하게 되는 사고를 미연에 방지하기 위하여 특수 고안된 뚜껑(Children Resistance Cap)을 사용하고 있습니다.

[사용법]

1. 병뚜껑을 위에서 아래로 힘껏 누릅니다.
2. 뚜껑을 누른 상태에서 시계 반대 방향으로 돌립니다.



사용상의 주의사항

복용하시기 전에 아래의 주의사항을 잘 읽어보신 후 복용하시기 바랍니다.

1. **경고 :** 철 함유제제는 6세 이하의 어린이가 사고로 과량 복용하였을 경우 중독성 사망을 일으킬 수 있으므로 어린이의 손에 닿지 않도록 보관합니다. 만약 어린이가 사고로 복용하였을 경우, 즉시 의사나 응급센터에 연락합니다.

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.

- 1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분예의 과민반응 환자
- 2) 12개월 미만의 영아(갓난아기)
- 3) 혈색소증(철대사 이상으로 철이 간장, 췌장(이자)에 침착하는 질환), 헤모시데린침착증(조직장애는 일으키지 않으나 국소적 또는 전신적으로 조직의 (헤모시데린으로서의) 철 함유량이 증가한 상태) 환자
- 4) 비철결핍성빈혈 (예 : 비타민 B12 결핍에 인한 거대적아구성 빈혈) 환자
- 5) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자

※1800095-1211217

3. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 마십시오.

- 1) 인산염, 칼슘염 2) 경구용(먹는)테트라사이클린계 제제 3) 제산제

4. 이 약을 복용하는 동안 다음의 행위를 하지 마십시오.

녹차, 홍차등 탄닌을 함유하는 차 및 우유 · 유제품은 복용 중, 복용전후에는 피합니다.

5. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과 의사, 약사와 상의합니다.

- 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자 2) 소화성궤양, 만성궤양성대장염, 국한성대장염 등의 위장질환 환자
- 3) 심장 · 순환기계기능 장애 환자 4) 신장장애(신장장애) 환자 5) 저단백혈증 환자 6) 임부, 수유부
- 7) 항알도스테론제, 트리암테렌과 함께 복용하는 사람(고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의합니다.)
- 8) 이 약은 황색5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여합니다.

6. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과 의사, 약사와 상의합니다. 상담시 가능한 이 첨부 문서를 소지합니다.

- 1) 때때로 홍반(붉은 반점), 피부질환, 가려움, 전신권태, 기관지에 의한 호흡곤란 등의 알레르기 증상이 나타나는 경우
- 2) 두드러기, 가려움, 햇빛에 의한 피부 과민반응 3) 복부(배부분) · 위통증, 위 경련 4) 구토, 설사
- 5) 열, 혼수 6) 구역, 식욕부진, 체중감소, 부종(부기), 복통(배아픔), 설사, 변비, 흑변(검은변), 위부불쾌감
- 7) 폴산(엽산)이 부족한 환자에게 비타민 B12를 1일 10μg 이상 투여할 경우 혈액학적 반응이 나타날 수 있습니다.
- 8) 대량투여로 인해 복부(배부분) 통증, 구토, 구역, 설사, 흑변(검은변), 토혈(혈액 구토), 저혈압, 고나트륨혈증, 울혈성심부전, 부종(부기), 빈맥(빠른 맥), 대사성 산증, 고지혈증, 탈수, 졸음, 창백, 권태, 발작, 속, 혼수

7. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항

- 1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지키십시오.
- 2) 1개월 정도 투여하여도 증상의 개선이 없거나 악화되는 경우에는 의사 또는 약사와 상의합니다.
- 3) 치료를 시작하기 전에 빈혈의 유형과 그 원인을 파악해야 합니다. 빈혈은 혈액 손실과 같은 전신적인 장애에 의해 발생할 수 있으므로, 가능한 한 이러한 원인들이 먼저 치료되어야 합니다.
- 4) 이 약에 함유된 폴산(엽산)은 악성빈혈이 있는 환자에 투여하면 혈액상태는 개선되지만 신경증상에 효과가 없으므로 악성빈혈의 환자에 투여하는 경우에는 비타민 B12제제와 병용(함께 복용)합니다. 다만, 진단이 확립되지 않은 악성빈혈이 있는 환자의 경우에 혈액상태의 개선에 의해 악성빈혈을 은폐하고 진단 및 치료에 영향을 주게 되므로 주의합니다.
- 5) 아스코르브산(비타민 C) 200 mg 이상과 함께 복용하는 경우 철분의 흡수가 증가될 수 있습니다.

8. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관합니다.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여(뚜껑을 꼭 닫아) 보관합니다.
- 3) 오용(잘못 사용) · 남용을 피하고, 품질을 보호 · 유지하기 위해 다른 용기에 넣지 마십시오.

※ 흡수되고 남은 철분이 산화되어 변의 색이 진하게 될 수 있습니다. 정상적인 반응이므로 안심하시고 복용하시기 바랍니다.

※ 개봉한 약을 냉장고, 욕실, 주방 등 습기가 많은 곳이나 직사광선이 닿는 곳에 보관하지 마십시오. 습기, 열, 빛은 약의 효과와 안정성에 영향을 줄 수 있으니 보관에 주의바랍니다.

저장방법

포장단위

기밀용기, 실온(1~30℃)보관

60캡슐/병, 120캡슐(60캡슐/병×2)

※ 사용기한 또는 유효기한이 지났거나 변질 · 변패 · 오염되거나 손상된 의약품은 공정거래 위원회 고시 소비자 분쟁해결 기준에 의거, 약국개설자, 안전상비의약품 판매자 및 의약품 판매업자를 통해 교환 또는 환불받을 수 있습니다.

※ 이 설명서는 2021년 12월 17일자로 작성되었으며 이후로 변경된 내용은 홈페이지(www.ildong.com)에서 확인할 수 있습니다.

※ 의약품 부작용 신고 · 피해구제 상담 : 한국의약품안전관리원 (1644-6223, 14-3330)

제조사 : 태극제약(주)

경기도 화성시 향남읍 제약공단3길 123

제조의뢰자 : 일동제약주식회사

본사 : 서울특별시 서초구 바우뫼로27길 2

공장 : 경기도 안성시 공단1로 25

소비자상담실 : (전화) 080-022-1010 (수신자부담)