

알도스텐캡슐

300mg

(에르도스테인)

ILDONG

급·만성 호흡기 질환 거담제

알도스텐캡슐 300mg
(에르도스테인)

호흡기질환 환자의 객담은 점성이 과도하게 증가되어 기관지 섬모운동에 의해 배출되기 어렵습니다. 이렇게 배출되지 못한 객담은 기도폐쇄, 2차 세균감염 등 합병증을 유발합니다. 알도스텐캡슐은 객담의 점도를 낮추고, 점막 섬모의 배출 능력을 촉진시켜 객담을 빠르게 배출시켜 줍니다. 또한 기관지내 세균 부착을 방지하고 객담에서의 항생제 농도를 높여 항생제와 병용 시 상승효과를 나타내며 기관지 염증 반응을 억제함으로써 호흡기 보호작용을 나타내는 거담제입니다.

원료약품의 분량 (1캡슐중)

에르도스테인 (별규) 300.0mg

캡슐기제 (타르색소) : 황색5호, 황색203호, 청색1호

성상 : 이 약은 백색의 분말이 들어있는 상부 초록색, 하부 미황색의 경질 캡슐제입니다.

IDP

ADS

효능·효과 : 급·만성 호흡기질환에서의 점액용해 및 거담

용법·용량 : 성인 : 에르도스테인으로서 1회 300mg을 1일 2~3회 경구투여합니다.
급성 호흡기질환에 투여 시 연속으로 10일 이상 투여하지 않습니다.

사용상의 주의사항

1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.

- 1) 이 약 또는 이 약의 구성성분에 과민반응이 있는 환자
- 2) 간경변 환자와 시스타티오닌 합성효소 (cystathionine-synthase) 결핍환자 (이 약의 대사물이 메티오닌 대사를 방해할 수 있습니다.)
- 3) 소화성궤양 환자
- 4) 중증 신장장애 (크레아티닌청소율이 < 25mL/min) 환자
- 5) 중증 간장애 환자

2. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.

- 1) 경증 및 중등도 간장애 환자가 이 약으로 인한 이상반응의 증가는 관찰되지 않았으나 이 약으로서 1일 300mg을 초과해서는 안 됩니다.)
- 2) 이 약은 황색5호 (선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여하십시오.

3. 이상반응

- 1) 사용량보다 과량투여(1일 1200mg 이상)시 발한, 어지러움, 홍조가 나타났습니다.
- 2) 신경계 : 두통
- 3) 호흡기계 : 감기, 호흡곤란
- 4) 소화기계 : 미각이상, 구역, 구토, 설사, 상복부통, 복통, 속쓰림
- 5) 피부 : 두드러기, 홍반, 습진
- 6) 국내 시판 후 조사결과 (조사종래수 : 캡슐제 3,303명, 시럽제 791명) 보고된 이상반응은 다음과 같으며, 이 약과의 관련 여부는 확실하지 않습니다. : 피로, 소화불량, 복통, 위장장애, 설사, 구토, 두통, 신물이 올라옴, 결절홍반, 심계항진, 얼굴부종, 전신부종, 가려움, 무력감, 몽롱함, 발진

4. 상호작용

거담제는 기침약과 병용투여 시 기침 완화에 의한 기관지 내 가래 배출 곤란으로 기관지감염의 위험을 높일 수 있고 기관지연축을 야기할 수 있으므로 특히 주의합니다.

5. 임부 및 수유부에 대한 투여

동물실험에서 수태, 태자의 배자발육과 또는 산후 발육에 대해서 어떤 직·간접적 유독성은 발견되지 않았으나 임신 중 또는 수유중의 투여에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부에는 투여하지 않는 것이 바람직합니다.

6. 보관 및 취급상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관합니다.
- 2) 다른 용기에 바꾸어 넣는 것은 사고원인이 되거나 품질 유지면에서 바람직하지 않으므로 이를 주의합니다.

저장방법 : 기밀용기, 실온 (1~30℃)보관**포장단위** : 30, 100캡슐

- 이 제품은 공정거래 위원회 고시 소비자 분쟁해결 기준에 의거 교환 또는 보상받을 수 있습니다.
- 이 설명서는 2013년 2월 1일자로 작성되었으며 이후로 변경된 내용은 홈페이지 (www.ildong.com)에서 확인할 수 있습니다.

일동제약주식회사

본사 서울특별시 서초구 바우포로 27길 2 (전화) 02-526-3114

공장 경기도 안성시 공단로 25

소비자상담실 : (전화) 080-022-1010 (수신자부담)

ILDONG