

조제용
일반의약품

고단위 단백질해소효소제

브로다제 장용정

(브로멜라인)

500 정

영풍제약(주)
인천광역시 남동구 함박외로 333
제품문의 032-812-8356



【원료약품 및 그 분량】 1경종·유효성분: 브로멜라인(별규)(500(FP단위)로서) ... 100mg(5 FIP/mg)·첨가제(동물 유래성분): 유당수화물(기원동물: 소, 사용부위: 우유)·첨가제(타르색소): 적색40호, 황색5호, 청색2호·기타첨가제: 미결정셀룰로오스, 폴리에틸렌글리콜, 크로스포비론, 스테아르산마그네슘, 탈칼드환색11W401, 탈칼드분홍색39P407**【성상】** 분홍색의 원형 장용성 정형고형정**【효능·효과】** 부종(부기)을 동반한 각종 종양의 완화, 외상(상처) 또는 수술후의 부종(부기)**【용법·용량】** 성인 및 12세 이상의 소아: 브로멜라인으로서 1회 100mg, 1일 2회 복용한다. 식사 30분 전에 물과 함께 복용한다. 체내에서의 작용기간은 아직 확립되지 않은 것이 많고 용량, 효과관계도 불확실 것이 아니므로 목적에 따라 투여하지 않는다**【사용상의 주의사항】** 1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것. 1) 심한 혈액응고이상 환자(예: 혈우병) 2) 심한 간 또는 심한 신장(신장질환) 환자(혈액투석환자 등) 3) 항응고제 또는 혈소판응집억제제를 투여 중인 환자(병용투여에 의해 이들 약물의 작용이 증가되어 출혈경향이 증대될 수 있다.) 4) 임부 및 수유부(안전성이 확립되어 있지 않다.) 5) 12세 미만의 소아 6) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 모도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에는 투여하면 안 된다. 2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 1) 항생제(테트라사이클린 등)를 투여하고 있는 환자(병용투여에 의해 항생제의 작용이 증가될 수 있다.) 2) 이 약은 황색5호(선셋옐로우 FCF, Sunset yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 반응이 있는 환자에는 신중히 투여한다. 3. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상당 시가 가능한 한 이 경우를 서술하지 않 것. 1) 과민반응: 이 약에 의해 드물게 과민반응이 나타날 수 있으며, 복용 중단 시 자연적으로 빠르게 소실된다. 2) 소화기 장애: 드물게 위통, 설사가 나타날 수 있다. 4. **제장상의 주의사항** 1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것 2) 이 약품을 용액 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 약품 오염(감염사용)에 의한 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 용액의 용기에 넣고 보관하여 보관할 것.**【저장방법】** 기밀용기, 25℃ 이하 보관**【포장단위】** 500정/병

【제조자】 (주)노바켄켄스케어 / 경상북도 경주시 해영읍 지석산업4로 16-53
【제조외국지】 영풍제약(주) / 인천광역시 남동구 함박외로 333
【제품문의】 032-812-8356

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입 시 사용기한이 경과되었거나 변질·변패 또는 오손된 제품일 경우 구입처를 통하여 교환하여 드립니다. ※ 이 약을 사용하시기 전에 반드시 표시 기재 내용을 주의 깊게 읽어 주시기 바랍니다. ※ 의약품 사용 후 부작용 발생 시 의약품 부작용 신고 및 피해 구제 상담(1644-6223), (14-3330)에 신청할 수 있습니다. ※ 최종 개정 연월일(2024.12.17) 이후 변경된 내용은 의약품통합정보시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr>)에서 확인하실 수 있습니다.

【제조번호】
【사용기한】

35 × 18mm

직사광주의



[VEL001]



184*66mm