

【사용상의 주의사항】

- 다음 환자에는 투여하지 말 것.
 - (1) 이 약 또는 ephedrine 또는 piperazine류에 과민증이 있는 환자
 - (2) 심각한 고혈압 또는 심각한 과당동맥(심장동맥) 환자
 - (3) monoamine oxidase 저해제(억제제)를 투여받고 있는 환자
 - (4) 안내암이 증가되어 있거나 노지류(소변이 고임)가 있는 환자
- 다음 환자에는 신중히 투여할 것.
 - (1) 당뇨병, 간상선 기능 항진증, 고혈압, 빈박, 부정맥, 신장 및 간기능 부전환자
 - (2) 교감신경양 약물(비총합(코막힘) 제거나 식욕억제제, amphetamine 등 의 정신흥분제, 삼환계 항우울약, 디기탈리스 제제를 투여받는 환자
 - (3) 기타 다른 중추신경 흥분약물을 투여받는 환자
- 이상반응
 - (1) 구강(목마름), 두통, 불면, 수면 무기력, 빈박, 신경과민증, 어지러움증, 현인(현기증), 오심(구역) 등이 투여대상 중 1% 이상에서 나타났다.
 - (2) 공포, 흥분, 긴장, 불안, 진전(떨림) 호르몬관, 환각, 경련, 중추신경 억제, 부정맥, 저혈압이 있는 심혈관계 허탈 등이 나타날 수 있다.
 - (3) 피부반응, 혈관부종(혈관부기) 등의 과민반응이 일어날 수 있다.
- 상호작용
 - (1) monoamine oxidase 저해제(억제제), β_2 - 교감신경 흥분 억제약은 교감신경양 작용을 증가시킨다. MAO 저해제(억제제)의 긴 작용 시간 때문에 MAO 저해제(억제제) 투여 최소 15일 후 이 약물을 복용한다.
 - (2) 교감신경양 아민은 methyl dopa, guanethidine, reserpine 의 항고혈압 효과를 감소시킨다.
 - (3) 수도에페드린을 디기탈리스와 병용(함께 복용) 투여할 때 전위성(전위) 심박 조율기의 활성이 증가될 수 있다.
 - (4) 수도에페드린은 제산제에 의해 흡수속도가 증가되는 반면, 카올린에 의해 흡수속도가 감소된다.

5. 임상부에 대한 안전성은 확립되지 않았으며 이 약물은 모유로 분비되므로 수유부는 복용하지 않도록 한다.
6. 과량투여시의 처리

과량투여시 빈박, 부정맥, 고혈압, 중추신경억제효과(진전, 무호흡, 무의식, 청색증, 심혈관계 허탈증) 또는 자극효과(불면, 환각, 진전(떨림), 경련)가 나타날 수 있다. 즉시 병원에 옮기고 대증적(증상에 대응하여)인 양법을 취하도록 한다. 위세척을 실시하고 고혈압은 α -억제약으로 조절하고 빈박은 β -억제약으로 조절한다. 경련이 나타나면 디아제팜을 정맥 투여한다.
7. 기타


운전이나 위험한 기계를 조작하는 경우 주의를 요한다.

【저장방법 및 사용기간】 기밀용기, 상온(15-25℃)보관, 제조일로부터 24개월
【포장단위】 자사포장단위
【제품명(원치)】
* 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품이며, 만약 구입 시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견된 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.
* 본 제품은 재정경제부 고시 소비자피해보상규정에 의거 교환 또는 보상받을 수 있습니다. 의약품을 사용하기전에 첨부문서를 주의깊게 읽어아하어, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오

【소비자 상담실】 (02)3485-0434
【반품 및 교환처】 구입처
【제조(원지)】
한국콜마 / 충남 연기군 전의면 신정리 618-3
【제조지】
다산디켄 / 충남 아산시 도고면 와산리 10
한국콜마 / 충남 연기군 전의면 신정리 618-3



인양약품
분류번호:141



코막힘

재채기

출름기없이 1일 2회!

코일리 캡슐

Coryza / Allergic rhinitis

Cetirizine Dihydrochloride 5mg / Pseudoephedrine HCl 120mg

6캡슐(3일분)