

에버퀸정

EVER-Queen

【약리작용 및 특징】

1. **에버퀸정**은 에스트로젠 유사작용 및 신경성 증상 치료작용을 나타냄으로써 갱년기의 에스트로젠 분비감소에 기인되는 여러가지 정신적·육체적 증상을 동시에 치료해 주며, 특히 황체호르몬분비를 직접적으로 차단하고 대뇌의 신경전달물질의 감소를 차단하기 때문에 발한(땀이 남), 홍조, 우울, 불면, 정신신체장애 증후군 등의 질환을 원인으로 개선해 줍니다.
2. **에버퀸정**은 갱년기 증후군에 발생하는 여성 호르몬제제와 거의 동등한 효과를 나타내기 때문에 호르몬대체요법제로 사용할 수 있을 뿐 아니라 갱년기의 신경성 증상으로 인한 정신 신체장애치료 효과도 임상으로 입증되었습니다.
3. **에버퀸정**은 식물성의 천연 에스트로젠 대체 물질과 생약성 신경증상 치료제의 복합제이기 때문에 유방암, 자궁암 발생 우려 등의 치명적인 부작용(이상반응)이 없고 정량화된 제제로 장기간 일정량을 투여할 수 있으므로 더욱 안정적인 효과를 볼 수 있습니다.
4. **에버퀸정**은 갱년기의 여성에게 뿐만 아니라 젊은 여성에게서도 나타나는 여성 호르몬 실조 증상에 적절히 응용할 수 있는 제제입니다. 따라서 난소적출(뿔아냄)술이나 자궁적출(뿔아냄)술, 기타 여성 호르몬 이상에 기인되는 제반 증세를 지닌 여성에게 광범위하게 적용될 수 있습니다. 특히 갱년기환자의 경우에는 여타의 에스트로젠 복용환자에서 나타나는 생리유도 현상이 나타나지 않기 때문에 환자의 순응도가 더욱 높은 제제입니다.

【원료약품 및 그 분량】 1정 중

세인트조스위트80%에탄올엑스(생규).....84mg
서양삼마추출액(생규).....0.0364mL
첨가제(타르색소) : 청색1호, 황색203호 알루미눔레이크

【성상】 녹색의 원형 필름코팅정(알 : TG EQ)

【효능·효과】

갱년기 다음 증상의 완화

- 홍조, 땀이 남
- 정신적 긴장, 신경과민, 집중력 부족, 불면, 불안 또는 우울증상
- 생리적인 불쾌감

【용법·용량】

성인 : 1회 1정 1일 2회, 필요시 1회 2정 1일 2회 복용할 것.
아침, 저녁에 씹지 않고 물과 함께 복용할 것.

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

- 1) 이 약 또는 이 약의 성분에 과민반응을 나타내는 사람
- 2) 피부 광과민반응 병력이 있는 사람
- 3) 임부 및 임신가능성이 있는 여성 또는 수유부(사용경험이 충분하지 않다.)
- 4) 이 약은 유당(젖당)수화물을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당)수화물 분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.

- 1) 항바이러스제 중 항헤르페스바이러스제 및 만성C형 간염 치료제(에파비렌즈, 네비라핀, 데라비리딘, 라미부딘, 지도부딘, 스타부딘, 아바카비르, 디다노신, 잘시타빈, 인디나비르, 사퀴나비르, 리토나비르, 넬피나비르, 암프레나비르, 소포스부비르, 레디파시비르 등)와 병용(함께 복용)시 이러한 항바이러스약의 치료효과가 떨어지고 내성이 발현(드러냄)될 수 있다.
- 2) 항응고제(아세노쿠마롤, 헤파루린, 와르파린, 다비가트란, 리바록사반, 아픽사반 등)의 항응고작용을 저해(억제)한다.
- 3) 세포중식 억제제(이리노테칸, 시클로포스파마이드, 타목시펜, 탁솔, 에도포시드 등)
- 4) 면역억제제(시클로스포린, 타크로리무스, 시롤리무스, 에베로리무스 등)와 병용(함께 복용)시 혈당농도의 감소 및 면역억제효과의 저하를 야기시키며 잠재적으로 심각한 결과(아식거부)를 초래할 수도 있다.

3. 이 약을 복용하는 동안 다음의 행위를 하지 말 것.

강한 자외선 노출(정시간 일광(햇빛)욕, 태양광램프, 선풍제대)

4. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

- 1) 이전에 간질성 병력이 있거나 다른 심각한 건강상 위해가 있었던 사람
- 2) 의사의 치료를 받고 있는 사람

5. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한한 이 첨부문서를 소지할 것.

- 1) 피부 : 드물게 알레르기 피부반응(붉어짐, 가려움)이 나타나는 경우, 햇볕에 대한 피부의 민감성이 증가하는 광과민반응이 나타나는 경우(특히, 피부가 흰 사람에게서 유발될 가능성이 있다.)
- 2) 정신신경계 : 드물게 피로, 불안, 졸음, 초조가 나타나는 경우
- 3) 소화기계 : 드물게 위장관(위창자) 장애가 나타나는 경우
- 4) 간질환자로 의심되는 증상(피곤, 식욕부진, 황달, 구역 및 구토를 동반하는 심각한 상부 위의 통증, 진한 뇨 등)이 나타날 경우 간독성 이상반응이 보고된 바 있음.

6. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항

- 1) 지금까지 이 약에 의한 급성 중독증상은 보고된 바 없다. 과용량 복용후 광독성 현상이 나타날 수 있으므로 1 ~ 2 주일 동안은 태양광선과 자외선으로부터 피부가 보호되어야 한다(외출시간을 줄이고, 의복 및 햇볕차단수가 높은 햇볕보호제품을 이용하여 햇볕으로부터 피부를 보호한다.)
- 2) 이 약은 CYP-450 대사효소를 유도하므로, 이 효소에 의해 대사되는 다음 의약품의 혈중 농도를 감소시킬 수 있다. 반대로 이상반응이 동반될 수 있는 약물을 동시 투여시 이 약의 복용을 갑자기 중단하면 혈당농도가 증가할 수 있다. 따라서 다음 의약품과의 병용(함께 복용)은 가능하면 피하고 부득이하게 병용(함께 복용) 시에는 이상반응 발현(드러냄) 여부 및 아래 사항에 주의해야 한다.
 - (1) 강심약(디곡신, 디곡산, 메틸디곡신 등), 기관지확장제(아미노필린, 콜린테오필린, 테오필린 등), 항부정맥약(아미오다론, 퀴니딘, 디소피라미드, 프로파페논, 리도카인 등), 항경련약(페노바르비탈, 페니토인, 카르바마제핀, 프리리도 등), 진정수면제(미다졸람 등)와 병용(함께 복용)시 이러한 약들의 효과가 떨어질 수 있으므로 투여 시작시와 종료시 이러한 약들의 효과에 대한 신중한 모니터링 실시가 필요하다.
 - (2) 경구(먹는) 또는 주사용 피임제(에티닐에스트라디올, 데스게스테랄, 노르에티스테론, 레보노르게스트렐 등) 또는 이 약물을 포함한 피임기구(이식제 포함) 등의 효능 감소 및 부정 성기출혈의 발현(드러냄)이 증가할 수 있다.
 - (3) 편두통치료제(수마트립탄, 나라트립탄, 리자트립탄, 졸미트립탄 등)와 병용(함께 복용)시 이러한 약들의 이상반응이 증가할 수 있다.
 - (4) 선택적세로토닌재흡수저해제(억제제) 등 항우울제(이미프라민, 아마이트립틸린, 노르트리프틸린, 시탈로프람, 플루옥세틴, 플루복사민, 파록세틴, 설텔랄린, 네파조돈, 에스시탈로프람, 벤라팍신 등)와 병용(함께 복용)시 구역, 구토, 불안, 안절부절, 혼란이 나타나는 등 이상반응이 증가할 수 있다.
 - (5) 메사돈 : 메사돈 혈중 농도 및 효과의 감소를 초래할 수 있다. 메사돈 치료를 받는 환자에서 47 %까지 감소한 보고가 있다.
 - (6) 지질저하제(심바스타틴과 같은 특정 HMG-CoA reductase 저해제(억제제)(프라바스타틴은 제외))와 스테로이드 호르몬(경구(먹는)용 또는 정맥 투여용)의 작용에 영향을 끼칠 수 있다.
 - (7) 비스테로이드성 소염(항염)진통제 및 COX-2 저해제 등의 관절염치료제, 칼슘채널 차단제 등의 혈압강화제, 경구(먹는)용 혈당강화제(metformin) 또는 기타 혈당조절제, 마약성 진통제 등도 이약과 잠재적 상호작용이 발생될 수 있다.
- 3) 정해진 용법·용량을 준수할 것.

7. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 2) 의약품용 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품의 오용(잘못 사용)에 의한 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.
- 3) 직사일광(햇볕)을 피하고 될 수 있는 대로 습기가 적은 서늘한 곳에 투병을 꼭 닫아 보관할 것.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【포장단위】 120정(10정×12), 240정(120정×2) / PTP

- ※ 본 의약품은 우수의약품 제조 및 품질관리 기준(KGMP)에 따라 엄격한 품질검사를 필한 제품입니다. 만약 구입 시 사용(유효)기한이 지났거나 변질·변패·오염되거나 손상된 의약품일 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.
- ※ 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관해 주십시오.
- ※ 사용(유효)기한이 지난 의약품은 복용(사용)하지 마십시오.
- ※ 이 약을 복용(사용)하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽고, 본 첨부문서를 이 약과 함께 보관하십시오.
- ※ 자세한 의약품 정보는 당사 홈페이지(<http://www.taiguk.co.kr>) 또는 식품의약품안전처 온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)을 참조하십시오.
- ※ 부작용 보고 : 한국의약품안전관리원(1644-6223)

첨부문서 개정 연월일 : 2017. 01. 05

제조사
태극제약(주)

경기도 화성시 향남읍 제암로3길 123
☎ 소비자상담전화 080-300-8282
🌐 <http://www.taiguk.co.kr>