

위트림 연질캡슐

전문의약품

[원료약품 및 분량] 1캡슐 중

- 유효성분 : 알베라시트르산염(별규) 60.0mg
시메티콘(USP) 300.0mg
- 첨가제(타르색소) : 청색 1호, 적색 40호
- 첨가제(동물유래성분) : 젤라틴(소, 가족의 안쪽부위)
- 기타 첨가제 : 농글리세린, 산화티탄, 소르비톨액(비결정성), 에틸바닐린

[성 상] 흰색의 점조성 내용물이 든 암적색의 장방형 연질캡슐제

[효능 · 효과]

- 위장관계 경련의 진경
- 장내 가스 제거
- 복부팽만으로 인한 소화기계 통증의 경감

[용법 · 용량] 1회 1캡슐, 1일 2 ~ 3회 식전에 복용하십시오.

[사용상의 주의사항]

1. 다음환자에게는 투여하지 마십시오.
1) 이 약의 성분에 과민증이 있는 환자 2) 저혈압 환자 3) 무력성 장폐색증 환자
2. 이상반응
이 약을 투여하는 동안 바람직하지 않거나 불필요한 효과가 나타날 수 있습니다.
1) 과민반응 : 드물게 두드러기, 가려움증, 발진 및 아나필락시스를 포함하는 알러지반응이 나타날 수 있으며 후두부종, 속을 동반할 수 있습니다.
2) 소화기계 : 때때로 연변, 복부불쾌감, 설사, 복통, 구토, 구역, 복부중압감, 식욕부진이 나타날 수 있습니다.
3) 기타 : 드물게 간기능 이상이 나타날 수 있고 투여 중단 후 정상화 될 수 있으며, 드물게 두통, 어지럼증이 나타날 수 있습니다.
4) 국내에서 6년동안 786명을 대상으로 실시한 시판후 조사결과 변비 1례가 보고되었습니다.
3. 일반적 주의
1) 도핑테스트를 실시할 때 양성반응을 일으킬 수 있습니다.
2) 정해진 용법 · 용량을 지켜야 합니다.
3) 이 약의 복용으로 이상증상이 나타나는 경우에는 투여를 중지하고 의사 또는 약사에게 알려십시오.
4) 다른 약물과의 잠재적인 상호작용을 피하기 위하여 복용중인 약물을 의사 또는 약사에게 알려십시오.
4. 임부 및 수유부에 대한 투여
1) 임부
동물시험에서 중대한 태아독성 또는 최기형성을 나타내지는 않았으나, 사람에 대해서는 확인되지 않으며, 임신기간 중의 약물의 사용은 신중하여야 하기 때문에 임부에게는 투여하지 않는 것이 바람직합니다.
2) 수유부
검토된 바가 없으므로 수유부에게는 투여하지 않는 것이 바람직합니다.
5. 어린이에 대한 투여
12세 미만의 어린이에는 권장되지 않습니다.
6. 과량투여시의 처치
과량 투여시 저혈압 및 아트로핀 유사 독성이 나타날 수 있습니다. 과량투여시 처치는 저혈압에 대한 보조요법과 함께 아트로핀 해독과 동일한 요법을 행하십시오.
7. 보관 및 취급상의 주의사항
1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
2) 다른 용기에 바꾸어 넣는 것은 사고원인이 되거나 품질유지면에서 바람직하지 않으므로 이를 주의하십시오.

[저 장 방 법] 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

[포 장 단 위] 30캡슐/병, 300캡슐/병

- 제조자 : (주)동구바이오제약 / 경기도 화성시 향남읍 제약공단 2길 18(상신리 901-3)
- * 처방된 증상, 처방된 환자 이외에는 사용하지 마십시오.
- * 첨부문서를 읽고, 첨부문서를 보관하십시오.
- * 사용기한이 지난 의약품을 사용하지 마십시오.
- * 이 첨부문서 작성일자(2016. 10. 12)이후 변경된 내용은 삼익제약 홈페이지(www.samik.co.kr) 또는 온라인의약품도서관(drug.mfds.go.kr)의약품 정보를 참조하세요.
- * 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품은 구입처를 통해 교환해 드립니다. 본 제품은 공정거래위원회 고시 "소비자분쟁해결기준"에 의거 교환 또는 보상받을 수 있습니다. 171010

• 제조의뢰자


삼익제약주식회사

인천광역시 부평구 청안로 13
학술/개발부 : (02)928-0661