

일반의약품

고단위 은행염 혈액순환개선제

써큐릭스[®]정

은행염건조엑스 120 밀리그램

100정

혈액순환장애 체크리스트

- 손발이 차고 저리다
- 눈이 침침하고 쉽게 피로를 느낀다
- 뚜렷한 원인 없이 만성두통, 어지러움이 있다
- 귀가 웅웅거리고 청력이 감퇴한다
- 기억력, 판단력이 감퇴하고 건망증이 있다
- 팔, 다리 마비감이 있다

일반의약품 정보

※ 이 약을 사용하기 전 반드시 케이스를 확인하세요.

【유효성분】 1정 중

은행염건조엑스(생규) 120mg

【성상】 녹색의 원형 필름코팅정제

【효능·효과】

1. 주 효능효과
1) 말초동맥 순환장애(간헐성 파행증(이따금 절뚝 거림)의 치료 2) 어지러움, 혈관성 및 퇴행성 이명(귀울림) 3) 이명(귀울림), 두통, 기억력 감퇴, 집중력 장애, 우울감, 어지러움 등의 치매성 증상을 수반하는 기질성 뇌기능 장애의 치료

【용법·용량】

1. 성인
1) 말초동맥 순환장애, 어지러움, 이명(귀울림) : 은행염건조엑스로서 1회 40mg, 1일 3회 또는 1회 80mg, 1일 2회 경구투여한다.(먹는다, 복용한다)
2) 기질성 뇌기능 장애 : 은행염건조엑스로서 1회 40~80mg, 1일 3회 또는 1회 120mg, 1일 2회 경구투여한다.(먹는다, 복용한다)
2. 연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용(사용)하지 말 것
1) 이 약에 과민증 환자 2) 12세 이하의 소아(소아의 사용 경험미 충분하지 않으므로 12세 이하의 소아에는 투여하지 않는다.) 3) 임부(동물시험에서 기형발생은 없었으나 임신 중의 투여에 대한 충분한 사용경험이 적다.) 4) 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당)분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용(사용)하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것
1) 출혈 장애가 있거나 출혈의 위험을 증가시키는 약물(항응고제(예: 헤파린, 와파린)), 항혈소판제(예: 클로피도그

일반의약품 정보(계속됨)

렐, 아세틸살리실산 및 기타 비스테로이드성 항염증제))을 복용하고 있는 환자 2) 수유부(모유로 이행여부가 알려지지 않음) 3) 이 약은 황색4호(타르트라진)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자

3. 다음과 같은 경우 이 약의 복용(사용)을 중단하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것, 상임시 가능한 첨부문서를 소지할 것
1) 수술이 예정된 자 2) 복용 3개월 후 증상의 개선이 없거나 악화되는 경우 3) 이상반응 ① 드물게 가벼운 위장관 불편감, 두통, 알레르기성 피부반응이 나타날 수 있다. ② 국내 자발적 이상사례 보고자료(1989~2013년)를 분석한 결과, 이상사례가 보고된 다른 의약품에서 발생한 이상사례에 비해 통계적으로 유의하게 많이 보고된 이상사례는 다음과 같이 나타났다. 다만, 이로서 곧 해당성분과 다음의 이상사례 간에 인과관계가 입증된 것을 의미하는 것은 아니다.
• 어지러움 • 가려움증 ③ 기타 : 아나필락시스 또는 아나필락시스 반응을 보고가 있다. 다만, 이로서 해당성분과 이상사례 간에 인과관계가 입증된 것을 의미하는 것은 아니다.

4. 기타 약의 복용(사용)시 주의할 사항
이 약은 고혈압 치료제가 아니므로 특별한 치료를 요하는 고혈압 환자에는 투여하지 않는다.

5. 저장상의 주의사항
1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관한다. 2) 직사광선을 피하고 되도록이면 습기가 적은 서늘한 곳에 밀봉하여(뚜껑을 꼭닫아, 단단히 마개로 막아) 보관한다.

【저장방법】 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

【사용기한】 용기 하단 표기일까지

【참가제】

- 참가제(동물유래성분) : 유당수화물(소, 우유)
- 참가제(타르색소) : 청색1호알루미늄레이크, 황색4호알루미늄레이크
- 기타 참가제 : 경질무수구산, 미결정셀룰로오스, 산화티탄, 스테아르산마그네슘, 전분글리콜산나트륨, 멜크, 포비돈, 폴리에틸렌글리콜6000, 히프로멜로오스

제조번호 : **25*10mm**
사용기한 : **인쇄시삭제**