

조제용
일반의약품
분류번호:222

소아용 진해 거담제

우리들 아세트시스테인 과립200mg 100그람



www.wooridulpharm.com
우리들제약(주)

www.wooridulpharm.com

본사·공장: 경기도 화성시 향남읍 제약공단2길 50
(소비자상담실) 080-080-4211

※습기에 이취가 발생할 수 있으니 뚜껑을 꼭 닫아 보관 하십시오

65x20mm

【원료약품의 분량】1g 중 / 아세트시스테인(KP).....200mg
첨가제(타르색소): 적색3호 / 동물유래성분: 유당수화물(소, 우유)
【성상】과일향이 있는 분홍색의 과립제
【효능·효과】 1. 주효능·효과 1) 다음 질환에서의 객담배출곤란: 급·만성 기관지염, 기관지 확장증, 천식성 기관지염, 기관지천식, 세 기관지염, 만성염증증 2) 인·후두염, 부비강염, 삼출성 및 장액성 중이염
【용법·용량】아세트시스테인으로서 다음 용량을 식전에 소량의 물과 함께 경구투여한다. 1. 급성질환-성인: 1회 200mg 1일 3회 / 소아: 6~14세 1회 200mg 1일 2회 / 2~5세 1회 100mg 1일 3회 2. 만성질환 - 성인: 1회 200mg 1일 2회 / 소아: 6~14세 1회 100mg 1일 3회 3. 만성염증증-소아: 6세 이상 1회 200mg 1일 3회 / 2~5세 1회 100mg 1일 4회 연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

【사용상의 주의사항】

- 경고: 이 약에 함유되어 있는 인공감미제 아스파탐은 체내에서 분해되어 페닐알라닌으로 대사되므로, 페닐알라닌의 섭취를 규제할 필요가 있는 유전성질환인 페닐케톤뇨증 환자에는 투여하지 말 것.
- 다음 환자에게는 투여하지 말 것: 1) 이 약에 과민증 환자 2) 위·십이지장궤양 환자 3) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency)

또는 포도당-갈락토오스 흡수장애 (glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다. 3. 다음 환자에는 신중히 투여할 것: 신생아(중증 질환이 아닌 경우 신생아에게 투여하지 않는다.) 4. 부작용: 1) 소화기계: 드물게 구역, 구토, 구내염, 가슴쓰림, 설사 등이 나타날 수 있다. 2) 과민증: 드물게 두드러기, 가려움, 발진, 두통, 이명, 기관지경련 (특히 천식환자) 등이 나타날 수 있다. 3) 드물게 빈맥, 고혈압이 나타날 수 있다. 국내 자발적유해사례 보고자료 (1989~2013 상반기)를 분석한 결과, 유해사례가 보고된 다른 의약품에서 발생한 유해사례에 비해 통계적으로 다음의 유해사례 간에 인과관계가 입증된 것을 의미하는 것은 아니다. : 호흡곤란 5. 상호작용: 경구용 항생물질(아목시실린, 세푸록심, 독시사이클린, 에리스로마이신, 치아페니콜)과 병용투여시 항생물질의 약효를 감소시킬 수 있다.(적어도 2시간의 간격을 두고 투여한다.) 6. 임부에 대한 투여: 임부에 대한 적절한 연구가 없으므로 반드시 필요한 경우에만 투여한다. 7. 수유부에 대한 투여: 이 약이 모유로 분비되는지 알려지지 않았으나 많은 약들이 모유로 분비되므로 수유부에 투여할 경우에는 신중히 투여한다. 8. 적용상의 주의: 이 약의 용액에 다른 약물의 첨가는 피해야 한다.

【1일 허용량제한】아스파탐 함량을 WHO 권장량(40mg/kg/1일)이하로 조정 (가능한 최소량 사용)할 것. 60kg 성인: 1일 최대복용량 24g

【저장방법】기밀용기, 실온(1~30℃)보관 **【포장단위】**자사포장단위

- ♣ 본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 본 제품을 구입시 유효기한 또는 사용기한이 경과 되었거나 변질·변패 또는 오손되었을 경우에는 구입하신 약국을 통하여 교환해 드립니다
- ♣ 이 라벨의 개정일자 2015년 09월 22일 이후 변경된 내용은 본사 홈페이지 (www.wooridulpharm.com) 또는 소비자상담실(080-080-4211)에서 확인할 수 있습니다
- ♣ 온라인의약도서관(http://drug.mfds.go.kr)의약품 정보를 참조하십시오.

의사나 약사의 지시에 따라 사용하십시오.