

위장기능 정상화를 위한 소화기질환치료제

알바롤 연질캡슐

ALBAROL Soft Capsule

알바롤연질캡슐은 평활근을 이완시켜 경련으로 인한 통증을 완화시켜 주며 또한 변의 통과장애를 개선시켜주는 안전한 근친화성 진경작용을 가지고 있는 구연산알베린과 위장관 점막을 보호하고 또한 가스로 인한 복부팽만의 장내가스를 제거하여 주는 시메티콘과의 복합제제로 부작용이 거의 없는 안전한 약물입니다.

알바롤연질캡슐은 뚜렷한 위장관 병변이 없는 신경성 소화기질환 치료제로서 과민성 대장증후군을 비롯한 기능성 위장관, 담관장애질환 및 장내가스제거 등의 치료에 효과적인 안전한 제제입니다.

[성 상] 흰색의 점조액이 든 녹색의 장방형 연질캡슐제**[원료약품의 분량]** (1캡슐중)

구연산알베린 (Alverine citrate)	(별규)	60mg
시메티콘 (Simethicone)	(USP)	300mg

•첨가제(동물유래): 젤라틴(기원동물: 소, 사용부위: 피부)

•첨가제(타르색소): 청색 1호, 황색 4호, 황색 5호

[효능·효과]

위장관계 경련의 진경(경련완화) 및 장내의 가스제거
복부팽만으로 인한 소화기계 통증의 경감

[용법·용량]

1회 1캡슐, 1일 2~3회 식전에 복용한다.

[포장단위] 자사포장단위**[저장방법]** 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

- * 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품이며, 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.
- * 설명서개정연월 이후 변경된 내용은 온라인 의약품서관(<http://drug.mfds.go.kr>)을 통하여 확인하실 수 있습니다.
- * 이 약을 사용하기 전에 반드시 설명서를 주의 깊게 읽으시고, 사용(유효)기한이 지난 의약품은 사용하지 마시고, 설명서는 항상 의약품과 함께 보관하시기 바랍니다.

설명서개정연월: 2013년 09월

제품문의: (032) 812 - 8356



제조발매원

영종제약주식회사

인천광역시 남동구 함박리로 333



본 의약품은 정부의 KGMP
(우수약품 관리기준)에
의거하여 엄격한 관리에
의해 생산된 제품입니다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.

- 1) 이 약의 성분에 과민증이 있는 환자
- 2) 저혈압환자
- 3) 무력성 장폐색증(창자막힘증) 환자

2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.

- 1) 이 약은 황색 4호(타르트라진)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.
- 2) 이 약은 황색 5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.

3. 이상반응

이 약을 투여하는 동안 바람직하지 않거나 불필요한 효과가 나타날 수 있다.

- 1) 과민반응 : 드물게 두드러기, 가려움증, 발진 및 아나필락시스를 포함하는 알러지반응이 나타날 수 있으며 후두부종, 속을 동반할 수 있다.
- 2) 소화기계 : 때때로 연변(똥은 변), 복부불쾌감, 설사, 복통(배아픔), 구토, 구역, 복부중압감, 식욕부진이 나타날 수 있다.
- 3) 기 타 : 드물게 간기능 이상이 나타날 수 있고 투여 중단 후 정상화 될 수 있으며, 드물게 두통, 어지럼증이 나타날 수 있다.
- 4) 국내에서 6년 동안 786명을 대상으로 실시한 시판 후 조사결과 변비 1례가 보고되었다.

4. 일반적 주의

- 1) 도핑테스트를 실시할 때 양성반응을 일으킬 수 있다.
- 2) 정해진 용법·용량을 지켜야 한다.
- 3) 이 약의 복용으로 이상증상이 나타나는 경우에는 투여를 중지하고 의사 또는 약사에게 알린다.
- 4) 다른 약물과의 잠재적인 상호작용을 피하기 위하여 복용중인 약물을 의사 또는 약사에게 알린다.

5. 임부 및 수유부에 대한투여

1) 임 부

동물실험에서 중대한 태아독성 또는 치기형성(기형유발성)을 나타내지 않았으나, 사람에 대해서는 확인되지 않았으며 임신기간 중의 약물의 사용은 신중하여야 하기 때문에 임부에게는 투여하지 않는 것이 바람직하다.

2) 수유부

검토된 바가 없으므로 수유부에게는 투여하지 않는 것이 바람직하다.

6. 어린이에 대한 투여

12세 미만의 어린이에는 권장되지 않는다.

7. 과량투여시의 처치

과량 투여시 저혈압 및 아트로핀 유사 독성이 나타날 수 있다. 과량투여시 처치는 저혈압에 대한 보조요법과 함께 아트로핀 해독과 동일한 요법을 행한다.

8. 보관 및 취급상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
- 2) 다른 용기에 바꾸어 넣는 것은 사고원인이 되거나 품질유지면에서 바람직하지 않으므로 이를 주의할 것.