

[원료약품 및 분량] 1정 중
 세티리진염산염(BP) 5mg
 슈도에페드린염산염(USP).....120mg
 첨가제(타르색소) : 황색203호알루미늄레이크, 황색5호알루미늄레이크

[사용상의 주의사항]

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것. 1) 이 약 또는 ephedrine 또는 Piperrazine류에 과민증이 있는 환자. 2) 심각한 고혈압 또는 심각한 관상동맥¹⁾환자 3) monoamine oxidase 저해제²⁾를 투여받고 있는 환자 4) 안내압³⁾이 증가되어 있거나 뇨저류가 있는 환자 5) 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성, Lapp 유당분해효소 결핍증 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것. 1) 당뇨병, 갑상선 기능 항진증, 고혈압, 빈맥⁶⁾, 부정맥, 허혈성 심질환, 신장 및 간기능 부전환자, 노인 2) 교감신경양 약물(비충혈⁴⁾ 제거약, 식욕억제제, amphetamine등의 정신흥분제), 삼환계 항우울약, 디기탈리스 제제를 투여 받는 환자 3) 기타 다른 중추신경 흥분약을 투여 받는 환자 4) 이 약은 황색5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.

3. 부작용 1) 구갈⁵⁾, 두통, 불면, 수면, 무기력, 빈맥⁶⁾, 신경과민증, 어지러움, 구역 등이 투여대상 1%이상에서 나타났다. 2) 공포, 흥분, 긴장, 불안, 진전(떨림), 호흡곤란, 환각, 경련, 중추신경억제, 부정맥, 저혈압이 있는 심혈관계 허탈 등이 나타날 수 있다. 3) 피부반응, 혈관부종 등의 과민반응이 일어날 수 있다.

4. 상호작용 1) monoamine oxidase 저해제²⁾, β_2 -교감신경 효능 억제약은 교감신경양 작용을 증가시킨다. MAO저해제의 긴 작용시간 때문에 MAO저해제²⁾ 투여 최소 15일 후 이 약물을 복용한다. 2) 교감신경양 아민은 methyl dopa, guanethidine, reserpine의 항고혈압 효과를 감소시킨다. 3) 슈도에페드린을 디기탈리스와 병용(함께 복용(사용)) 투여할 때 전위성 심박 조율기의 활성이 증가될 수 있다. 4) 슈도에페드린은 제산제에 의해 흡수속도가 증가되는 반면, 카올린에 의해 흡수속도가 감소된다.

[용법 · 용량]

1. 12세 이상의 소아와 성인
 식사와 관계없이 1회 1정씩 1일 2회(아침, 저녁) 복용한다.
 이 약은 씹거나 부수어서 복용하지 말고 그대로 삼켜서 복용한다.
 2. 이 약은 2~3주 이상 복용하지 않도록 한다.

이크

[성 상] 황색의 장방형 필름코팅정

[효능 · 효과] 다음 증상을 수반하는 계절성 및 다년성 알레르기 비염(코염)의 완화 : 코막힘, 재채기, 콧물, 눈 · 코의 소양증(가려움증)

5. 임신부에 대한 안전성은 확립되지 않았으므로, 이 약물은 모유로 분비되므로 수유부는 복용하지 않도록 한다.

6. 과량 투여시의 처치 과량 투여시 빈박, 부정맥, 고혈압, 중추신경억제효과(진정, 무호흡, 무의식, 청색증, 심혈관계 허탈증) 또는 자극효과(불면, 환각, 떨림, 경련)가 나타날 수 있다. 즉시 병원으로 옮기고 대증적인 방법을 취하도록 한다. 위세척을 실시하고 고혈압은 α -억제약으로 조절하고 빈맥⁶⁾은 β -억제약으로 조절한다. 경련이 나타나면 디아제팜을 정맥투여한다.

7. 기타 운전이나 위험한 기계를 조작하는 경우 주의를 요한다.

※주석 ¹⁾관상동맥 : 심장동맥 ²⁾저해제 : 억제제 ³⁾안내압 : 눈내부의 압력 ⁴⁾비충혈 : 코막힘 ⁵⁾구갈 : 목마름 ⁶⁾빈맥 : 빠른맥 ※ 의약품을 어린이의 손에 닿지 않게 보관하여 주시기 바랍니다. ※ 의약품 용어 설명 및 기타 자세한 의약품 정보는 이지드럭(<http://ezdrug.kfda.go.kr>) → 「정보마당」 → 「의약품등 정보」를 참조하세요.

※ 소비자상담실 : 02)579-6262 ※홈페이지 : www.pharvis.co.kr

본 의약품은 우수의약품 제조 및 품질관리기준(KGMP)에 따라 품질검사를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패, 오염, 손상된 제품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

작성일자 : ANKT 2012. 01. 18

분류번호:141

(주) 한국파비스제약

경기도 안산시 단원구 목내동 456-3



3. 신기능 저하 환자 및 간기능 저하 환자의 경우 감량(줄임)하여 1회 1정씩 1일 1회 복용한다.

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

[사용기간] 제조일로부터 36개월

PHARVIS
KOREA

코감기/알레르기비염

안티코정 계절성 및 다년성 알레르기 비염