

BCAA complex

아시트

과립 Ascite Granule

【성분 · 함량】 1포(4.1g)중

L-이소류신(KP)	952mg
L-류신(KP)	1,904mg
L-발린(KP)	1,144mg

【성 상】

흰색의 제피를 한 과립제로 약간의 방향과 감미가 있다.

【효능 · 효과】

식사 섭취량이 많음에도 불구하고 저알부민 혈증을 나타내는 대상부전성 간경변 환자의 저알부민 혈증의 개선

【용법 · 용량】

통상, 성인에 1회 1포를 1일 3회 식후 경구 투여하여 주십시오.

【사용상의 주의사항】

1. 경고

반드시 의사의 지시에 의하여 사용하여 주십시오.

2. 다음의 환자에게 투여하지 말아 주십시오.

선천성 분지쇄 아미노산 대사이상을 가진 환자

3. 이상반응

- 1) 소화기계 : 가끔 변비, 설사, 복만감, 복부불쾌감, 구역, 복통, 속쓰림, 식욕부진등의 증상이 나타날 수 있습니다. 이러한 증상이 보이는 경우에는 이 약의 투여량을 감량하거나 투여를 일시 중단하여 주십시오.
- 2) 신장 : 때때로 BUN 상승, 혈중 크레아티닌 상승 등의 신기능 장애가 일어날 수 있습니다. 이러한 증상이 보이는 경우에는 이 약의 투여량을 감량하거나 투여를 일시 중단하여 주십시오.
- 3) 대사 : 때때로 혈중 암모니아치의 상승 등의 대사장애가 나타날 수 있습니다. 이러한 증상이 보이는 경우에는 이 약의 투여량을 감량하거나 투여를 일시중단 하여 주십시오.
- 4) 간장 : 때때로 AST, ALT, 혈중 빌리루빈 상승이 관찰 될 수 있습니다.
- 5) 피부 : 때때로 발진, 가려움 등이 나타날 수 있습니다.
- 6) 기타 : 때때로 권태감, 부종(얼굴, 하지 등)이 나타날 수 있습니다.

4. 일반적 주의

- 1) 이 약의 적응 대상 환자는 혈청알부민치가 3.5g/dL의 저알부민혈증을 보이고, 복수, 부종 또는 간성뇌증을 가지고 있으며, 과거에 병력이 있는 대상부전성 간경변환자 중, 식사섭취량이 충분함에도 불구하고 저알부민혈증을 보이는 환자,

또는 당뇨병이나 간성뇌증의 합병 등에 총열량이나 총단백(아미노산)양의 제한이 필요한 환자입니다.

- 2) 당뇨병이나 간성뇌증의 합병 등이 있고, 또한 충분한 식사섭취가 가능함에도 불구하고, 식사섭취량이 부족한 경우에 식사지도를 하여 주십시오. 더욱이, 간성뇌증의 발현 등이 원인으로서 식사섭취량이 부족의 경우에는 열량과 단백질(아미노산)을 함유하는 약물을 투여하여 주십시오.
- 3) 다음의 환자가 간경변이 고도로 진행되어 이 약의 효과가 기대될 수 없을 때 투여하지 않습니다.
 - (1) 간성뇌증의 혼수도가 3도 이상인 환자
 - (2) 총 빌리루빈치가 3mg/dL 이상인 환자
 - (3) 간장에서의 단백질합성능이 현저하게 저해진 환자
- 4) 이 약은 분지쇄 아미노산으로만 된 제제이며, 이 약만으로는 필요아미노산의 전부가 만족될 수 없으므로 이 약 사용 시에는 환자의 상태에 맞는 필요단백질(아미노산량)과 열량(1일 단백질 40g 이상, 1일 열량 1000kcal 이상)을 식사 등에 의해 섭취하여 주십시오. 특히 단백질제한을 행하는 환자에 사용할 경우에는, 필요 최소한의 단백질과 열량을 확보하지 못하거나 이 약의 효과가 기대되지 않으므로, 이 약의 장기투여 등에 대해 영양상태의 악화를 일으킬 우려가 있는 경우 주의하여 주십시오.
- 5) 이 약의 투여에 의해 BUN 또는 혈중 암모니아의 이상이 인정되는 경우, 이 약의 과잉투여의 가능성이 있으므로 주의하여 주십시오. 또한, 장기에 걸친 과잉 투여는 영양상태 악화의 우려가 있으므로 주의하여 주십시오.
- 6) 이 약을 2개월 이상 투여해도 저알부민혈증의 개선이 인정되지 않을 경우는 다른 치료로 바꾸는 등 적절한 처치를 행하여 주십시오.

5. 임부 및 수유부에 대한 투여

임신 중과 수유 중의 투여에 관하여 안전성은 확립되어 있지 않으므로 임부, 임신하고 있을 가능성이 있는 여성 및 수유 중의 여성에게는 유익성이 위험성을 상회한다는 판단이 있을 경우에만 투여하여 주십시오.

6. 소아에 대한 투여

소아에 대한 안전성은 확립되어 있지 않습니다(소아에 대한 사용경험이 없습니다.).

7. 고령자에 대한 투여

대체로 고령자는 생리기능이 저하되는 수가 많으므로, 이 약의 투여에 대하여 혈중 암모니아 상승 등의 대사 장애가 나타날 수 있으므로 신중히 투여하여 주십시오.

【저장방법】 차광기밀용기, 실온보관(1~30℃)

【사용기간】 제조일로부터 36개월

【포장단위】 42포

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약, 구입 시 사용기한 또는 유효기한이 경과되었거나 변질, 변패, 오염, 손상된 제품일 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.
(소비자상담실 : 080-850-3611(~2) 수신자부담)
※ 이 제품 설명서 작성일자 (하단에 표시) 이후 변경된 내용은 홈페이지 (www.celltrionph.com), 이지드럭 (ezdrug.mids.go.kr) 또는 문의전화(02-2216-3611(내선:3))에서 확인하실 수 있습니다.

작성일자 G-2014.01.21

제조의회사 :

CELLTRION

충청북도 천안군 이월면 반지길 47-17

제조사 :

kolmar

충북 제천시 바이오파마2로 83
www.kolmarpharma.co.kr