

케어덤로션 0.05%
(Desonide)

[원료약품 및 분량] 이 약 1g 중	
데소나이드(별규)	0.5mg
첨기제(보존제): 파라옥시벤조산메틸(KP)	0.8mg
파라옥시벤조산프로필(KP)	0.4mg

[성상]
백색의 로션제

[효능·효과]
코로나바이러스에 반응하는 피부질환의 가려움 및 염종의 경감

[응급·용량]
원부의 상태에 따라 1일 2 ~ 3회 일제 바른다.
이 약은 잘 흡수되어 사용한다.
다른 코르티코스테로이드제와 마찬가지로 상태가 호전될 경우 치료를 중단해야 한다.
만약 2주 이내에 증상의 개선이 보이지 않을 경우 진단의 재평가가 필요하다.
이 약은 일광복사대용으로 사용하지 않는다.

[사물상의 주의사항]

- 1) 다음 환자(부위)에는 투여하지 말 것.
- 1) 이 약 또는 이 약의 구성성분에 대하여 과민반응 또는 그 병력이 있는 환자
- 2) 피부의 결핵 등의 세균, 진균, 바이러스 및 기생충 감염 부위(단순포진, 무두증, 수두 포함)
- 3) 인공적으로 사용하지 말 것(눈내장의 위험).
- 4) 제양화된 병소, 여드름, 주사(rosacea)
- 5) 1세 이하의 영아

2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.

- 1) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부
- 2) 유·소아
- 3) 고령자

3. 이식반응

[illegible]

4. 일반적 주의

[illegible]

드레거스 클루코르티코스테로이드의 절점종양이 나타날 수 있는데 이때는 코르티코스테로이드 정구제로 보충해야 한다.

4) 이 약물에 의해서 자극이 없으면, 이 약 사용을 중단하고 적절한 처치를 실시해야 한다.

5) 약물에 의해서 나타나는 알레르기 성 피부반응이 코르티코스테로이드를 함유하지 않는 대부분의 국소치료용 약물의 경우 임상중요성의 약이여야만 할 때에 한정하여 코르티코스테로이드제의 경우 치료의 실효여부를 관찰하여 진단한다.

6)는 적절한 진단 실험검사를 통해 확증되어야 한다.

7) 부갑상선이 나타나는 절점성 항원제 또는 항성제를 사용한다. 처치 후에도 신속하게 호전되지 않으면 검임이 원한화 때까지 이 약의 사용을 중단한다.

7) 환자를 위한 정보

국소 코르티코스테로이드제를 사용하는 환자들은 다음의 정보와 지시를 따라야 한다.

- 1) 이 약은 의사의 지시대로 사용해야 한다. : 외용으로만 사용한다. 눈에 접촉되지 않도록 한다.
- 2) 지시된 것 이외에 다른 질병에 사용하지 않는다.
- 3) 의사의 지시 없이 한두에 봉대를 허가한 물에서는 안 된다.
- 4) 환자는 국소적 코르티코스테로이드의 어떤 종류의 사용에 의사와 계속 보고해야 한다.

5. 입부에 대한 투여

1) 동물 실험과 코르티솔 호르몬을 측정하는 실험을 비교적 작은 동물에서도 기형발생을 나타냈다. 이 악은 동물실험에서 사람의 건강관찰과 비슷한 악을 파악해 적용했을 때 기형발생을 나타냈다.

2) 이 악의 생식력에 미치는 영향에 관한 동물실험을 실시하지 않았다.

3) 악은 일부에게만 영향을 때 대량에 유해하지 여부 및 생식력에 영향을 미치는지의 여부도 알려져 있지 않다.

따라서 이 악은 유해성이 위험성을 상회할 경우에만 일부에게 사용해야 한다. 일부에는 많은 양을 쓰거나 지속적으로 또는 반복적으로 사용하지 않는다.

6. 수유부에 대한 투여

전신적으로 투여된 코르티코스테로이드제는 모유로 이행될 수 있고 성장을 억제하고 코르티코스테로이드의 체내 생성을 방해할 수 있으며 다른 이상반응을 유발할 수 있다.

빈번하게 낮은 코르티코스테로이드제를 사용했을 때 전신적으로 흡수되어 모유로 이행되는지의 여부는 밝혀져 있지 않다. 다만 많은 약물이 모유로 이행되므로 이 약을 수유부에게 투여할 때는 가슴 부위 도포를 피하고 주의해야 한다.

7. 소아에 대한 투여

- 나. 소아 환자에서 대한 안전성과 유효성은 확립되어 있지 않다.
- 다. 소아는 체중에 비해 상대적으로 높기 때문에 소아 코르티코스테로이드를 사용할 때 성인에 비해 HPA축 기능억제, 위장 장애 등 급성 부작용이 코르티코스테로이드 결핍 증상과 혼동될 가능성 위험성이 높다. 그러므로 소아 환자에 사용될 때에는 폐경기 전후 부위 및/또는 일정한 용도가 되지 않도록 주의하여야 한다.
- 유. 유 · 소아 환자에 국한 코르티코스테로이드를 사용하는 경우 선조증 등의 이상반응이 보고된 바 있다.
- 을. 소아에게 국한 코르티코스테로이드를 사용할 때 HPA축 기능 억제, 감염 및 체중 증가 등과 같이 두드러진 부작용은 없다.
- 병. 유 · 소아 환자에 국한하여 혈당 중 코르테솔 농도 저하 및 부갑상선 호르몬은 자극에 대한 반응을 들이 나타낼 수 있으며, 두드러진 상태에 의해서 신장기능, 근육과 인대 조직의 퇴행성유무 등은 아직 불확실하다.

8. 고령자에 대한 투여

일반적으로 고려지에서는 이상반응이 나타나기 쉬우므로 대량, 장기간, 광범위하게 사용할 경우 충분히 관찰하는 등 주의한다.

9. 관광투여시의 대처

이 약을 국소치료용으로 사용해도 체내에 흡수되어 전신적인 작용을 나타낼 수 있다.

10. 보관 및 취급상의 주의사항

2) 다른 용기에 바꾸어 넣는 것은 사고원인이 되거나 품질유지면에서 바람직하지 않으므로 이를 주의한다.

11.7 | E

1) 심혈관 검사
다음의 검사는 HPA축 기능억제를 평가하는데 도움이 된다.
부신피질자극호르몬 자극 시험, 오전의 혈당 중 코티솔 농도측정 시험, 요중 유리 코티솔 시험
2) 발달성, 들뜬면역결핍, 생식력의 손상 : 이 약의 발달 유발 가능성 및 수정물에 대한 작용을 평가하기 위한 장기간의
등을 포함한 심독성 시험이 없다.

[저장방법] 기밀용기, 실온(1-30℃)보관

[포참단위] 110a

[제품문의처] 02) 571-2716~7

* 본 약물은 엄격한 품질관리를 위한 제품이며, 만약 구입 시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

* 설명서 최종개정연월일 : 2014.01.30

* 이 제품 설명서 작성(개정)연월일 이후 변경된 내용은 온라인(의약품도서관(drug.mdis.go.kr))의 '의약품 검색란' 을 통해 확인하실 수 있습니다.

<인생살>

결재	담당	확인	승인	비고
	 2014.03.26	 2014.03.31	 2014.03.31	

200

결재	담당	확인	승인	비고
				
	2014. 03. 26	2014. 03. 26	2014. 03. 26	

제주의뢰자

GG (주)씨티씨바이오
(주)씨티씨바이오 경기도 화성시 팔탄면 현대가이로 38

제조사

한국콜마(주)
세종특별자치시 전의면 산단길 245