

흡수율을 높인 생약성분의 실리마린 제제

실루빈

연질
캡슐

(밀크시슬엑스)

밀크시슬엑스(Milk-thistle Fruit Extract)의 실리빈은 간세포에 직접적인 보호작용을 갖고 있는 순식물성 간장질환 치료제로 널리 사용되고 있는 약물이나, 물에 잘 녹지 않는 난용성으로 생체이용율이 약 20% 내지 40% 밖에 되지 않는 단점이 있습니다. 실루빈연질캡슐은 이러한 난용성 실리빈을 친수화성 Matrix를 사용하여 가용화시킴으로써 투명한 상태로 만드는 특허기술인 Neosol® system 기술로 제조되어 기존에 시판되던 정제, 캡슐제, 액제에 비해 생체이용율을 현저히 개선시킨 제제입니다.

■원료약품 및 그 분량 : 1캡슐 중
밀크시슬엑스(생규) 175mg
(실리마린으로서 96.25mg)

■성 상 : 갈색의 투명한 내용물을 함유하는 미황색 투명의 장방형 연질캡슐제

- 약리작용 및 특징점
- 1. 실루빈연질캡슐은 Neosol® system을 이용하여 흡수율을 90~100%까지 끌어올린 제제입니다.
 - 2. 실루빈연질캡슐은 주성분을 가용화시켜 투명하게 만든 제제로 빠르게 흡수되어 신속한 효과를 나타냅니다.
 - 3. 실루빈연질캡슐은 연질캡슐 피막의 가스제로서 안정성이 우수한 솔비톨글리세린블렌드를 사용함으로써 종래 기술의 문제점, 즉 연질캡슐 피막의 수분으로 인한 유효 성분의 피막으로의 이행이 현저히 감소되고, 주성분의 함량 저하, 캡슐의 함물문제 및 피막 불용화 현상이 개선된 안정성이 우수한 연질캡슐 제제입니다.

■효능·효과
다음 질환의 보조 치료 : 독성 간질환, 만성 간염, 간경변

■용법·용량
성인 : 실리마린으로서 초기용량 1회 140mg(또는 실리빈으로서 1회 60mg), 1일 3회, 유지용량 1회 70mg (또는 실리빈으로서 1회 30mg), 1일 3회(또는 1회 140mg(또는 실리빈으로서 60mg), 1일 2회) 복용한다.

- 사용상의 주의사항
- 1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.
 - 1) 심한 담도 폐쇄(쓸개길 폐쇄) 환자
 - 2) 이 약의 과민증 환자
 - 3) 12세 이하의 소아
 - 2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.
임부, 수유부
 - 3. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.
상당시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.
 - 1) 드물게 위통 또는 설사
 - 2) 알레르기 반응
 - 4. 이 약의 복용시 주의할 사항
 - 1) 정해진 용법·용량을 지킬 것.
 - 2) 황달의 경우에는 의사 또는 약사와 상의할 것.
 - 3) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우나 장기복용시에는 의사 또는 약사와 상의할 것.
 - 5. 저장상의 주의사항
 - 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
 - 2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여(뚜껑을 꼭 닫아) 보관할 것.
 - 3) 의약품용 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 의한 사고발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

■저장방법 : 기밀용기, 실온보관(1~30℃)

■포장단위 : 100캡슐

※ 제품 개봉시 또는 취급시에 포장재(용기, 케이스)에 상처를 입을 수 있으니 주의할 것.
※ 본 제품은 흡습성이 우려되므로 PTP포장 상태로 보관할 것.

- 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품정보는 온라인의약도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)을 참조하세요.
- 이 첨부문서 작성일자 2014년 10월 08일 이후 변경된 내용은 홈페이지 : www.dkpc.co.kr 나 ☎080-776-1472에서 확인할 수 있음

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과하였거나 변질, 변패 또는 오손된 의약품은 구입처를 통해 교환하여 드립니다. DK081014