

# 부로멜라장용정

(브로멜라인)

## 【원료약품 및 그 분량】 1정 (336밀리그램) 중

- 유효성분 : 브로멜라인(별구) ..... 100.00밀리그램(500F.I.P 단위)
- 첨가제(타르색소) : 적색40알루미늄레이크, 황색5호알루미늄레이크, 청색2호알루미늄레이크
- 기타 첨가제 : 미결정셀룰로오스102, 크로스포비돈, 스테아르산마그네슘, 글로이드성이산화규소, 탭실드린색(11W401), 탭실드린홍색(39P407)

## 【성상】

분홍색의 원형 장용성 필름코팅정

## 【효능·효과】

부종(부기)을 동반한 염증 증상의 완화, 외상(상처) 또는 수술 후의 부종(부기)

## 【용법·용량】

- 성인 및 12세 이상의 소아 : 브로멜라인으로서 1회 100mg, 1일 2회 복용한다. 식사 30분 전에 물과 함께 복용한다.
- 체내에서의 작용기간은 아직 해명되지 않은 점이 많고 용량, 효과관계도 밝혀진 것이 아니므로 목적 없이 투여하지 않는다.

## 【사용상의 주의사항】

- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.
  - 1) 심한 혈액응고이상 환자(예 : 혈우병)
  - 2) 심한 간 또는 심한 신질환(신장질환) 환자(혈액투석환자 등)
  - 3) 항응고제 또는 혈소판응집억제제를 투여중인 환자(병용투여에 의해 이들 약물의 작용이 증가되어 출혈경향이 증대될 수 있다.)
  - 4) 임부 및 수유부(안전성이 확립되어 있지 않다.)
  - 5) 12세 미만의 소아
- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.
  - 1) 항생제(테트라사이클린 등)를 투여하고 있는 환자(병용투여에 의해 항생제의 작용이 증가될 수 있다.)
  - 2) 이 약은 황색5호(선셋옐로우 FCF, Sunset yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.
- 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.
  - 1) 과민반응 : 이 약에 의해 드물게 과민반응이 나타날 수 있으며, 복용 중단 시 자연 적으로 빠르게 소실된다.
  - 2) 소화기계 : 드물게 위통, 설사가 나타날 수 있다.
- 저장상의 주의사항
  - 1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
  - 2) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오염(잘못사용)에 의한 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

## 【저장방법】

기밀용기, 25℃이하 보관

## 【사용기간】

제조일로부터 24개월

## 【포장단위】

300정/병

- ※ 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품을 구입하셨을 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.
- ※ 본 제품의 상세정보는 의약품통합정보시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr>)을 참조하십시오.
- ※ 첨부문서 작성일자 이후 변경된 내용은 명문제약 홈페이지 또는 소비자 상담전화로 확인하실 수 있습니다.
- ※ 의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽으시고 의약품과 함께 보관하십시오.
- ※ 의약품 사용 후 부작용 발생 시 한국의약품안전관리원에 피해구제 신청을 할 수 있습니다.
- ※ 피해구제 상담(14-3330), 의약품 부작용 신고·피해구제 상담(1644-6223)

☎ 소비자 상담전화 : 080-022-5805(무료전화서비스)

제조외뢰 · 판매자

 **명문제약주식회사**  
경기도 화성시 향남읍 제약공단 2길 26  
[www.mmp-pharm.co.kr](http://www.mmp-pharm.co.kr)

제조자

 **(주)마더스제약**  
전라북도 익산시 삼기면 산단오룡길 38 마더스제약 제2공장

(작성 연월일: 22. 08. 29)

(개정 연월일: 22. 10. 20)

(M02)