

●사용상의 주의사항

일반의약품

두루넷

319(기타의 비타민제)

복용하시기 전에 아래의 주의사항을 잘 읽어보신 후에 복용하십시오.

1. 경고

임부에 비타민 A(레티놀)를 1일 5,000 IU 이상 투여하는 경우에는 선천성 기형을 유발할 위험이 있으므로 임신 3개월 이내 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성에는 비타민 A를 5,000 IU/일 이상 투여하지 마십시오(비타민 A결핍증 환자는 제외).

2. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.

이 약은 황색5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여하십시오.

3. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.

- 1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
2) 만 12개월 미만의 젖먹이 3) 월슨병
4) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안됩니다.

4. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 마십시오.

- 1) 인산염, 칼슘염, 경구용(먹는) 테트라사이클린계 제제, 제산제 2) 레보도파

5. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.

- 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
- 2) 고옥살산뇨증 환자(hyperoxaluria : 요중에 과량의 수산염이 배설되는 상태)
- 3) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아
 - ① 외국에서 임신전 3개월부터 임신초기 3개월까지 비타민 A를 10,000 IU/일 이상 섭취한 여성으로부터 태어난 아이에서 두부신경릉 등을 중심으로 하는 기형발현(기형발생) 증가가 추정된다는 역학조사결과가 있으므로 임신 3개월 이내 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성에는 비타민 A 결핍증치료에 사용하는 경우를 제외하고는 이 약을 투여하지 않습니다. 또한 비타민 A 보급을 목적으로 이 약을 사용하는 경우는 식품 등으로부터의 섭취량에 주의하고 이 약에 의한 비타민 A 투여는 5,000 IU/일 미만에 머물도록 하는 등 적절한 주의를 하십시오.
- 4) 소화성궤양, 만성궤양성대장염, 국한성대장염 등의 위장질환 환자
- 5) 심장·순환기계기능 장애 환자 6) 신장장애 환자 7) 저단백혈증 환자
- 8) 담낭(쓸개)관련 질환, 간질환 환자
- 9) 통풍환자 또는 신장결석이 있는 환자

6. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.

상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지하십시오.

- 1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우
구역, 구토, 가려움, 건조하고 거친 피부, 통증성 관절부종, 위부불쾌감, 설사, 변비, 발진, 발적 (충혈되어 붉어짐), 묽은 변, 구내염(입안염), 식욕부진, 복부(배부분)팽만감, 상복부 통증, 혼수, 피부염, 땀·호흡시 악취, 탈모, 조급증, 위장관장애, 소화장애, 저혈압, 폐부종(부기)
- 2) 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수 있습니다.
- 3) 에스트로겐을 포함한 경구용(먹는) 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전(혈관막힘성 소인이 있는 환자)가 비타민 E를 복용할 경우 혈전(혈관막힘)증의 위험이 증가될 수 있습니다.
- 4) 장기간 고용량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있습니다.
- 5) 피리독신을 1일 500mg ~ 2g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상 (neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있습니다.
- 6) 폴산이 부족한 환자에게 비타민 B₁₂를 1일 10 μ g 이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있습니다.
- 7) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈심부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있습니다.
- 8) 장기간 고용량의 비타민 A(베타카로틴으로부터 전환된 것을 제외한) 섭취는 폐경기를 지난 여성의 골다공증(뼈영양증) 위험을 높일 수 있습니다.
- 9) 항알도스테론제, 트리암테렌과 병용(함께복용)투여시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의하십시오.
- 10) 우발적으로 과량복용 한 경우 11) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

7. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지키십시오.
- 2) 이 약에 함유된 비타민 A는 정상적인 식이에서 충분히 공급되므로 보조요법의 용량은 1일 5,000 IU 이상을 넘지 않도록 하십시오.
- 3) 각종 요검사시에 혈당의 검출을 방해할 수 있습니다.
- 4) 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사에 영향을 줄 수 있습니다.
- 5) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피하십시오.

8. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 밀폐하여 보관하십시오.
- 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

※ 개봉한 약을 냉장고, 욕실, 주방 등 습기가 많은 곳이나, 직사광선이 닿는 곳에는 보관하지 마십시오. 습기, 열, 빛은 약의 효과와 안정성에 영향을 줄 수 있으니 보관에 주의바랍니다.

※ 제품 개봉 또는 취급시에 포장재(케이스, 알루미늄호일지)로 인하여 상처를 입을 수 있으므로 주의하시기 바랍니다.

※ 포장을 개봉하여 복용시 가끔 제품에 포장물(알루미늄호일지)이 같이 따라오는 경우가 있으므로 복용시 정제(알약)만 복용하시기 바랍니다.

● **저장방법** 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

● 포장단위 30정, 100정

주최: 한국수출입은행 (전화: 080-022-1010(국립수출입은행))

공화국경기도 아산시 관내 25

2 리즈필드 | 사조 | Y름늘롱 | Y굽

上海外灘金融貿易中心有限公司 GINOTI

www.idong.com에 의해 제공됩니다.

※이 설문서는 2015년 11월 4일까지로 작성되었으며 이후로 변경된 내용은 물폐이지

[illegible]

아로나민®
아이정

눈의 피로, 눈의 건조감 완화에-

아로나민아이[®] 정에는 건강한 눈에 필요한

항산화 비타민과 미네랄이 복합 처방되어 있습니다. 눈의 근육, 신경의 피로를 풀어 주는 활성비타민B군, 망막과 맥락막에 고농도로 존재하여 눈의 정상적인 기능을 돕는 아연, 산화성 스트레스로 유발되는 백내장, 녹내장을 예방하는 항산화제(레티놀, 베타카로틴, 비타민 C, E, 셀레늄)를 함유하고 있습니다.

시력이 나빠지기 시작하는 어린이의 일시적 가성(거짓)근시의 회복, 시험준비로 인한 수험생의 눈의 피로와 어깨·목 결림, 장시간 컴퓨터 사용으로 인한 직장인의 건조한 눈에 아로나민아이정은 최적의 영양을 공급합니다.

아로나민아이정은 특히 이러한 증상에 좋습니다.

1. 성장기 학생들의 일시적인 가성(거짓)근시에-



2. 수험준비, 독서, 고된 업무로 눈이 늘 피로하고 침침할 때-



3. 컴퓨터 게임, TV의 장시간 시청으로 눈이 건조하고 어깨가 결릴 때-



4. 충혈로 핏발선 눈에-



5. 야간에 시력이 급격히 떨어져 운전시 눈이 흐릿할 때-



6. 백내장과 산화성 녹내장을 예방하기 위해-



● 원료약품의 분량 (1정중)

레티놀팔미테이트과립(별규) (비타민A로서 1000IU)	2.0mg
β-카로틴 20% 과립(별규) (β-카로틴으로 0.75mg)	3.75mg
푸르셀티아민(KP) (활성비타민B1)	25.0mg
리보플라빈부티레이트(KP) (활성비타민B2)	2.5mg
피리독신염산염3배산(KP) (피리독신염산염으로서 5.0mg) (비타민B6)	15.0mg
시아노코발라민1000배산(KP) (시아노코발라민으로서 0.1mg) (비타민B12)	100.0mg
아스코르브산(직타용)(별규) (아스코르브산으로서 75.0mg) (비타민C)	77.32mg
토코페롤아세테이트2배산(KP) (비타민E로서 50IU)	100.0mg
셀레늄함유건조효모(KP) (셀레늄으로서 25μg)	46.3mg
황산망간수화물(USP) (망간으로서 2.5mg)	7.695mg
산화제이구리(KP) (구리로서 0.23mg)	0.288mg
산화아연(KP) (아연으로서 10.0mg)	12.45mg
첨가제(타르색소) : 황색5호, 적색40호, 청색2호	

● **성상** : 이 약은 주황색의 타원형 필름코팅정입니다.

Aro-EYE

● 효능·효과

○ 다음 경우의 비타민 A, B₁, B₂, B₆, C, E 의 보급

- 육체피로 - 임신·수유기
- 병중·병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하시 - 노년기
- 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같습니다.

* 비타민A : • 눈의 건조감의 완화, • 야맹증(밤에 잘 못보는 증상)

* 비타민E : • 말초혈행장애 및 갱년기시 다음 증상의 완화 :

어깨·목결림, 수족저림·수족냉증(손발이 차가움)

* 비타민B₁ : • 다음 증상의 완화 : 신경통, 근육통, 관절통(요통, 어깨결림 등)
• 각기·눈의피로

○ 아연의 보급

● 용법·용량

만 12세 이상 및 성인 : 1회 1~2정을 1일 2회 복용합니다.