

원료약품 및 그분량 이 약 1캡슐 중
 오메가-3-산 에칠에스텔 90(EF)
 (에이코사펜타엔산(EPA)에칠에스텔로서 460.0mg, 도코사헥사엔산(DHA) 에칠에스텔로서380.0mg)
 (하산화제로서 일파투코페롤4.0mg)
 캡슐기제(동물유래) : 젤라틴(건강한 소의 가죽 내피에서 채취)
성상 미황색의 유성물질이 충전된 투명한 장방형 연질캡슐
효능·효과
 1. 심근 경색 후 이차발생 예방
 심근경색후 이차 예방을 위한 기타 표준 요법 (예: 혈소판 억제제, 베타차단제, ACE 차단제)에 대한 보조요법
 2. 다음의 내인성 고트리글리세라이드혈중 환자의 상승된 트리글리세라이드 수치를 감소시키기 위한 식이요법의 보조제
 1) 고트리글리세라이드혈중(Ⅳ형)에 대한 단독투여요법
 2) 고콜레스테롤혈증과 고트리글리세라이드혈중의 복합형(Ⅱb형)에 대한 스타틴계 약물과의 병용요법
 3) 트리글리세라이드 수치가 조절되지 않는 고콜레스테롤혈증과 고트리글리세라이드혈중의 복합형(Ⅱb형) 환자에서 스타틴계 약물과의 병용요법

용법·용량
 이 약은 투여하기 전에 적절한 지질저하 식이요법을 반드시 실시해야 하며 치료기간 중에도 계속되어야 합니다. 이 약은 위장 장애를 피하기 위하여 식사와 함께 복용합니다.
 1. 심근경색후 이차발생 예방 : 1일 1g(1캡슐)을 복용합니다.
 2. 고트리글리세라이드혈중
 통상 초회용량은 1일 2g(2캡슐)이며, 필요시 1일 4g까지 증량할 수 있습니다. 1일 1회 또는 2회 투여합니다.

사용상의 주의사항
 1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.
 1) 이 약의 구성성분에 과민반응을 나타내는 환자
 2) 18세 미만의 소아
 2. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.
 1) 심한 외상 및 수술 등 출혈의 고위험 상태에 있는 환자
 2) 간기능 장애환자
 3) 생선에 과민성 또는 알러지가 있는 환자
 3. 이상반응
 1) 8건의 고트리글리세라이드혈증(hypertriglyceridemia)에 대한 무작위배정, 위약대조, 이중맹검, 평행군 임상시험에서 1%이상의 환자에서 발생한 약물관련 이상반응은 [표 1]과 같습니다. 임상시험에서 이 약은 투여환자의 3.5%, 위약은 투여환자의 2.6%가 이상반응으로 인해 투약을 중단하였습니다.

[표 1] 고트리글리세라이드혈증 환자 대상 위약대조 임상시험에서 발생한 이상반응

이상반응	오마코 4g/일 (N = 226)		위약 (N = 228)	
	N	%	N	%
1건 이상 이상반응이 발생한 환자수	80	35.4	63	27.6
전신				
요통	5	2.2	3	1.3
감기증상	8	3.5	3	1.3
감염	10	4.4	5	2.2
통증	4	1.8	3	1.3
심혈관계				
협심증	3	1.3	2	0.9
소화기계				
소화불량	7	3.1	6	2.6
트림	11	4.9	5	2.2
피부				
발진	4	1.8	1	0.4
특수감각				
미각도착	6	2.7	0	0.0

2) 임상시험기간 동안에 관찰된 기타 이상반응
 고트리글리세라이드혈증 22건의 임상시험에서 1명 이상의 환자에서 관찰된 이상반응은 다음과 같습니다.
 - 전신 : 복부 팽창, 무력증, 체취, 흉통, 오한, 자살, 발열, 전신부종, 진권감염, 관대감, 목의 통증, 중앙, 류마티스성 관절염, 급사(sudden death), 바이러스성 감염
 - 심혈관계 : 부정맥, 우회로조성술(bypass surgery), 심장정지, 고지혈증, 고혈압, 편두통, 심근경색, 심근허혈, 폐색, 말초혈관 장애, 실신, 빈맥
 - 소화기계 : 식욕부진, 변비, 구강건조, 연하장애, 결장염, 대변실금, 위염, 위장장애, 위장장애, 식욕증가, 장폐쇄, 흑색변(melena), 횡장염, 이급후종, 구토, 생선 냄새, 맛에 기인한 역류나 트림, 오심, 고창, 설사
 - 혈액-림프계 : 림프절병증
 - 대사 및 영양장애 : 부종, 고혈당증, ALT 및 AST 증가
 - 근골격계 : 관절통, 관절염, 근육통, 병적 골절, 힘줄 장애
 - 신경계 : 중추신경계 종양, 우울증, 어지럼증, 감정의 불안정, 안면마비, 불면, 혈관확장, 현기
 - 호흡기계 : 천식, 기관지염, 잦은 기침, 호흡곤란, 코피, 후두염, 인두염, 폐렴, 비염, 부비동염
 - 피부 : 탈모, 습진, 가려움증, 발한
 - 특수감각 : 백내장
 - 비노생식계 : 자궁경부이상, 자궁내막종양, 부고환염, 발기부전
 3) 국내 시판 후 조사 결과
 국내에서 6년동안 759명을 대상으로 실시한 시판후 사용성적조사 결과, 유해사례 발현율은 20.95%(159명/759명, 240건)이었고, 이 중 본제와 인과관계를 배제할 수 없는 약물유해반응 발현율은 3.95%(30명/759명, 37건)이며, 소화불량 0.79%(6명/759명, 6건), 어지러움 0.40%(3명/759명, 3건), 두통, 변비, 오심(욕지기, 구역), 위장관 장애, ALT상승, AST상승, 가려움(증) 각각 0.26%(2명/759명, 2건), 감각이상, 설사, 구강건조, 흉통, 흉부 불쾌감, 부종, 피로, 불쾌감, 체중 감소, 근육통, 고지혈증, 기관지염, 호흡 곤란, 기침 각각 0.13%(1명/759명, 1건)이 보고되었습니다. 이중 중대한 약물유해반응은 없었습니다.
 - 예상하지 못한 약물유해반응은 총 5건 발생하였으며, 발현사례로는 감각이상, 흉부불쾌감, 피로, 불쾌감, 체중감소 각 1건이었습니다. 이중 중대한 약물유해반응은 없었습니다.
 4) 기타 : 국외 임상시험에서 때때로(0.1%~1% 정도) 저혈압, 위장관출혈, 통풍과 같은 이상반응이 추가로 보고되었습니다.

4. 일반적 주의
 1) 치료 일반
 (1) 초기 치료
 이 약 치료를 실시하기 전에 실험실적 감사를 통해 환자의 트리글리세라이드 수치가 지속적으로 정상 범위를 벗어나 있음을 확인해야 합니다. 일반적으로 임상지침에 따라 과체중 및 알코올 과다섭취는 고트리글리세라이드혈증의 주요인자가 될 수 있으므로

약물요법을 시작하기 전에 적절한 식이요법과 운동을 병행하고, 과체중 환자의 경우에는 체중 감량을 실시합니다. 고트리글리세라이드혈증을 촉진하는 질환(갑상선기능 저하증, 당뇨병, 혈청 트리글리세라이드 수치를 개선시키기 위하여 적절히 치료되어야 합니다. 약물요법을 고려하기 전에 고트리글리세라이드혈증을 악화시킨다고 알려진 약물치료(베타 차단제, 차아디드게 이노제, 에스트로겐 등)는 중단하거나 가능하면 변경해야 합니다.

(2) 치료의 지속

- 이 약으로 약물요법을 실시하는 동안 주기적으로 실험실적 검사를 시행하여 환자의 트리글리세라이드 수치를 측정하여야 합니다. 투여 후 2개월 후에도 적절한 반응을 보이지 않은 환자에 대해서는 이 약의 치료를 중단해야 합니다.
- 지질조절제는 비약물요법으로 만족스러운 결과를 얻기 위하여 충분히 시도한 후에만 그사용 여부를 고려해 볼 수 있습니다. 지질조절제를 사용한다고 해서 식이요법 준수와 중요성이 감소되지 않음을 환자에게 숙지시켜야 합니다.
- 이 약은 외인성 고트리글리세라이드혈증(1형 고킬로마이크로혈증)에는 사용되지 않으며, 2차성 내인성 고트리글리세라이드혈증에 대한 사용경험특히 조절되지 않는 당뇨병환자)는 제한적입니다.
- 고트리글리세라이드혈증에 대하여 피브레이트 제제와 병용 경험은 없습니다.
- 실험실적 검사: 일부 환자에서 AST 상승을 동반하지 않는 ALT 상승이 관찰되었습니다. 이 약을 투여하는 동안 ALT 수치를 주기적으로 점검해야 합니다.
- 몇몇 환자에서 이 약은 저밀도 지단백 콜레스테롤(LDL-cholesterol) 수치를 증가시켰습니다. 다른 지질조절제와 마찬가지로 이 약을 투여하는 동안 LDL-cholesterol 수치를 주기적으로 점검해야 합니다.
- 이 약 투여 기간동안 thromboxane A2의 분비는 감소하나, 그외 응고인자에서는 의미있는 영향이 관찰되지 않았습니다. 오메가-3 지방산에 대한 일부 연구에서 출혈시간이 연장된 것으로 나타났으나, 이들 연구에 보고된 출혈시간은 정상 범위를 초과하지 않았으며 임상적으로 유의한 사례는 없었습니다.

5. 약물상호작용

- 항응고제: 이 약과 항응고제 및 아세틸살리실산을 병용할 경우 출혈시간의 증가가 관찰되었습니다. 이는 출혈시간에 미치는 부가적인 효과에서 비롯된 결과일 수 있으나, 출혈성합병증은 기록된 바가 없습니다.
 - ① 항응고제: 혈액희석요법(blood-thinning therapy)을 받고 있는 환자가 이 약과 항응고제를 병용하는 경우와 이 약의 치료를 중단하는 경우에는 환자의 프로트롬빈시간(PT, prothrombin time) 및 국제표준화비율(INR, international normalized ratio) 수치가 반드시 모니터링 되어야 합니다.
 - ② 아세틸살리실산: 환자는 출혈시간이 연장될 수도 있는 잠재적인 가능성에 대하여 숙지하여야 합니다.
- 시토크롬 P450 의존성 모노옥시게나아제 활성: 오메가-3 지방산 함유제품은 랫트에서 간내 시토크롬 P450 농도 및 활성을 증가시킵니다. 사람에서의 P450 활성 유도에 대한 이 약의 가능성에 대해서는 아직 연구된 바 없습니다.

6. 임신, 수유부에 대한 투여

- 임부: 임신한 여성에서 실시한 임상시험은 없습니다. 이 약이 임신한 여성에게 투여시 태아에 해를 유발하는지 또는 생식능력에 영향을 주는지 대해서는 알려져 있지 않습니다. 임신중에는 치료상의 유익성이 태아에 대한 위험성을 상회하는 경우에만 사용합니다.
- 수유부: 오메가-3-산 에칠에스테르이 모유로 유출되는 지는 알려져 있지 않습니다. 많은 약물들이 모유로 배출되기 때문에 수유중인 여성에게 투여할 때는 주의할 하여야 합니다.

7. 소아에 대한 투여

소아에 대한 이 약의 안전성과 유효성은 확립되지 않았으므로 소아에는 권장되지 않습니다.

8. 고령자에 대한 투여

65세 이상 환자: 제한된 수만이 임상시험에 포함되었습니다. 임상시험을 종합하여 분석한결과 60세 이상 환자(연구집단의 약 25%)에 대한 안전성과 유효성은 60세 미만 환자의 결과와 다르지 않은 것으로 나타났습니다.

9. 과량투여시 처리

과량투여 시 대중적으로 치료하며 필요 시 일반적 지지요법을 실시해야 합니다.

10. 기타

1) 발암성, 변이원성, 수태능 저하

(1) 발암성

랫트를 대상으로 한 발암성시험에서 100, 600 및 2000 mg/kg/day 용량으로 오메가-3-산에칠에스테르를 경구투여하였었다. 수컷은 101주 동안, 암컷은 89주 동안 종양발생수가 증가하지 않았었다(체표면적 기준으로 인체전신노출 경구용량인 4 g/day의 5배 용량까지). 마우스를 대상으로 한 표준생존기간 동안의 발암성 시험은 수행되지 않았었다.

(2) 변이원성

살모넬라균(S. typhimurium)과 대장균(E. coli) 미생물의 변이원성 시험(Ames test), 중국 햄스터 V79 폐세포와 사람 림프구 염색체 이상분석 등에서 오메가-3-산 에칠에스테르는 대사활성화법 여부와 관계없이 변이원성 또는 염색체이상을 유발하지 않았었다. 오메가-3-산 에칠에스테르는 마우스의 생체내 소핵시험에서 음성의 결과를 나타내었습니다.

(3) 수태능 저하

랫트를 대상으로 한 수태능시험에서 100, 600 및 2000 mg/kg/day 용량으로 오메가-3-산에칠에스테르를 수컷은 교배 10주 전에, 암컷은 교배 2주전과 교배, 임신, 수유기간전반에 걸쳐 경구투여하였었다. 2000 mg/kg/day(체표면적 기준으로 인체전신노출 경구용량인 4 g/day의 5배 용량)까지 수태능에는 이상을 보이지 않았었다.

2) 임신 범주 C

오메가-3-산에칠에스테르는 임신상태의 랫트에 체표면적기준으로 사람권장량 (recommended human dose)인 4 g/day의 7배 용량을 투여한 결과 배자의 사망이 관찰되었습니다. 암컷 랫트에 교배 2주전부터, 임신, 수유기간 동안 100, 600 및 2000 mg/kg/day 용량을 경구 투여한 결과 고용량군에서는 이상반응이 관찰되지 않았었다.

임신상태의 랫트에 임신 6일부터 15일째까지 1000, 3000 및 6000 mg/kg/day 용량을 경구투여한 결과 이상반응이 관찰되지 않았었다(6000 mg/kg/day 용량은 체표면적 기준으로 인체전신노출 경구용량인 4 g/day의 14배 용량).

임신 랫트에 임신 14일부터 수유 21일째까지 100, 600 및 2000 mg/kg/day 용량을 경구투여한 결과, 2000 mg/kg/day에서 이상반응이 관찰되지 않았었다. 그러나 보다 높은 용량인 3000 mg/kg/day(체표면적 기준으로 인체전신노출 경구용량인 4g/day의 7배 용량)에서는 생존출생자수가 20% 감소하였고, 출생 후 4일까지 생존율이 40% 감소하였었다.

임신 토끼의 경우 임신 7일부터 19일째까지 375, 750 및 1500 mg/kg/day(체표면적 기준으로 인체전신노출 경구용량인 4 g/day의 2, 4, 8배 용량) 용량을 경구 투여한 결과, 375 mg/kg/day에서 태아에 아무런 문제가 관찰되지 않았었다. 그러나 고용량에서는 모태독성의 증거가 관찰되었습니다.

11. 기타

1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관합니다.

2) 다른 용기에 바꾸어 넣는 것은 사고원인이 되거나 품질유지 면에서 바람직하지 않으므로 주의합니다.

저장방법

기밀용기, 25°C 이하 보관, 열리지 마십시오.

포장단위 30, 100캡슐

제조사

(주)일미코프 경기도 화성시 향남읍 제곡공단4길 35-7 콜마파매(주) 충북 제천시 바이오밸리 2로 93

(주)서흥합성 충북 청원군 오송읍 오송생명로 61 (주)동구바이오제약 경기도 화성시 향남읍 제곡공단2길 18

- 반드시 첨부문서를 읽은 후 사용(복용)하시고 첨부문서는 약과 함께 보관하시기 바랍니다.
- 반드시 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 유통기한 사용법을 모거나 의문사항이 있는 경우 반드시 의사·약사와 상담 후 사용하십시오.
- 본 제품의 품질관련 문의사항은 080-581-5800으로, 기타 제품관련 문의사항은 (02)714-0091로 연락하시기 바랍니다.

- 만약 구입시 사용(유효)기한이 지났거나 변질·변해·오염되었거나 손상된 의약품은 약국개설자 및 의약품 판매업자에게만 교환하여 드립니다.
- 본사는 제조를 책임법 시행에 따라 고객상담 전용창구(전화 080-719-2000)를 운영하고 있습니다.

- 최신의 정보 확인방법: 이 첨부서 최종개정년월일 이후 변경된 내용은 홈페이지(www.kuhnl.com)에서 확인할 수 있습니다.
- 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품정보는 이지드레(<http://ezdrug.mfds.go.kr>) ->정보마당 ->의약품등 정보,를 참조하시기 바랍니다.