

소재명	실론정 500T 라벨
소재코드/개정번호	70987 / Ver.2
규격(mm)	200 × 75
인쇄도수/컬러	4도 : CMYK
용지/코팅/후가공	아트지

75 mm

200 mm

75 mm

70987/Ver.2

비만·변비 개선

실론 정

(방풍통성산건조엑스(4.6→1))

Sylon Tab.

500 tabs.

일반의약품

조 제 용

■ **원료인물 및 그 분량** : 정 중 · 유효성분 : 방풍통성산건조엑스(4.6→1) (별고) 237.5mg · 첨가제(타르색소) : 황색203호, 황색6호, 적자(제(동물용색소)) : 유당수화물(소, 우유), 기타첨가제 : 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 잔류글리콜린나트륨, 클로이드성산화규소, 덱스트로판(29Y467), 히드록시프로필셀룰로오스, ■ **성상** : 연한 황색의 원형 필름코팅된 정. ■ **효능·효과** : 배에 피로(자변)이 많고 변비가 있는 환자의 대장장, 고혈압의 증상을 완화시키는 데 효과적. ■ **용법·용량** : 보통 성인 1회 4정을 일일 1회 식전 또는 식후 복용한다. ■ **사용상의 주의사항** : 1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것. 1) 일부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성이 약에 함유되어 있는 대량의 자궁수축작용 또는 골반내 장기의 충혈작용에 의해 유·초산의 위험이 있다. 2) 수유부(이 약에 함유되어 있는 대량 중 인트렌지는 유도체는 모유 중으로 이행되어 영아에게 실사를 유발할 수 있으므로 수유 중에는 약물복용을 금하거나 수유를 중단한다.) 3) 이 약은 우유를 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다. 4) 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자 5) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자 2. 이 약을 복용하고 있는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것. 다른 실사약 3. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 한의사, 치과의사, 약사, 한약사와 상의할 것. 1) 고혈압 환자 2) 심장병 또는 신장에 환자 3) 부종 환자 4) 고령자(일반적으로 고령자는 신기능이 저하되어 있으므로 감량하는 등 주의할 것) 5) 의사의 치료를 받고 있는 환자(다른 약물을 투여 받고 있는 환자) 6) 설사, 묽은 변의 증상이 있는 환자(증상이 악화될 수 있다.) 7) 위장이 허약한 환자(신약무진, 위부불쾌감, 복은 변, 부종, 구역, 구토, 설사 등이 나타날 수 있다.) 8) 식욕부진, 구역, 구토의 증상이 있는 환자(증상이 악화될 수 있다.) 9) 병후의 쇠약기, 현재까지 체력이 쇠약해진 환자(이상반응이 쉽게 나타나고 그 증상이 악화될 수 있다.) 10) 힘이 많이 나는 환자(땀과, 전신탈력감 등이 나타날 수 있다.) 11) 현상, 신근색 등의 순환기계 장애가 있는 환자 또는 그 병력이 있는 환자 12) 당뇨병에 환자(질화 및 증상이 악화될 수 있다.) 13) 갑상선기능항진증 환자(질화 및 증상이 악화될 수 있다.) 14) 지금까지 이 약에 의한 발진, 발진, 가려움 등을 일으킨 적이 있는 환자 15) 당뇨병 환자(이황에페드린류에 의해 글리코겐의 분해가 촉진되어 혈당이 상승할 수 있다.) 16) 고지단백혈증, 당뇨병성고지혈증 및 해당증 등 지질대사 이상 환자 또는 지질성 유제를 신중히 투여해야 하는 환자 17) 이 약은 황색4, 히드록시프로필셀룰로오스 함유하고 있으므로 이 성분과 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다. 4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 한의사, 치과의사, 약사, 한약사와 상의할 것. 상단 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것. 1) 이 약의 복용에 의해 다음의 증상이 나타날 경우 (1) 위일도스테론증 : 요양이 감소하거나, 얼굴과 손발이 붓고, 눈꺼풀이 무거워지고, 손이 굳어지고, 혈압이 높아지거나, 두통 등(1일 최대 배합량이 감소로서 1g 이상의 제제는 장기간 계속하여 복용할 경우 지혈불능증, 혈압상승, 나트륨 체액의 저류, 부종, 체중증가 등의 위일도스테론증이 나타날 수 있으므로, 관찰할정도의 속성을 충분히 하고 이상이 확인되는 경우 복용을 중지할 것.) (2) 근병증 : 지혈불능증의 결과로서 근병증이 나타날 수 있으므로, 관찰을 충분히 하고 무력감, 사지경련, 마비 등의 증상이 확인되는 경우 복용을 중지할 것. (3) 소화기계 : 식욕부진, 위부불쾌감, 구역, 구토, 부종, 설사 등 (4) 피부 : 발진, 발진, 가려움 등이 나타날 경우 (5) 자율신경계 : 불면, 떨, 과다, 빠른 맥, 소변을 자주 볼, 두근거림, 전신무력감, 정신불안 등 (6) 뇨(노)계 : 배뇨장애 (7) 간기능장애 : 황달, AST, ALT, ALP, Y-GTP 등의 상승을 동반한 간기능장애(전신의 나른함, 황달(피부 또는 눈의 황색)이 황색을 띄게 됨)가 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고, 이상이 확인되는 경우 복용을 중지할 것. 2) 1개월(반년)에 복용하는 경우 1정 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우 5, 7가 이 약의 복용 시 주의할 사항 1) 장기간 계속하여 복용하지 않는 것이 원칙이나 부득이 장기간 계속하여 복용할 경우에는 의사, 한의사, 치과의사, 약사, 한약사와 상의할 것. 2) 자극성 완화제는 장기간 계속 복용시 약물에 대한 내성이 생기고, 변비가 악화될 수 있으므로 1주 이상 계속 복용해서는 안된다. 만약 매일 변비가 필요한 상태라면 원인을 조사하여야 한다. 3) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것. 대량의 사용증상은 개연자가 있으므로 용법·용량에 주의할 것. 4) 다른 한약생약제제 등과 병용 투여할 경우 함유 성분의 중복에 주의하여야 한다. 대용 함유제제와 병용투여 시 특히 주의할 것. 5) 마취 또는 마비(마비) 마약, MAO 억제제, 갑상선제제(티로신, 리오트론), 카테콜아민제제(에피네프린, 이소그레날린), 크산틴계제제(테오필린, 디프로필린)과 병용 시 불면, 떨, 과다, 빠른 맥, 소변을 자주 볼, 두근거림, 전신무력감, 정신불안 등의 증상이 나타날 수 있으므로 감량하는 등 신중히 복용할 것. 6) 칼륨함유제제, 갑상선제제, 글리시리진산 또는 그 염류 함유제제, 루프계 이뇨제(부로세미드, 에타크리산) 또는 티아지드계 이뇨제(프레로세미드)와 병용시

위일도스테론증이나 지혈불능증으로 인하여 근병증이 나타나기 쉬우므로 신중히 복용할 것. 7) 자혈과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자(예 이 약을 투여할 때 혈장지질치를 점검할 것을 권장한다. 이 정제를 통해 지방의 체내배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절한다. 환자가 다른 정제용 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제로 함유되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 한다. 6. **저장상의 주의사항** : 1) 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것(사용 후 반드시 밀봉 보관할 것). 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 약품 오염(오염) 사용에 의한 사고 발생이나, 약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것. ■ **포장단위** : 300정/병, 360정/병, 500정/병, 720정/병, 720정/상자(360정/병×2, 1000정/병) ■ **저장방법** : 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

[제조사] (주)노바임헬스케어 경상북도 경산시 하양읍 자석산업4로 16-53
[제조(의)회사] (주)비보존제약 경기도 화성시 향남읍 제안공단2길 34-40

이 첨부문서 개정일자 이후 변경된 내용은 회사 홈페이지(www.vivozonpharm.com)를 통해서 확인하실 수 있습니다. 만약, 구입시 사용(한)이 경과되었거나 변질, 변색 또는 오염 및 손상된 제품을 구입처를 통하여 교환하시기 바랍니다. 본 제품이 이상이 있을 경우 공장(제)위험한 고지 소비자문명(제)문에 악의 고환 또는 보상받을 수 있습니다. 약품 용어설명 및 기타 자세한 약품정보는 식품의약품안전처 약품등록정보시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr>)을 참조하십시오. ※ 부작용 보고 및 피해구제 상담 : 한국약물안전관(1644-6223, 14-3330)

[제조번호]

[사용기한]

35X 18mm

소비자상담전화 : 080-353-6500 (수신자부담)

최초작성연월일 2005. 04. 01
최초개정연월일 2025. 03. 26

(01)08806582006513

HDPE
무연 : LDPE