

기질성 뇌기능장애 개선제

징카신 정 120mg

(은행엽엑스)



일반의약품	
의약품 분류번호	219 기타의 순환계용약

은행엽엑스(Ginkgo biloba ext.)는 염증유발 및 혈소판응집을 일으키는 PAF를 억제하고, 자유라디칼을 제거하여 혈액순환을 개선하고 신경세포를 보호합니다.

또한 노화에 따른 베타 아밀로이드의 축적 및 아세틸콜린 수용체의 손실을 막고, 기억에 관여하는 뇌의 해마부분을 자극하여 초기 알츠하이머 질환, 혈관성 치매 및 이명(귀울림) 등의 치료에 널리 사용되는 약물입니다.

징카신 정 120mg은 고용량의 은행엽엑스를 함유하여 치매예방 및 혈액순환개선에 더욱 효과적입니다.

【성분·함량】 1정 중

은행엽엑스(KHP).....120mg
첨가제(타르색소):황색4호(KPTaCS)
첨가제(타르색소):청색1호(KPTaCS)

【성상】 녹색의 원형 필름코팅 정제

【효능·효과】

- 주 효능효과
 - 말초동맥 순환장애[간헐성 파행증(이따금 절뚝거림)]의 치료
 - 어지러움, 혈관성 및 퇴행성 이명(귀울림)
 - 이명(귀울림), 두통, 기억력 감퇴, 집중력 장애, 우울감, 어지러움 등의 치매성 증상을 수반하는 기질성 뇌기능 장애의 치료

【용법·용량】

- 성인
 - 말초동맥 순환장애, 어지러움, 이명(귀울림):
은행엽 엑스로서 1회 40mg, 1일 3회 또는 1회 80mg, 1일 2회 경구투여한다.(복용한다.)
 - 기질성 뇌기능 장애:
은행엽 엑스로서 1회 40~80mg, 1일 3회 또는 1회 120mg, 1일 2회 경구투여한다.(복용한다.)
- 연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

【사용상의 주의사항】

- 다음 환자에는 투여하지 말 것
이 약에 과민증 환자
- 다음 환자에는 신중히 투여할 것.
이 약은 황색4호(타르트라진)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.
- 부작용
 - 드물게 가벼운 위장관 불쾌감, 두통, 알레르기성 피부반응이 나타날 수 있다.
 - 국내 자발적 이상사례 보고자료(1989~2013년)를 분석한 결과, 이상사례가 보고된 다른 의약품에서 발생한 이상사례에 비해 통계적으로 유의하게 많이 보고된 이상사례는 다음과 같이 나타났다. 다만, 이로서 곧 해당성분과 다음의 이상사례 간에 인과관계가 입증된 것을 의미하는 것은 아니다.
 - 어지러움
 - 가려움증
- 일반적 주의
이 약은 고혈압 치료제가 아니므로 특별한 치료를 요하는 고혈압 환자에는 투여하지 않는다.
- 임부에 대한 투여
동물실험에서 기형발생은 없었으나 임신중의 투여에 대한 충분한 사용경험이 적다.
- 소아에 대한 투여
소아의 사용경험이 충분하지 않으므로 12세 이하의 소아에는 투여하지 않는다.
- 저장상의 주의사항
직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전하여(뚜껑을 꼭 닫아) 보관한다.

【저장방법 및 사용기간】

저장방법 : 기밀용기, 실온보관(1~30℃) 사용기간 : 제조일부터 36개월

【포장단위】 100정

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리하에서 제조된 (KGMP) 적격업체 제품입니다. 만약 구입시 사용 기간이 경과되었거나 유통 과정 중 변질·변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

- ※ 주의
- 사용전에 제품설명서를 자세히 읽어보십시오.
 - 올바른 사용법을 모르거나 의문사항이 있는 경우 의사·약사와 상의하십시오.
 - 정해진 용법·용량을 준수하십시오.
 - 어린이 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

■ 소비자상담전화 (서울)02-3477-1731 (부산)051-204-3831

최종개정년월일:2015. 05. 27
작성년월일:2015. 04. 30



대우제약(주)

서울특별시 서초구 남부순환로 2495 원림빌딩 (서초동)
부산광역시 사하구 다대로 153(신평동)

※ 이 첨부문서 작성일자(2015년 4월 30일)이후 변경된 내용은 <http://www.daewoopharm.com>나 051-204-3831(대우 제약 개발부)에서 확인할 수 있습니다.