

생체 이용률을 높인 간장약

실리세프 연질캡슐

(밀크시슬엑스)

일반의약품

분류번호 391
(간장질환용제)

실리세프연질캡슐은 마리아 영경귀의 종자로부터 추출한 실리마린을 주성분으로 하는 간장질환 치료제입니다. 실리세프연질캡슐은 특화된 기술로 기존의 타 제제에 비해 흡수율을 높여 생체이용을 극대화 시켰으며, 강력한 항산화제로 작용하여 독성물질로부터 간장을 보호하며 간세포를 정상화시킵니다.

원료약품의 분량 (1캡슐 중)

밀크시슬엑스(KHP) 175.0mg
(실리마린으로서 98mg)

성상 : 이 약은 갈색의 액상 내용물이 든 투명한 갈색의 장방형 연질캡슐입니다.

SILYCFE

효능·효과

다음 질환의 보조 치료 : 독성 간질환, 만성 간염, 간경변

용법·용량

성인 :

- 초기용량 : 1회 1캡슐(실리마린으로서 140mg 또는 실리빈으로서 60mg), 1일 3회
- 유지용량 : 1회 1캡슐(실리마린으로서 140mg 또는 실리빈으로서 60mg), 1일 2회
(또는 1회 실리마린으로서 70mg 또는 실리빈으로서 30mg, 1일 3회)
복용합니다.

사용상의 주의사항

복용하시기 전에 다음의 주의사항을 잘 읽어 보시고 복용하시기 바랍니다.

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.

- 1) 심한 담도폐쇄(쓸개길폐쇄) 환자
- 2) 이 약의 과민증 환자
- 3) 12세 이하의 소아

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오. 임부, 수유부

3. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의 하십시오. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지하십시오.

- 1) 드물게 위통 또는 설사
- 2) 알레르기 반응

4. 이 약의 복용 시 주의할 사항

- 1) 정해진 용법·용량을 지키십시오.
- 2) 황달의 경우에는 의사 또는 약사와 상의하십시오.
- 3) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우나 장기복용 시에는 의사 또는 약사와 상의하십시오.

5. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여(뚜껑을 꼭 닫아) 보관하십시오.
- 3) 의약품은 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 의한 사고발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관하십시오.

※ 온도가 높은 곳에 보관시 약 (캡슐)이 변형될 수 있으므로 서늘한 곳에 보관하시기 바랍니다.

※ 제품 개봉 또는 취급시에 포장재 (알루미늄 호일지)로 인하여 상처를 입을 수 있으므로 주의하시기 바랍니다.

※ 개봉한 약을 냉장고, 욕실, 주방 등 습기가 많은 곳이나, 직사광선이 닿는 곳에 보관하지 마십시오.

습기, 열, 빛은 약의 효과와 안정성에 영향을 줄 수 있으니 보관에 주의 하시기 바랍니다.

※ 포장을 개봉하여 복용시 가끔 제품에 포장물 (알루미늄호일지)이 같이 따라오는 경우가 있으므로 복용시 캡슐(알약)만 복용 하시기 바랍니다.

저장방법

기밀용기, 실온 (1~30℃)보관

포장단위

60, 120캡슐

○ 이 제품은 공정거래위원회고시 소비자 분쟁해결 기준에 의거 교환 또는 보상 받을 수 있습니다.

○ 이 설명서는 2013년 9월 3일자로 작성되었으며 이 후로 변경된 내용은 홈페이지(www.ildong.com)에서 확인할 수 있습니다.

제조사 : (주)알피corp
경기도 화성시 향남읍 제약공단4길 35-7

제조의뢰자 :

일동제약주식회사

본사 서울특별시 서초구 바우로27길 2 (전화)02-526-3114

공장 경기도 안성시 공단1로 25

소비자상담실 : (전화) 080-022-1010 (수신자부담)

※5030354-1130903

ILDONG

ILDONG

※5030354-1130903