

임산부 및 유소년기 빈혈에

헤모콘플러스 캡슐

(글루콘산제이철나트륨복염)

빈혈 중에는 철 결핍성 빈혈이 가장 흔하게 나타나며, 빈혈의 경우 음식물 내의 철분 섭취만으로는 부족하기 때문에 반드시 철분제를 복용해야 합니다. 또한, 임산부의 경우도 평소보다 더 많은 양의 철분을 필요로 하기 때문에 따로 철분제를 복용하는 것이 좋습니다.

헤모콘플러스는 글루콘산제이철복염으로서 3가철이 글루콘산으로 둘러싸여 있는 복염의 안정한 구조로 위장관내에서 이온화되지 않고 신속하게 흡수되어 위벽을 자극하지 않기 때문에 위장관에서 나타나는 부작용을 최소화하여 내약성(약에 대한 내성)이 뛰어납니다.

■ 원료약품의 분량 1캡슐 중

글루콘산제이철나트륨복염(별규)177.5mg

[철(Ⅲ)로서 62.5mg]

첨가제(타르색소) : 적색40호, 적색3호, 청색1호

■ 성 상

갈색 내지 적갈색의 분말이 든 적색 캡슐제

■ 용법 · 용량

성인 : 철로서 1회 62.5 mg, 1일 2회 식간에 복용한다.

■ 효능 · 효과

철 결핍성 빈혈

■ 사용상의 주의사항

1. 경고

철 함유제제는 6세 이하의 어린이가 사고로 과량 복용하였을 경우 중독성 사망을 일으킬 수 있으므로 어린이의 손에 닿지 않도록 보관한다. 만약 어린이가 사고로 과량 복용하였을 경우, 즉시 의사나 응급센터에 연락한다.

2. 다음 환자에게는 투여하지 말 것.

- 1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분들의 과민 반응 환자
- 2) 12개월 미만의 영아
- 3) 혈색소증(철 대사 이상으로 철이 간장, 췌장에 침착하는 질환), 헤모시데린침착증(조직 장애는 일으키지 않으나 국소적 또는 전신적으로 조직의 (헤모시데린으로서의) 철 함유량이 증가하는 상태) 환자
- 4) 철 이용 장애(예 : 납 중독으로 인한 빈혈, 철 불용성(녹지 않는) 빈혈, 지중해 빈혈, 만발성 피부 포르피린증) 환자
- 5) 비철결핍성 빈혈 환자 (예 : 비타민 B₁₂ 결핍으로 인한 거대적아구성 빈혈)
- 6) 골수(뼈속질) 부족에 의한 빈혈 환자
- 7) 용혈성 빈혈 환자
- 8) 철 과잉증 환자
- 9) 감염이나 종양으로 인한 철 결핍성 빈혈 환자(철이 세망 내피계에 축적되어 이용에 장애를 받을 수 있으므로 1차 질환이 치료된 후 복용할 것.)
- 10) 만성 췌장(이자)염 환자
- 11) 간 경변 환자

3. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.

- 1) 인산염, 칼슘염
- 2) 경구용(먹는)테트라사이클린계 항생제
- 3) 제산제

4. 이 약을 복용하는 동안 다음의 행위를 하지 말 것.

녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차 및 우유 · 유제품은 복용중 또는 복용전후에는 피할 것.

5. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

- 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
- 2) 소화성궤양, 만성궤양성대장염, 국한성대장염 등의 위장질환 환자
- 3) 심장 · 순환기계기능 장애 환자
- 4) 발작성 야간 혈색소뇨증 환자(용혈을 유발하여 병태(병의 상태)를 악화시킬 수 있다.)
- 5) 신장애(신장장애) 환자(신부전 환자)
- 6) 저단백혈증 환자
- 7) 철 함유제제(철분제, MRI용 간장 조영제 등)을 투여중인 환자
- 8) 항알도스테론제, 트리암테렌과 함께 복용하는 사람(고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의할 것.)
- 9) 철분 제제와 디포스포산 염류, 티록신, 세프디니르 제제를 동시 복용하는 사람(이 제제들의 흡수가 감소되므로 일정한 시간 간격(2~3시간 이상)을 두고 복용할 것.)

10) 퀴놀론계, 페니실라민, 클로람페니콜, 콜레스티라민, 체장엑스 및 비타민 E와 같은 물질을 복용하는 사람

6. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과 의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한 이 첨부문서를 소지할 것.

- 1) 두드러기, 가려움, 햇빛 노출시 피부 과민반응
- 2) 복부(배부분) · 위통증, 위 경련
- 3) 구토, 설사
- 4) 열, 혼수

5) 때때로 AST, ALT의 상승, 드물게 ALP 상승

6) 구역, 식욕부진, 변비, 흑변(검게 변함), 치아변색, 위부불쾌감

7) 과량 투여로 인해 구역, 구토, 변비, 설사 등의 위장증상, 식욕부진, 복통, 토혈(혈액구토), 직장출혈, 무기력, 권태감, 순환장애 또는 고혈당증, 대사성 산증, 간 효소 수치의 상승, 색소침착, 고나트륨혈증, 울혈성심부전, 부종(부기), 중독 될 경우 소화기관의 협착 유발

8) 과량 투여로 인한 위장관 장애와 순환 부전을 수반한 허탈의 경우에는 구토를 시킨 후 탄산염과 우유를 복용시켜 위세척을 할 것.

7. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항

1) 정해진 용법, 용량을 잘 지킬 것.

2) 치료를 시작하기 전에 빈혈의 유형과 그 원인을 파악해야 한다. 빈혈은 혈액 손실과 같은 전신적인 장애에 의해 발생할 수 있으므로, 가능한 이러한 원인들이 먼저 치료되어야 한다(예 : 만성질환에 의한 빈혈은 철분 복용이 유효하지 않을 수 있다.).

3) 어린이에 복용시킬 경우에는 보호자의 지도 · 감독하에 복용할 것.

4) 1개월 정도 투여하여도 증상의 개선이 없거나 악화될 경우에는 의사 또는 약사와 상의할 것.

5) 투여 중에는 혈액검사를 실시하고, 과량투여하지 않도록 주의할 것.

6) 아스코르빈산(비타민 C) 200mg 이상과 함께 복용시 철분의 흡수가 증가 될 수 있다.

8. 보관상의 주의사항

1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.

2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전(뚜껑을 꼭 닫아)하여 보관할 것.

3) 오용(잘못사용) · 남용을 피하고, 품질을 보호 · 유지하기 위해 다른 용기에 넣지 말 것.

■ 저장방법 및 사용기간

기밀용기, 실온보관(1~30℃), 제조일로부터 36개월

■ 제품문의처

080-424-7999

■ 포장단위

자사포장단위

※ 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거 보상받을 수 있습니다. (구입 시 사용기한 또는 유통기한이 경과되었거나 변질 · 변패 · 오손된 제품은 구입처를 통하여 교환 또는 환불하여 드립니다.)

※ 사용기한이 경과한 제품은 복용하지 마십시오.

8 801121 001677

※ 주의

1. 정해진 용법 · 용량을 준수하여 사용할 것.

2. 충분한 양의 물과 함께 복용할 것.

3. 포장을 개봉하여 복용 시 가끔 캡슐에 포장물이 같이 따라 오는 경우가 있으니 복용 시 캡슐에 포장물이 있는지 꼭 확인하시고 복용할 것.

제품 개봉 시 또는 취급 시 포장재(용기, 케이스)에 상처를 입을 수 있으니 주의할 것

설명서 개정연월일 : 2009. 11. 01.

제조원

판매원

Hanmi 한미약품(주)

경기도 화성시 팔탄면 하저리 893-5

Hanmi 한미메디케어(주)

서울특별시 송파구 방이동 48-9

※ 의약품 사용하기 전에 사용자께서는 설명서를 주의깊게 읽으시고, 설명서를 제품과 함께 보관하십시오.

※ 이 제품설명서 작성(개정)연월일 이후 변경된 내용은 제품문의처 전화를 통해 확인하실 수 있습니다.